

# القبض

مجلة فصلية تقدم بشرى الثقافة العلمية

العدد الأول - العدد الثاني - رجب - رمضان 1421 هـ / سبتمبر - أكتوبر 2000 م



• نشأة النظارات الطبية بين الشرق والغرب

• الجوارح المعشقة في المملكة العربية السعودية

• الزراعة النسيجية خطوة ضرورية لزيادة

الإنتاج الغذائي العربي

# بنك الرياض

## شريك الذي تعتمد عليه في المملكة

مع بنك الرياض يمكنك الاعتمادان بأن أفضل  
بأمر أمينة فليس هناك من بنك آخر يعر  
المملكة أفضل منا.

فقد انتقلت اثنتان من أشهر المجلات  
العالم. هما "فوربس" و "أميرج  
ماركيتس" على فتح بنك الرياض جائز  
الأفضل شريك محلي في المملكة العرب  
السعودية و "الأفضل بنك مراسل للعام ٢٠٠٢".

إن القاعدة الراسخ للبنك والتي تبلغ  
مليار دولار أمريكي، وشبكة فروعها  
تضم ما يقارب الـ ٢٠٠ فرعاً منتشرة  
كافة أرجاء المملكة بالإضافة إلى حص  
بنك الرياض على أكبر عدد من الجوا  
استثمارية الخمس سنوات  
النواي تفوق ما حصل عليه أي بنك آخر  
المملكة. كل هذه العوامل وفرت المق  
المالية وسجلاً متميزاً للاداء بما يمكننا  
مساعدتك في تحقيق ما تصبو إليه لأعضائنا  
ولقد ساهمت خبرتنا في ترتيب قرو  
لكريرات الشركات المحلية لدعم نشاطها  
الاستثمارية والتي تخدم التنمية الاقتصادية  
في المملكة.

ولتزويد عملائنا على المستوى الدولي  
ما يحتاجونه من دعم ومساندة في العمل  
فإن لدينا فروعاً خارجية في كل من لندن  
وهيوستن ومكتب تمثيلي في سنغافورة.

للحصول على المزيد من المعلومات عن  
توفره لعملائنا من خدمات اتصل بنا:


- لندن، المملكة المتحدة  
هاتف: ٢٠٧ ٨٣٠ ٩٠٠ (+٤٤)
- هيوستن - تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية  
هاتف: ٧١٢ ٢٢١ ٢٠٠ (+١)
- سنغافورة  
هاتف: ٦٥٣٦ ٤٤٩٢ (+٦٥)
- الرياض، المملكة العربية السعودية  
هاتف: ١٤٠١ ٣٠٢٠ (+٩٦٦)

أو تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت:

[www.riyadbank.com](http://www.riyadbank.com)












٨٢




تمود بدايات تأسيس علم زراعة الأسنجة إلى عام ١٩٠٢م عندما توقع العالم الألماني هابر لند (Haberlandt 1902) التخصص في فسيولوجيا النبات إمكانية نمو الخلايا النباتية في أوساط غذائية نقية مثل الكائنات العضوية الدقيقة كالإكتريا والفطريات، إلخ.....

١٠٠



تتكوّن أجسامنا من نحو ٧٠٪ من الماء، وتختلف نسبة الماء في خلايا المخلوقات، طبقاً لنوعها وطبيعتها. قال تعالى: ﴿...وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون﴾ [الأنبياء: ٣٠]. إضافة إلى هذا، فإن مياه البحار والمحيطات..... إلخ

١٠٨



يقول الفيزيائيون الفلكيون: إن باستطاعتهم أخيراً إخبارنا عن كيفية انتهاء الكون، ولن يتم ذلك بطريقة الانفجار، أولئك الذين يعيشون في المدن أو قريباً منها، لا يجدون في السماء شيئاً يستحق النظر، فهي مجرد مجموعة متناثرة من النجوم في فضاء..... إلخ

١٢٢



في شهر مايو/ أيار ١٩٩٩م، أعلنت الحكومة البلجيكية تلوث بعض الأعلاف الحيوانية التي تعطي للدواجن والأبقار بمركيبات الديوكسين. وعلى الفور، تناقلت وكالات الأنباء هذا الحدث، ونشرت عشرات الدراسات والمقالات المحذرة من خطر هذه المركبات..... إلخ

٥٤



يطلب للمرء أن يمعن النظر طويلاً في نجوم السماء المتناسقة في دقة رائعة ونظام أقرب إلى الإعجاز هي ليال صافية رائعة، ومنذ الأزل علم الإنسان أن السماء هي القبة الزرقاء التي

# نشأة النظارات الطبية بين الشرق والغرب

لطف الله قاري



عمداً. وما كتب من قبل بعض الباحثين العرب لا يتعدى الاعتماد على واحد من المراجع الغربية دون أية محاولة للرجوع إلى مصادرها العربية. فنستعرض هنا ما ورد لدى أوثق المراجع الغربية. وما تجده في مصادرها العربية. ونحاول بعد ذلك استخلاص النتائج مما توافر لدينا من معلومات.

العدسات في القدم

المعروف لدى المهتمين بالآثار والمتاحف أن

لاشك في أن النظارات الطبية لتصحيح النظر كانت من المخترعات المهمة في تاريخ البشرية. فأنين ثم هذا الاختراع ومتى؟ هل عرفت هذه الآلة في الغرب أول مرة كما تقول المراجع الغربية أم كان للعرب والمسلمين سبق في هذا المجال كما في غيره من مجالات التقنية (التكنولوجيا)؟ التاريخ الميكرو لهذه الأداة أثقل في المؤلفات الغربية بالأساطير وحكايات الرحالة والكتابات الناتجة عن حماسة وطنية محلية، بل حتى القصص المفققة



تستعمل للتكبير، وإنما استعملت من أجل تركيز أشعة الشمس في بؤرتها من أجل إحداث لهب، فكانت تسمى «الرايا المحرقة». ووصل إلينا عدد من المؤلفات في هذا المجال مما ألفه علماء الحضارة الإسلامية ومن عصور ما قبل الإسلام. وتوجد في بعض المتاحف عدسات قديمة بعضها يعود إلى ألفي عام قبل الميلاد، ولكن تعدّ عدسة نمرود التي اكتشفت في نينوى بالعراق عام ١٨٥٠م من أشهر هذه العدسات، وهي مكونة

الزجاج الحجري (أي الحجر الشفاف الذي يوجد في الطبيعة) عرف استخدامه لدى الإنسان منذ القدم. والثابت أيضاً أن الزجاج المصنوع عرفت صناعته منذ عصور قديمة. فقد عرف لدى قدماء المصريين والفينيقيين وغيرهم. وتوجد في المتاحف أدوات وأوان زجاجية منذ أقدم العصور التاريخية المعروفة.

وقد عرفت الحضارات الإغريقية والهيلينية والرومانية والإسلامية العدسات، ولكنها لم





لوحة تثل الرسام الفارسي رضا ساساني في طبعه وختمه، رسمها نقسفة "مغن الصغر" في شهر شوال ١٠١٥ هـ (أفراس-أبريل ١٦٢٥م) وهو يلبس نظارة تليست وهذه اللوحة معروفة في بلاد الإسلام لشخص يلبس النظارات وهي تخطو لولة في مكتبة جامعة برنستون بولاية نيوجرسي الأمريكية.

من كرسنال حجري، تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد. أحد وجهيها سطح مستو، والآخر محدب. قطرها بوصة ونصف البوصة، وسمكها تسعة أعشار البوصة. ويؤرتها على بعد أربع بوصات ونصف البوصة من وجهها المستوي. وهي محفوظة في المتحف البريطاني بلندن. وقد بالغ بعض الباحثين في الاستنتاج، فظن أن هذه العدسة تمثل نموذجاً لتلسكوبات عرشتها حضارات ما بين التهرين، ودليلهم على ذلك دقة الأرصاد الفلكية عندهم. إلا أن ما أجمع عليه محققو الباحثين أن هذه العدسة لا تصلح للتكبير، وإنما الأرجح أنها لا تصلح إلا للزينة.

وكتب المؤرخ بليني Pliny يقول: إن الإمبراطور الروماني نيرون كان يتابع المصارعة الوحشية التي تنتهي بقتل العبيد والأسرى المتصارعين، فكان يشاهدهم من وراء لوح من الزمرد الشفاف. وقد فسّر البعض هذه العبارة بأنه كان يستخدم عدسة كبيرة لتقريب المنظر. ولكن هذا مستبعد بعدة أدلة: فالمعاصرون لنيرون ومن بعده لم يعرفوا العدسات المقربة. ولوح الزمرد لم يصرح المؤرخ بليني بأنه اتخذ لهذا الغرض. فقد يكون غرضه تخفيف أشعة الشمس أو أي سبب آخر. وكان الرومان في ذلك العهد يعدون ضعف النظر عيباً خلقياً لا يوجد له علاج. ومن ثم يؤثر في قيمة الرقيق في سوق النخاسة. فكان الروماني يختبر العبد قبل شرائه بأن يجعله يقرأ له شيئاً مكتوباً.

وجاء في روايات الرحالة أن الصين عرقت النظارات منذ القدم. وهذا أيضاً غير ثابت. فقد كان الصينيون في عام ١٤٤١م يشتررون النظارات من حاكم ملقا بأرخبيل الملايو (إندونيسيا وماليزيا حالياً). ويقول المؤرخون الأوروبيون: إن النظارات وصلت إلى الملايو عن طريق التجارة مع أوروبا.

#### النظارات في أوروبا

في القرن الثالث عشر كتب العالم الإنجليزي روجر بيكون (١٢١٤-١٢٩٤م) حول

العدسات المكبرة. فصرح لأول مرة بإمكانية استعمال قطع من الكرات الزجاجية لتكبير الأشياء المرئية، حيث يقول: «ولهذا السبب فإن هذه الآلة نافعة للأشخاص المسنين ولن لديهم ضعف نظر، لأنها تمكنهم من رؤية أي حرف مهما صغر إذا تم تكبيره بشكل كاف». وقد صرح مؤرخو العلوم بأن روجر بيكون ينقل أكثر آرائه من الترجمات اللاتينية لكتاب ابن الهيثم، وفيها الكثير من إضافات مترجميها. وفكرة تكبير الأشياء من قبل أجزاء الكرة الزجاجية كانت معروفة منذ بحوث ابن الهيثم التي نتطرق إليها في الفقرات التالية، إلا أن استعمال هذه الظاهرة من أجل القراءة ورد صريحاً أول مرة في كتاب بيكون.

وذكر مؤرخ طب العيون هرشبرج أن صناديق الكتب كانت تصفح من داخلها بحجر البريليوم



فالأفضل الاعتماد على النظارات. لم يجد الباحثون أي دليل على اسم مخترع النظارات. وكل ما حصلوا عليه هو التاريخ التقريبي لزمن اختراعها. وهناك ثلاث روايات نقلها مؤرخ طب العيون هرشبرج عن العالم الإيطالي ردي Redi (المتوفى سنة ١٦٩٧م)، تقول إحداها: إن ذلك العالم كان يمتلك مخطوطة مؤرخة بعام ١٢٩٩م، جاء في مقدمتها أن المؤلف أدركه الكبر وصار لا يستطيع القراءة إلا بالنظارات التي تم اختراعها في زمانه. والرواية الثانية - وهي أيضاً نقلاً عن ردي - هي خطبة موعظة مؤرخة بعام ١٣٠٥م يقول ملقبها: إن النظارات تم اختراعها قبل أقل من عشرين سنة. والرواية الثالثة تقول: إن الراهب الإسكندر السبيني (من مدينة سبينيا Spina بشرق إيطاليا) تعلم صناعة النظارات، فكان يقوم بتعليم تلك الصناعة لغيره. وقد توفي عام ١٣١٢م.

هذه الروايات التي نقلها هرشبرج عن «ردي» اعتمدها كل من كتب حول هذا الموضوع فيما بعد، نقلاً عن هرشبرج. إلا أن مؤرخي العلوم الإيطاليين أوضحوا أن هذه القصص كلها ملفقة من اختراع «ردي» نفسه، ومن ثم لا يصح الاعتماد عليها. وككتاب هرشبرج تم تأليفه بين عامي ١٨٩٩ و ١٩١٨م بالألمانية، وكثير من معلوماته صارت قديمة بحاجة إلى تصحيح. ولكنه نشر عام ١٩٨٥ مترجماً إلى الإنجليزية دون تنقيح. فانتشرت قصص «ردي» بين الناس، بينما البحوث التي تفند تلك القصص الباطلة منشورة باللغة الإيطالية في دوريات قديمة محدودة الانتشار.

وهناك قصص أخرى أنكرها هرشبرج منذ البداية، وبين زيفها وبطلانها. ومن هذه القصص ما زعم بعض الكتاب من أنه قرأ في رحلة ماركو بولو أن الصينيين كانوا يستعملون النظارات منذ القدم، والواقع أن بولو لم يذكر شيئاً من هذا في رحلته، وعلى أي حال فمعلوماته عن الصين



جوه من توماس تسمي «أفك العذراء» تم رسمها بين عامي ١٤٠٠ و ١٤٠٠م

الشفاف. وهذا الحجر كانت الكتابة التي تحته تبدو أكبر من حجمها الطبيعي، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف العدسات المكبرة، ومن ثم النظارات. وذلك نحو عام ١٣٠٠م. وهذه الرواية تناقض ما ذكره هرشبرج نفسه من أن العالم العربي ابن الهيثم عرف خصائص تكبير الصور من قبل الأجسام الزجاجية منذ القرن الرابع الهجري، أي العاشر الميلادي.

في بداية القرن الرابع عشر الميلادي بدأت الكتب الطبية والتاريخية في أوروبا تتطرق إلى ذكر النظارات، فتجد مثلاً برنارد جوردين Bernard Gordon وهو أستاذ طب في جامعة مونتيليه بجنوب فرنسا يتحدث عام ١٢٠٥م عن قطرة للعين تغني كبار السن عن النظارات. وفي عام ١٢٥٢م يتحدث جي دشلياك Guy de Chauliac حول أنواع من قطرة العين للغرض نفسه. ولكنه يذكر بأنه إذا لم تنفع

تم وضع عدستين في إطارين متصلين، فتكونت بذلك النظارة.

إذن فالنظارات عرفت في أوروبا في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي، وبدأت اللوحات الفنية تظهر منذ منتصف القرن الرابع عشر تصور أشخاصاً يلبسون النظارات. فتجد في الأشكال المصاحبة لهذه المقالة لوحتين رسمت كل واحدة منهما عام ١٢٥٢م، إحداهما جدارية والأخرى زيتية. ونجد ذكر هذه الأداة في السجلات العمومية وفي وصايا التركات؛ لأنها كانت سلعة غالية الثمن في ذلك العهد.

ونجد ذكر النظارات عند الشعراء الأوربيين منذ القرن الخامس عشر الميلادي. فالشاعر Pulei (١٤٣٢-١٤٨٤م) والشاعر برشيلو Burchiell (١٤٠٤-١٤٤٨م) ذكراهما في قصائدهما. وكذلك ذكرت في المسرحيات



« أول صورة منظومة تظهر فيها النظارات الطبية. والتد في كتاب «توضيح» 1397 Christiani تأليف شمس الدين ابن ماجي طبع في نورسج بالقسمة عام ١٤٧٢م وصغيره أن الطائفة لم اعتنوا بها في القليل منسختها قبل نحو ربعين عاماً من ذلك التاريخ



«توضيح للنظارات الأولى من القرن الرابع عشر الميلادي. يمثل التي تظهر من اللوحات الرفقة بهذه اللوحة وهذا التوضيح لما يصعد في الكتب القديمة

مشكوك فيها لدى الباحثين.

ومن هذه القصص الباطلة أيضاً قصة اخترعها بعض الصحنين في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وتزعم أن روجر بيكون هو الذي اخترع النظارات، وأنه أعطى عينة منها لصديق له سافر إلى إيطاليا، وفي إيطاليا شاهدها الراهب الإسكندر السبوني. السابق ذكره، فتعلم صنعها وانتشرت من بعده.


ومن القصص المزيفة أيضاً ما ذكره أحد الكتاب من أنه شاهد نصباً على قبر في كنيسة تم هدمها بعد ذلك، وأن ما كتب على النصب يقول: «هنا يرقد سلقيو من أرماتي بفلورنسا، مخترع النظارات، غفر الله ذنوبه، ١٣١٧م».

والخلاصة التي انتهى إليها مؤرخو العلوم أن مخترع النظارات ظل مجهولاً. والأرجح أنه لا يوجد مخترع واحد تنسب إليه هذه الأداة. وإنما التجارب مع العدسة المكبرة ظلت تتطور إلى أن

الهزلية في مقاطعة توسكانيا الإيطالية في ذلك العهد.

وهذا كله حول النظارة التي يستعملها كبار السن للقراءة. أما النظارة المقعرة لعلاج قصر النظر فقد بدأ استعمالها في القرن السادس عشر الميلادي، وذلك استنتاجاً من لوحة رسمها الرسام رافايل بين عامي ١٥١٧ و ١٥١٩م للبابا





#### بحوث ابن الهيثم

كل ما سبق ذكره كان ما ورد في مصادر أوربية. وقد ذكرنا أن روجر بيكون كان ينقل معظم أقواله من عالمنا العربي ابن الهيثم الذي بحث في موضوع انعطاف الضوء أو انكساره عندما يمر في جسم شفاف كالماء والزجاج والهواء الكثيف الرطوبية. فيقول: إن الأجسام المرئية تبدو على غير شكلها الأصلي من وراء الأوساط الشفافة، فيعرض من أجل ذلك الفلظ في النظر إليها، بسبب أشكال سطوح الأجسام المشقة. وأشكال هذه الأجسام الشفافة كثيرة، «إلا أنها قل ما تعرض للبصر: لأن الذي يدركه البصر من المبصرات التي من وراء الأجسام المشقة المخالفة لشفيف الهواء هي الكواكب وما يكون في الماء، وأما ما وراء الزجاج والأحجار المشقة المختلفة الأشكال فقل ما يدركها البصر. وإذا أدركها فقل ما يتألمها. وليس تجري الأجسام

لهو العاشر لايمتا نظارة من هذا النوع. وبدأت الإشارات ترد حولها في الكتب بعد ذلك. ولكن التفاصيل العلمية حول أنواع العدسات والنظارات نجدها في بحوث الفيزيائي والفلكي المشهور كبلر Kepler الذي نشر كتابه في هذا الموضوع عام ١٦٠٤م.

لم يتقبل أطباء العيون النظارات الطبية في البداية، فقد مرّ بنا أن بعضهم كان يصف قطرات العين تغني عن النظارات. بل ظلت أنواع من القطرة تباع للغرض نفسه حتى بعد كبلر، أي بعد قرون من اختراع النظارة. ونسب إلى الطبيب بارتش Bartsch قوله: كيف يمكن لعين ضعيفة لا ترى جيداً أن ترى من وراء جسم؟ وظل أطباء العيون لا يتدخلون في اختيار نوع العدسات ومقاسها لمراجعيهم. وذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر، أي قبل مئة وخمسين عاماً خلت.

الذي من وراء التعمير مستويًا. ويكون المبصر ملتصقًا به. وهذان الوضعان لا يوجدان. وإن وجدا فليس يكونان إلا هذا نادرا. فلا وجه للاشتغال بهما.. وقد ذكر في موضع ثالث أن الشيء المبصر يراه الإنسان بانعطاف الضوء من الوسط الكثيف مثل الزجاج والماء «أعظم من حقيقته» أي أكبر من حجمه الحقيقي. وذكر في موضع رابع «نبدأ مما يرى من وراء الزجاج والأحجار المشقة» فأعطى أمثلة لانكسار الضوء عندما يمر من هذه الأجسام الشفافة ذات السطوح الكروية المقعرة أو المحدبة. فابن الهيثم أدرك إذن خصائص تغيّر الصورة، بل وتضخمها عندما ترى من خلال



المشفة مجرى المرايا، فإن المرايا يتعمّد الناس النظر فيها لمشاهدوا صورهم. فهم يتكلفون النظر فيها دائماً وفي كل وقت، ويجعلون أيضاً في حيطان الدور مرايا ثابتة ليروا فيها صورهم... إلى آخر ما قاله في هذا الصدد. فهو يقرر هنا أن تغير الصور عند مرورها في جسم شفاف كالزجاج معروف لديه، ولكن البحث فيه غير مجد؛ لأنه ليست له تطبيقات عملية في الحياة اليومية حسب رايه.

ويقول في موضع آخر: «وليس في المبصرات المألوفة شيء يدركه البصر من وراء جسم مشف كروي أغلظ من الهواء يكون مقعره يلي البصر: لأن ذلك إن كان من زجاج أو حجر من الأحجار فيجب أن يكون ذلك قطعة من كرة جوهاء. ويكون المبصر هي داخل تلك الكرة، أو يكون سطحه







وباستعمال هذه الأداة «يرى صور الأسطار قد عظمّت». فهل هذا الوصف ينطبق على النظارة أم على القلم؟

هل كان ابن حـمـديـس يصف النظارة أم العدسة المكبّرة التي سبقّت اختراع النظارة؟ الحواب نجده في البيت الرابع، حيث الأداة التي يصممها تترك أثراً محفوراً على الخد مثل النهر والجرح، وهذا الأثر طبياً من النظارات القديمة الثقيلة الوزن.

#### انتشار النظارات بين المسلمين

انتشرت النظارات بين المسلمين من بعد القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) كما انتشرت بين الأوروبيين. وصرنا نحد لها ذكراً في كتب الأدب والتاريخ. فمن ذلك قول الشاعر أحمد بن محمد المعروف بابن العطار المصري (المتوفى سنة ٧٩٤هـ / ١٣٩١م):

أتى بعد الصبا شيبى ودهري

رمى بعد اعتدالي بأعوجاج

كفى أن كان لي بصر حديد

وقد صارت عيوني من زجاج

والمؤرخ السخاوي يقول عن الخطاط شرف ابن أمير السراي المارديني (المتوفى سنة ٨٥١هـ / ١٤٤٧م): إنه توفي بعد أن تجاوز المئة من العمر، وإنه «متع بحواسه كلها، واستمرّ يكتب من دون مرأة حتى مات». يقصد بالمرأة النظارات

وصرنا في القرون التالية نرى ذكر النظارة في الشعر، بل وفي اللوحات الفنية أيضاً، مثل اللوحة المنشورة مع مقالتنا هذه للرسم رضا عباسي وهو يرتدي النظارة.

#### الخلاصة والاستنتاجات

تاريخ «اختراع النظارات» في أوروبا يحيطه الشك، وتعلّاه القصص الملفقة التي سردنا ستاً منها، وهناك المزيد مما حكم بطلانه مؤرخو العلوم الأوروبيون أنفسهم. وكل ما يستطيعون





### المراجع العربية:

- ابن حمديس ديوان ابن حمديس، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٩٦١، ص ٢٠٣.
- السقاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، القاهرة مكتبة القدسي، ١٩٣٥-١٩٣٦، ثم طبعات مصورة عبر مؤسسة يهروا، ١٢ جزءاً، ج ٢، ص ٢٩٩.
- عواد، ميخائيل، العرب اول من عرفوا النظارات، مجلة منها بغداد، العدد ١٢٩ (أيلول/سبتمبر ١٩٥٦) ص ١٥.
- القاسبي، كمال الدين، تفقيح الناطق، جهر اباد دائرة المعارف العثمانية، ١٣٥٩هـ/ ١٩٣٨م، ج ١، ص ٢٥٠-٢١٧.
- بطليمه، مصطفى الحسن بن الهيثم، بصورته وكشوفه البصريه، القاهرة جامعة هزاد الاول (جامعة القاهرة حالياً)، ١٩٤٢، ج ٢، ص ٧٢٥، ٧٢١، ٨١٠-٨١١.
- موقع النصف البريطاني بلندن على الإنترنت.

### المراجع الأجنبية:

- ATI, Esin. The Brush of the Masters:- Drawings from Iran and India, Washington: Free Gallery of Art, 1978, pp. 36-37, 83.
- BELLONI, Luigi. "Redi", Dictionary of Scientific Biography, Scribners Publishers, New York, 1981, vol. 11, pp. 341-343.
- CANBY, Sheila R. Persian Masters, Five Centuries of Painting, Bombay: Marg Publications, 1990, pp. 120-125.
- DREWRY, Richard D. "What Man Devised that He Might See", the Internet Site of the University of Tennessee, Department of Ophthalmology, 2002.
- HIRSCHBERG, Julius. The History of Ophthalmology, vol.2, translated from German by F. C. Blodi, partially edited by: M. Zafer Wafa', Bonn: Wayenborgh Verlag, 1985.

تأكيدوه هو أن النظارات عرفت لديهم منذ القرن الرابع عشر، اعتماداً على ذكرها في كتبهم ورسمها في لوحاتهم الفنية.

في المقابل نجد العالم العربي ابن الهيثم درس موضوع انكسار الضوء - أو انعطافه كما سماه - في الأوساط الشفافة. ولكنه صرح بأن انكسار الضوء في الزجاج وأمثاله وتغير الصورة فيه لم تكن له تطبيقات عملية في زمانه. إلا أن من أتى بعده عرف خاصية تكبير العدسات وطبقها، بحيث نجد روجر بيكون بعد ذلك بثلاثة قرون يذكر أن الناس في زمانه كانوا يستخدمون العدسات المكبرة للقراءة.

وقبل اختراع النظارات المزعوم يقرن نجد الشاعر العربي ابن حمديس الصقلي يصف النظارة وصفاً واضحاً لا لبس ولا غموض فيه. وهو الذي سبق شعراء أوروبا في هذا المجال بثلاثة قرون.

وذكر مؤرخ طب العيون هرشبرج أن أطباء العيون العرب لم يذكرهم النظارات في مؤلفاتهم. وعد ذلك دليلاً وحجة على عدم معرفة المسلمين بها. بينما تاريخ العلم يسجل أن أطباء العيون في الغرب الأوربي أنفسهم تجاهلوا أداة تصحيح النظر هذه وأنكروا هاندتها: بل ولم يكن الطبيب يشرف على اختيار نوع العدسات ومقاسها حتى منتصف القرن التاسع عشر كما ذكرنا. ومن ثم فإن عدم ذكرها في كتب طب العيون العربية ليس دليلاً كافياً على عدم معرفتها في بلاد الإسلام.

ووجود لوحات فنية في الغرب رسمت فيها النظارات وعدم وجودها في بلاد الإسلام له سبب معروف وهو عدم العناية بتصوير الأشخاص، لحرمة هذا العمل عند المسلمين. فلم تظهر مثل هذه اللوحات إلا في العصور المتأخرة. بينما ذكر النظارات في الشعر وفي تراجم الأشخاص مثل ما ورد عند السخاوي يفني عن الاستدلال باللوحات الفنية.



الحساسية الدوائية في احسام المرضى إلى رفض الحهاز المناعي فيها دخول هذه المركبات إليها. ويتعامل معها هذا الحدار الوافي كمواد غريبة عنه. الأمر الذي يؤدي إلى فقدها فاندتها كوسيلة علاجية لتخفيف شدة الامراض وويلاتها. وتصبح سببا لشكاوى مرضية هي احسامهم سُميت الحساسية الدوائية. ولم يتمكن العلماء من تفسير اسباب شكاوى بعض الاشخاص دون غيرهم من الأعراض المرضية للحساسية الدوائية

صاحب انتشار استخدام الأدوية في علاج الأمراض التي تصيب الإنسان زيادة الشكاوى من أعراض الحساسية لعدد متزايد منها. وداع صيت بعضها بهذا الخصوص لخطورة اعراضها المرضية مثل البسلي بأنواعه. وكذلك مركبات السلما وعقار الأسبرين. وتختلف شدة حالة الحساسية التي تسببها الأدوية من واحد منها إلى آخر ومن مريض إلى آخر. وكذلك حسب الكميات المستعملة منها هي العلاج. ويمرّز ظهور أعراض



الحساسية إما على شكل آقراس تؤخذ عن طريق الفم كالأسبرين ومركبات السلفا وبعض المضادات الحيوية أو على شكل حقن بالعضل أو بالوريد كالبنسلين وتتراسيكلين والمضاد الحيوي الستيرويدي المسمى نيجرام (حمض نالديكسيك Nalidixic acid) أو كحقن تحت الجلد مثل هرمون الأنسولين أو في صورة مرهم للجلد مثل مركب إيثلين ثنائي أمين Ethylene diamine والبنسلين. ولهما تأثير مضاد لنشاط الجراثيم أو كلبوس

في أجسامهم. وتتميز بعض الأدوية دون سواها في تشجيع تكوين مواد مضادة لها وإنتاج مركب الهستامين في الجسم والشكوى من أعراض الحساسية منها. وتظهر تفاعلات الحساسية من الأدوية في بعض الأشخاص نتيجة دخول دواء معين أو أكثر إلى أجسامهم.

طرق دخولها إلى الجسم  
تستعمل العقاقير التي تسبب حدوث حالات



معينة لهذه المركبات الكيميائية وليس نتيجة تفاعلات حساسية وليس بفعل تفاعلات تسميمه تسببها. ويجب تمييز حساسية أجسام بعض الناس من بعض المضادات الحيوية عن حالة عدم تحملهم لها، ومن أفضل الأدلة على ذلك هو شكوى عدد لا يستهان به من الناس من الإحساس بالغثبان عند استعمالهم الكثير من المضادات الحيوية في العلاج، وتشابه تفاعلات الحساسية لبعض الأدوية التفاعلات المناعية الأخرى التي تحدث في الجسم، وتعرف كريات الدم البيضاء على المواد الفريية التي تدخل إلى الدم وهي مولدات الضد Antigens، وتنتج أجسام مضادة لها من نوع جلوبيولين مناعي تبقى في الجسم، ثم تنطلق عند دخول هذه مركبات الفريية . كدواء ما . مرة ثانية وتهاجمه، وتحدث تفاعلات حيوية في جسم الإنسان نتيجة إنتاجه مركبات حيوية فيه أهمها الهستامين الذي يسبب ظهور أعراض الحساسية من الدواء.

#### علاقتها بالعامل الوراثي

يرى العلماء وجود استعداد وراثي لدى بعض الأشخاص للشكوى من الحساسية لدواء واحد أو أكثر أو من بعض الأغذية أو غير ذلك، فمثلاً عندما يعاني أحد الأبوين الحساسية من أحد الأدوية أو الأغذية فتكون نسبة احتمال شكوى أولادهم منها نحو الثلث، وتزداد هذه النسبة إلى ٧٠-٦٠% في الأطفال عند شكوى والديهم معاً منها، وليس ضرورياً ظهور تفاعلات الحساسية بالأعراض الصحية نفسها والشدة من الدواء المستعمل نفسه، فقد يعاني الأب من ربو قصبي وتشنكي ابنته من إكزيما ويعاني الابن حساسية في أنفه أو سواها، ويمكن حدوث الحساسية من الأدوية وسواها في أي مرحلة من عمر الإنسان، وما زال العلماء يجهلون أسباب الشعور المفاجئ لشخص ما بالحساسية من مركب كيميائي أو عقار معين على الرغم من كونه قد استعمله قبل ذلك عدة مرات دون أن يشنكي منه،

شرجي من الأسبرين أو على شكل حقن بالعضل كلقاح مناعي للوقاية ضد الإصابة بمرض الحمى الشوكية، واكتشف الأطباء وجود عدد لا يستهان به من العقاقير يؤدي استعمالها إلى ظهور أعراض صحية سيئة في أجسام المرضى، وصنفوا بعضها فيما يعرف بحالة الحساسية الدوائية، وتظهر أعراضها المرضية بشكل خاص على الجلد، واشتهرت بعض الأدوية أكثر من غيرها بحساسية فرط حساسية أجسام المرضى لها وتسبب ظهور أعراض مرضية شديدة لهم، وهي تشمل مضادات حيوية كالبنسلين بأنواعه وحمض نالديكسيك ومركبات السلفا وخاصة (كوتراري ميكسازول Co-trimethazole، والأسبرين، وهرمون الأنسولين المستخلص من بنكرياس الأبقار والخنازير، وغيرها).

#### أسباب حدوثها

الحساسية الدوائية هي عبارة عن تفاعلات فرط حساسية المريض لاستخدامه عقار معين أو أكثر، وهي رد فعل مناعي لدخول بعض الأدوية إلى جسمه، ومن أهم هذه العقاقير المسببة عن حدوث هذه الحالة المرضية البنسلين بأنواعه مثل مركب البنسلين ج، وهيبايل هينوكسي بنسلين، وديروكائن بنسلين، وبنترائين بنسلين، وأحياناً المشتقات نصف التخليقية لمركب البنسلين أو مركبات السلفا أو حمض الساليسليك (كالأسبرين)، أو هرمون الأنسولين.

كما تحدث حالات أخرى من الحساسية الدوائية نتيجة حدوث اضطرابات كيميوجيوية وراثية المشا في الجسم، فمثلاً يعاني نحو ١٠٪ من الأشخاص من العرق الأبيض Carcinogens الحساسية من عقار أيزونيازيد Isoniazid، فيؤدي استعمالهم لهذا المركب إلى زيادة خطر إصابتهم باعتلال عصبي، وربما تسمم كبد، كما تحدث تفاعلات فرط الحساسية للأدوية نتيجة متغيرات أيضية محددة وراثياً في جسم الإنسان ترتبط بخواص

الجلد على شكل انتفاخ أو احمرار فيه. وهي ردود فعل مناعية ضدها في الجسم، ولا يتحتم أن تكون جميع المركبات التي تكون نتائجها إيجابية في اختبار الحساسية على الجلد ذات تأثيرات فعالة على عمل الجهاز التنفسي للشخص نفسه.

#### أنواع تفاعلات الحساسية الدوائية

يمكن تصنيف معظم حالات فرط الحساسية الدوائية في أربعة أنواع، ذكرها العالمان كومبس Coombs, R.R وجيل Gelb, P.G.H في مقالة علمية نشرتها مجلة الممارس The Practitioner الخاصة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. في العدد الثاني، شهر يناير ١٩٩١م. وما رالت الآلية الدقيقة لحدوث بعض تفاعلات الحساسية الدوائية غامضة، وتدل أعراضها السريرية في الجسم على أنها ذات أساس مناعي مثل حدوث متلازمة ستيفنز وجونسون Stevens Johnson Syn-drome، وهي

النوع الأول: يحدث هذا النوع من فرط الحساسية Anaphylaxis للأدوية نتيجة تفاعلات مولدات الضد Antigens . أي بعض الأدوية . وأجسام التضاد من نوع IgA على سطح الخلايا في الجسم، كما تسبب انطلاق مركبات حيوية وسطية مثل الهيستامين، وتحدث حالة فرط الحساسية لمفعول بروتين غريب سق دخوله إلى الحميم بعد حقنه في الجلد أو الوريد، مثل ما يحدث عند استعمال بعض المضادات الحيوية وخاصة البنسلين، ويرتفع معدل الموت نتيجة حدوث الحساسية من هذا العقار. وتظهر في البداية أعراض حالة فرط الحساسية في جسم المريض على شكل وعكة صحية وشعوره بعثان ومداق معدني في فمه ورغبة شديدة للتبول أو التبرز، ثم يليها حدوث هبوط في الدورة الدموية أو تقلص شديد في الشعبات الهوائية بالرئتين تؤدي إلى صعوبة في التنفس، وتعالج بسرعة هذه



#### تشخيص حدوثها

يصعب تشخيص حدوث الحساسية الدوائية في جسم الإنسان وتعييها من الأعراض الصعبة لبعض الأمراض، ويفيد فيها إجراء فحوص مخبرية خاصة بهذه الحالة في جسم المريض مثل اختبار كريات الدم البيضاء في دمه، عتداد نسبة النوع أنوزينيئات منها والكشف عن وجود مركب أمينو جلوبيولين مناعي من نوع Ig E وارتفاع مستواه في الدم، ولسوء الحظ ما رالت نتائج الاختبارات المخبرية للحساسية عبر دقيقة مثل احتثار امتصاص المواد المسببة للحساسية Radioallergosorbent test، واختبار الحساسية بوحمل الجلد الذي توصل فيه كميات صغيرة جداً من المركبات المسببة للحساسية على منطقة سبق حداثها بإبرة خاصة Prick Test في جلد المريض للسماح لها بالدخول إلى جسمه ثم تترك عدة دقائق قبل الكشف عن ظهور تفاعلات في جلد المريض أو عدمه، وتظهر أعراض الحساسية هي

أو سبتيرين) في علاج معظم حالات الوذمة الوعائية العصبية Anlgioeurotic Oedema التي قد تسبب أحياناً الوفاة، بينما يسبب استعمال مركب سلفاميزوكسازول Sulphamethoxazole حالات أكثر حساسية من مركب ترائي ميثوبرين Trimethoprin على شكل وذمة وعائية عصبية بالجسم، كما يسبب استعمال بعض مضادات الجراثيم مثل باكتريم أو سبتريم وترائي ميثوبريم تفاعلات حساسية منها في أجسام بعض الأشخاص في صورة شرى في الجلد.

النوع الثاني: تحدث فيه تفاعلات فرط الحساسية للأدوية بين مولدات الضد (أي الأدوية) والأجسام المضادة على سطح الخلايا بعد تشبيت المكمل Complement وتحطيم الخلايا المصابة في الجسم، وتكون كريات الدم الحمراء أكثر هذه الأهداف شيوعاً لحدوث هذه الحالة المرضية لكن يندر فيها حدوث تحلل للدم، ويحدث

الحالة المرضية الخطيرة بإعطاء المصاب جرعة مقدارها ٥٠ ملل من محلول الأدرينالين (بتركيز ١:١٠٠٠) عن طريق حقنة بالعضل.

ومن أفضل الأدلة على أعراض فرط الحساسية الدوائية شكوى المصاب من ظهور شسرى في الجلد Urticaria، وتقلص قطر القصبات الهوائية بالرتتين وحدوث وذمة وعائية عصبية Angioneurotic Oedema وغيرها، ويشتكى الكثير من الأشخاص حالة الحساسية من عقار البنسلين، ثم يوضع حديثهم لأطبائهم عن شكواهم من ظهور طفح جلدي بقعي Macu-lar Rash عند استعمالهم بنسلين نصف تخليقي مثل أوكساسيلين Oxacillin وميثيسيلين-Methicillin. وهذا دليل على حدوث الحساسية من السلسلة الجانبية لهذا العقار أكثر من نواة مركب البنسلين نفسها، وارتبط استخدام عقار كو- ترائي موكسازول Co-Trimoxazole (مثل باكتريم







سيفالوسبورين Cephalosporins ان تحدث تغيراً في غشاء كريات الدم الحمراء، ويندر حدوث تحليل ملحوظ للدم.

٤. حدوث التهاب وعائي تحسسي في الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في جلد المريض أو في أحشائه نتيجة استخدامه مركبات سلفوناميد Sulphonamide والبنسلين.

النوع الثالث: ينتشر في هذا النوع من فرط الحساسية الدوائية ظهور أعراض صحية في جسم المريض مثل التهاب المفاصل والتهاب الكليتين والتهاب الأوعية الدموية الموجودة بالجلد. وهي تحدث نتيجة ترسب مركبات مناعية على جدران الخلايا في الجسم، وهي تلف نتيجة تحرر أنزيمات من كريات الدم البيضاء تنجذب بواسطة المكمل Complement المرتبط الموجود في الدم، وتسبب

في حالات أخرى تحليل لكريات الدم البيضاء من نوع Polymorphs أو الصفائح الدموية. ويحدث في حالات أخرى التهاب بالكليتين نتيجة استعمال بعض المضادات الحيوية، وتسبب المضادات الحيوية في هذا النوع من فرط الحساسية لها في أجسام المرضى ما يلي:

١. يرتبط المضاد الحيوي مع بروتينات الغشاء الخلوي لكريات الدم الحمراء، فيسبب فيها البنسلين وسيفالوسبورين وستربتومايسين تحللاً للدم.


٢. تتكون معقدات مناعية للمضاد الحيوي مثل مركب تتراسيكلين، وقد يتكون الجسم المضاد في مصل الدم، ويمتص عبر غشاء كريات الدم الحمراء. وقد يحدث تحليل لكريات الدم الحمراء. ٣. يمكن للمضادات الحيوية من نوع

هذه الأعراض المرضية بعد مرور أسابيع بعد التوقف عن استعمالها في العلاج.

النوع الرابع: يحدث في هذا النوع من فرط الحساسية للأدوية تفاعلات متأخرة لبعض الأدوية في الجسم نتيجة تفاعل مولدات الضد مثل بعض الأدوية المبيدة للجراثيم والخلايا الليمفاوية الحساسة لها في الدم، ويندر أن تسبب المضادات الحيوية حدوث هذه التفاعلات في أجسام الأشخاص الحساسين لها لكن يسببها استعمال بعض مضادات الجراثيم مثل إيثلين داي أمين المستعمل كمرهم للجلد فهو يسبب حدوث نفضات Blister وحمامه Erythema وانتفاخ في الجلد.

#### أعراضها الصحية

تحدث الأعراض الصحية للحساسية حسب مواضع انطلاق مركب الهستامين وما يشابهه في




الأدوية المبيدة للجراثيم كالبنسلين وأريثروميسين وأيزونيازيد Nitrofurantoin و Griseofulvin و Isoniazid ومركبات السلفوناميد حدوث تفاعلات فرط الحساسية في أجسام بعض الأشخاص. وعزا بعض الأطباء حدوث مرض الذئب الحمامي Systemic Lupus Erythematosus نتيجة استخدام عقار كو-ترايموكسازول Co-Trimoxazole في العلاج، كما يؤدي استخدام أدوية مثل ميترونيدازول Metronidazole والبنسلين ومركبات سلفوناميد إلى ظهور تفاعلات حساسية في أجسام بعض الأشخاص على شكل حمى والتهاب بالمفاصل واعتلال في العقد الليمفاوية وشرى، وهي تظهر بعد مرور نحو عشرة أيام من استعمال هذه العقاقير، وقد تظهر أحيانا

حسب المريض بعد مرور فترة زمنية تستغرق دقائق أو أكثر، وقد تمتد أحياناً إلى أيام من دخولها إليه أو قد تحدث على شكل صدمة Shock في الجسم. ويعتمد ذلك على درجة فرط حساسية جسم المريض لهذه الأدوية، سواء استعملت عن طريق الحقن بالعضل أو بالوريد أو عن طريق القم أو عند ملامستها الجلد أو العين. وقد يتكرر حدوث أعراض الحساسية الدوائية في أجسام بعض الأشخاص عند استخدامهم بعض العقاقير في العلاج، وتشتد حدتها من وقت إلى آخر. وقد تكون خفيفة الشدة في تأثيراتها في جسم شخص ما وخاصة في شخص آخر، وقد تسبب التفاعلات الحيوية داخل الخلايا بين الأدوية المسببة للحساسية والمركبات المضادة لها حدوث صدمة Shock في الجسم. ويؤدي إنتاج مركب الهستامين كرد فعل الحساسية من دواء أو طعام في جسم المريض إلى حدوث تقلصات عضلية في العضلات الهوائية بالترتين تؤدي إلى صغر قطرها، فيقل حجم الهواء الداخل إليها فيصاب المصاب صيقاً في التنفس، وهو رد فعل هوري شديد للحساسية الدوائية قد يؤدي أحياناً إلى موته المفاجئ.

حالات شاذة عن قوانين الحساسية تحدث أحياناً تفاعلات حساسية للأدوية في جسم المريض تشبه عن القوابس الخاصة بها، وفيما يلي أمثلة على ذلك

. تحدث تفاعلات الحساسية في جسم المريض أحياناً بعد استعماله أول جرعة مضاد حيوي كالبنسلين، ويمكن تفسير ذلك بأنه تعرض لأثار من هذا المركب في طعامه مثل لحوم الحيوانات أو من اللقاحات التي حصل عليها،

. يعاني الأشخاص، الذين يستعملون المضادات الحيوية دون شكاوهم من أعراض الحساسية منها، ظهور تغيرات مفاجئة في تفاعلات أجسامهم منها، تظهر على شكل أعراض صحية سيئة ما رالت أسبابها غير معروفة.



حسب المريض. وتختلف شدتها من شخص إلى آخر، فيؤدي دخول المركبات المسببة للحساسية في الجهاز التنفسي للمريض إلى سيلان أنفه ونورمه والسعال والعطاس وحدث ربو قصبي وصيق في نفسه قد تصل أحياناً إلى شعوره بالاختناق. وقد تدو هذه الحساسية الدوائية على شكل احمرار في العيبي وإمرار الدموع منها وحرقة في الحفنين، وتظهر في الجلد على شكل حكة وطمع جلدي وشرى وإكريما وقد تكون هذه الحساسية في صورة ودمه في الجسم.

طول فترة حدوثها

تحدث تفاعلات الحساسية الدوائية في





تظهر تفاعلات حساسية دوائية معينة في جسم الإنسان عند تعرضه للعامل المسبب لها دون حدوثها بشكل دائم، فمثلاً يعاني معظم المصابين بحمى غددية -Glandu-lur Fever من ظهور طفح جلدي وحُمى عند استعمالهم المضادين الحيويين أميسيلين وأموكسيسيلين في العلاج، ويستطيعون بعد الشفاء استخدامهما دون الشكوى من تفاعلات الحساسية منهما، ويرى العلماء أن الإصابة الجرثومية الإنتانية قد تسبب اضطراباً في الجهاز المناعي بالجسم ربما نتيجة مهاجمة كريات الدم البيضاء العوامل المسببة للمرض، وهناك آلية مشابهة تفسر الارتفاع الشديد في معدل حدوث تفاعلات الحساسية الدوائية في أجسام مرضى الإيدز عند استعمالهم عقار كو-ترايموكسازول Co-Trimoxazole (مثل يكتريم أو سبترين) في العلاج تظهر على شكل طفح جلدي بقعي Macular Rash وحُمى.

#### الحُمى الدوائية

لا يمكن تصنيف جميع تفاعلات الحساسية التي تحدث في جسم الإنسان في المجموعات الأربع التي حددها العالمان كومبس Coombs, R. R وجيل Gell, P.G.H وسبق الحديث عنها في هذا المقال لإمكانية حدوث بعض تفاعلات الحساسية المعقدة نتيجة دخول بعض الأدوية إلى جسم الإنسان، والحُمى الدوائية Drug Fever هي حالة مرضية ما زالت آلية حدوثها غير مفهومة بدقة، وتحدث بشكل شائع نسبياً نتيجة استعمال بعض الأدوية في العلاج، مثل بعض المضادات الحيوية وخاصة البنسلين، وهي حالة حمى تحدث في جسم المريض تستمر لأكثر من أسبوع، ثم تخمد بعد مرور يوم أو يومين بعد توقفه عن استعمالها في العلاج، وتتصف أهميتها السريرية في صعوبة تمييزها من عدم نجاح العلاج الدوائي للمرض.

وفي معظم الحالات يصاحب نجاح علاج الإنتانات الجرثومية انخفاض درجة حرارة الحمى في جسم المريض خلال ٤٨ ساعة من بداية علاجه، لكن يشير غالباً استمرار ارتفاع درجة حرارة الحمى في جسم المريض فترة نحو اسبوع ثم ظهور درجة أخف شدة من الحمى على حدوث ما يسمى الحمى الدوائية، ويستطيع الطبيب تشخيص هذه الحالة المرضية بملاحظته استمرار ارتفاع درجة حرارة جسم المريض بعد توقفه عن استعمال بعض المضادات الحيوية حسب المواعيد والجرعات المحددين في علاجه.

### الحساسية من المضادات الحيوية

تصاب أجسام نحو ١٠.٥% من المرضى حالة الحساسية من بعض المضادات الحيوية وخاصة البنسلين ومركباته، مثل بنسلين ج وبنسلين بروكاتين عند حقنها بالعضل أو بالوريد أو عند استعمالها كمرهم في علاج الإنتانات الجرثومية بالجلد، وكذلك عند استخدام بنزليل البنسلين وكريو كسي بنسلين وأمينو داينوبنسلين وفينو كسي ميثايل بنسلين وأمينو بنسلين (أميبسلين وباكاما بنسلين Bacampicillin وبيفامبسلين Pivampicillin). وتحدث حالات حساسية أقل شدة عند استعمال المركبات النصف التخيلية للبنسلين مثل أوكساسيلين Oxacillin وميثيسيلين Methicillin وفلوكلو كسيلين Flucloxacillin على شكل أقراص عن طريق الفم.

وتظهر أعراض الحساسية للبنسلين في جسم المريض على شكل حكة وطفح جلدي (إكزيما Eczema أو شرى) وربو قصبي ووذمة وعائية عصبية في الجسم وغيرها، وقد تحدث حالة الحساسية للبنسلين نتيجة سوء استخدامه في العلاج، وقد تكون حالة فرط الحساسية لهذا العقار وقتية تختفي بعد ذلك، ثم يستطيع المريض الحساس للبنسلين استخدامه مع أحد الأدوية المضادة للهستامين أو مركب كورتيكوستيروئيد كالكورتيزون تحت إشراف طبي مباشر، ثم تختفي تدريجياً حالة الحساسية منه. وتزداد كمية الجرعات المستخدمة منه وهي حالة نادرة الاستعمال، وتحدث أحياناً صدمة الحساسية من البنسلين عند حقنه في جسم المريض الحساس له وتكون مميتة في نحو ١٠% منها، لذا يجب إجراء اختبار الحساسية للمضادات الحيوية قبل استعمالها في علاج المرضى، وخاصة مركبات البنسلين، كما يشتكي بعض الناس من حدوث حالة الإسهال عند استخدامهم بعض المضادات الحيوية كالأميسلين، ويستطيع معظم المرضى الحساسين للبنسلين استعمال مضادات حيوية

أخرى على شكل أقراص تؤخذ عن طريق الفم من نوع سيفالوسبورين Cephalosporins مثل سيفوناكزين Cefoxime، وسيفاليكزين Cephalaxim أو سيفاكزولين Cephazolam، وقد تسبب ظهور تأثيرات صحية جانبية وتفاعلات حساسية أقل في أجسام المرضى.

كما يؤدي استعمال بعض المرضى حمض نالديريك Nalidixic acid أو (Negram) وهو مضاد حيوي من نوع كيتولون Quinolone يضاد نشاط الجراثيم العضوية من النوع Proteus و Bacillus Sp المسببة لحدوث التهابات في الجهاز البولي إلى حدوث تفاعلات حساسية في أجسامهم على شكل حكة وطفح جلدي.

### الحساسية من مركبات السلفا

يعاني بعض الناس من حالة الحساسية لعقار السلفا، وهو يضم عدة مركبات مثل سلفوناميدين Sulphadimidine وسلفساديازين Sulphadiazine وسلفاتيازول (سلفانوميد Sulphonamides + ثلاثي ميثوبريم Trimethoprim) ويسمى علمياً كوا تري ميكسازول، ويعرف بأسماء تجارية مثل ميبترين أو باكتريم، وتسبب هذه الأدوية حدوث تفاعلات حساسية في أجسام بعض المرضى تظهر على شكل غثيان وشعور بالصداع وقي وإسهال واكتئاب نفسي وغيرها، ونادراً ما تسبب حدوث تفاعلات شديدة في الجلد فيما يسمى متلازمة ستيفنز جونسون Stevens Johnson Syndrome أو متلازمة لييل Lyell's Syndrome. كما يؤدي استعمال الأشخاص الذين يعانون من حالة نقص إفران أنزيم جلوكوز ٦. فوسفات ديهيدروجينيز في أجسامهم - والمعروفة بحالة التسمم بالفول Favism - أدوية السلفا إلى حدوث حالة تحلل دمائهم، لذا فهي ذات خطر شديد على حياتهم.

### الحساسية من الأمبرين

تحدث عادة حالات الحساسية من عقار



اجسام المرضى بدرجة أفضل مركبات ساليسيلات أخرى . مثل ساليسيلات الصوديوم . غير الأسبرين وظهور أعراض حساسية أقل منها . وما زالت آلية حدوث فرط الحساسية من الأسبرين غير معروفة لكن لا يحتمل أن تحدث نتيجة تفاعلات مناعية في الجسم .


#### هرمون الأنولين

ينتشر حدوث حالات الحساسية من مستحضرات هرمون الأنولين المستخلص من بنكرياس الأبقار والخنازير في أجسام مرضى البول

الأسبرين (أسيتايل ساليسليك) في الأشخاص البالغين متوسطي العمر وهي أكثر حدوثاً في النساء منهم . وتشمل أعراض متلازمة عدم تحمل الأسبرين Aspirin Intolerance Syndrome التهاب الفشاء المخاطي للأنف وسلييلات مخاطية بالأنف Nasal Polyps والتهاب الجيوب الأنفية وريو قصبي ووذمة وعائية عصبية Angioneurotic Oedema وشرى في الجلد . وكثرة الخلايا اليقة الأيوسين Eosinophilia . ويطيل الأسبرين فترة حدوث النزيف الدموي التي قد تسبب انخفاض ضغط الدم وحدوث صدمة وغشي ، وتتحمل



في جسم المريض، وتحدث حالات أقل من الحساسية لهذا الهرمون عند استعمال مستحضراته نصف الصناعية ذات درجة عالية في نقاوتها، وخاصة الأنواع التي تماثل في تركيبها الهرمون البشري، كما يعاني بعض مرضى البول السكري من الحساسية لمختلف مستحضرات هرمون الأنسولين المستخلصة من الحيوانات وليس أمامهم خيار غير استخدام مستحضرات الأنسولين البشري المحضر بواسطة تقنية الهندسة الوراثية الذي لا يسبب عادة ظهور أعراض الحساسية في أجسامهم، كما قد تحدث الحساسية للمرضى من مستحضرات الأنسولين المحتوية على مركبات حافظة كالفينول والكريزول وميثايل هيدروكسي بنزوات لإطالة فترة تخزينها.



صورة ١: أجهزة مختبرية

السكري المعتمد على الهرمون في علاجهم نتيجة احتواء هذه المستحضرات على مواد غريبة خلال عمليات استخلاصها من مصادرها الطبيعية. ولاختلاف تركيب سلسلة الأحماض الأمينية في جزيء الهرمون الحيواني عن النوع البشري منه في حمض أميني فيه، فيؤدي حقن الأنسولين في جسم المريض إلى ظهور تفاعلات حساسية موضعية في الجلد على شكل التهاب أو طفح جلدي وشرى وحكة بالجلد وتكوين وذمة وعائية عصبية. وأحياناً ضمور دهني في مواضع حقن الأنسولين في جلد المريض، وتحدث أحياناً حالة المقاومة لفعالية هذا الهرمون

# مرض التوحد

## أعراض وأسباب

### علاج

عبدالرحمن محمد العيسوي



التعريف بمرض التوحد:

الطفل شديد الانطواء أو ما يطلق عليه البعض الطفل المتوحد أو التوحدي أو الذاتوي Autistic Child هو طفل يميل إلى الانسحاب بشكل متطرف، وقد يجلس هذا الطفل لساعات طوال يلعب في أصابعه أو في قصاصة من الورق، ويبدو عليه الانصراف عن العالم، ويعيش في عالمه الخاص به، عالم من صنع خياله [الحقني، عبدالمعزم، ١٩٩٤ : ٢٨١] ويعرفه البعض

بأنه الانفلاق على النفس، والاستغراق في التفكير، وضعف القدرة على الانتباه، وضعف القدرة على التواصل، وإقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين، فضلاً عن وجود النشاط الحركي الزائد [محمد، عادل عبدالله، ٢٠٠٢ : ٢٧٠] والانطواء الشديد عبارة عن اضطراب يظهر في الطفولة وفيه ينسحب الطفل من كل العلاقات أو النشاطات الاجتماعية، وتبدو له هذه الاتصالات مؤذية، ومكروهة وتسبب له الضيق. ويوجه الطفل



Stratton, P. الاضطرابات التي يصعب علاجها |  
(and Hayes, N. 1999: 23

وتعدّ التوحدية أو مرض التوحد من اضطرابات النمو الخطيرة. حيث يميل الطفل إلى الوحدة والانعزال والانطواء والانسحاب من المحيط الذي يوجد به Aloneness حيث لا يميل إلى الكلام أو الاختلاط بالناس أو التواصل معهم بل حتى النظر إليهم. ويوجد لدى الطفل رغبة وسواسية قوية بأن يبقى كل شيء على ما هو دون

شامله نحو الأشياء غير الحية، ولكنه قد يكون على درجة عالية من الذكاء، وهو لا يتحدث إلا قليلاً جداً. ويصيب هذا الاضطراب الأطفال. وقد يمتد طوال حياة المريض، وفيما يتعلق بالأسباب التي يرجع إليها هذا الاضطراب فلا يوجد اتفاق بين العلماء حولها، ولكن الغالبية من المشتغلين في هذا الحقل يعتقدون أنه اضطراب عضوي النشأة Organic أي يرجع إلى خلل أو أسباب عضوية أو اعتماد عضوي، وهو من



الأمريكية هو لوكانر Leo Kanner حيث لاحظ من خلال عمله الإكلينيكي (١١) طفلاً يسلكون سلوكاً يختلف عن سلوك بقية الأطفال المتخلفين عقلياً children with mental retardation أو مسلكوك الأطفال المصابين بذهان فصام الشخصية Schiz- ophrenia، ولقد أطلق على هذا الاضطراب أو على جملة الأعراض هذه «التوحد الطفلي» Infant- tile Autism حيث لاحظ ميل الأطفال إلى التوحد أو الرغبة في البقاء وحدهم Aloneness حيث

تغيير أو نقل من مكان لآخر. [Davison, G. C. and] (Neale, J. M., 2001)

عندما يدخل أي شخص على الطفل المصاب بالتوحد في غرفته فإنه لا ينظر إليه، ولا يلتفت إليه، ولا يمر به أي اهتمام، وكان شيئاً لم يحدث، ويستمر مشغولاً. بما هو مشغول به من قبل ولا يهتم بمن دخل الغرفة، والحقيقة أن مرض التوحد تم اكتشافه في وقت مبكر يرجع إلى عام ١٩٤٢ عن طريق طبيب عقلي في جامعة هارفرد



Epileptic Seizures، ولا شك أن مرض التوحد يتضمن اضطراباً شديداً في عملية النمو ذاتها، وبذلك فهو يختلف عن الاضطرابات العقلية الأخرى التي تحدث في سن الرشد، ولكن اعراضه تظهر في الشهور الأولى من الحياة، ويحدث بواقع محالات في كل ١٠٠٠٠ حالة من الأطفال، ويحدث مرض التوحد بين الذكور بنسبة أربعة اضعاف نسبتها بين الإناث.

الفرق الجنسي في مرض التوحد

يصيب كثيراً من الذكور

يصيب فتلاً من الإناث

ولكنه ينتشر بين جميع المستويات الاجتماعية والعرقية أو الساللية، فلا يرتبط بالفقر أو الغنى أو بسلالة محددة،

أما عن علاقة مرض التوحد بالذكاء؛ فإن غالبية مرضاه من قليلي الذكاء (٧٠٪ نسبة ذكاء) ومعظم مرضى التوحد يعانون أيضاً من التخلف العقلي، ولذلك يصعب التمييز بين هذين الاضطرابين.


وفي الوقت الذي يحصل مرضى التخلف العقلي على درجات صغيرة في كل أجزاء اختبارات الذكاء، نجد أن مرضى التوحد يحصلون على درجات عالية في بعضها وقليلة في بعضها الآخر، حيث تقل درجاتهم في التفكير المجرد، والأمور الرمزية والمنطق، وما يرتبط بالضعف اللغوي عندهم، ولكنهم يحصلون على درجات أفضل في القدرات المكانية والبصرية، وفي الوقت نفسه قد يظهرون موهبة خارقة في بعض الجوانب Great Talent كأن يتمكن المريض من ضرب أربعة أعداد في بعضها بمجرد النظر، وقد يتمتعون بذاكرة طويلة المدى قوية، فقد يتذكر الطفل أغنية سمعها منذ سنوات، والنمو الحسي والحركي

يهمل أو يغفل الطفل كل ما يأتيه من العالم الخارجي، ولا يهتم به ويفلق نفسه دونه (Disregards, Ignores, Shuts out Anything that Comes to the Child from the Outside)، ولقد لوحظ على أمثال هؤلاء الأطفال عدم ارتباطهم بالناس منذ وقت مبكر من حياتهم، كما لاحظ ضعف مستواهم اللغوي، وأن لديهم رغبة قوية في أن يبقى كل شيء حولهم كما هو دون تغيير وعلى الرغم من أن كافر قد لاحظ ذلك منذ ١٩٤٢م، إلا أن العلماء لم يهتموا بوصفه في التصنيف المرضية إلا عام ١٩٨٠م.

الفرق بين الفصام والتوحد

ترجع صعوبة تشخيصه إلى اختلاط الأمر بشأنه مع عدة اضطرابات أخرى تحدث أيضاً في الطفولة، فلقد عدَّ بعض العلماء ذهان فصام الشخصية، بمعنى أن مرض التوحد كان ينظر إليه على أنه حالة مكررة من ذهان فصام الشخصية، ولكن تبين الآن أن هناك فرقاً بين ذهان فصام الشخصية ومرض التوحد في الطفولة والانسحاب الاجتماعي والمحافظة غير الملائمة قد تشبه الأعراض السلبية في ذهان فصام الشخصية، ولكن يكمن الفرق في أن مريض التوحد لا يعاني من الهلوس، وهي مدركات حسية زائفة يتوهمها المريض ولا وجود لها في عالم الحقيقة والواقع وكذلك لا يعاني من الهذات أو الضلالات، وهي أخطار زائفة يعتقد في صحتها الشخص الفصامي، كذلك فإن مرضى التوحد لا يوجد في أسرهم أفراد يعانون من ذهان فصام الشخصية كالشأن مع مرض الفصام.

ويلاحظ أن مرض التوحد ينتشر بنسبة أعلى بين الذكور عنه بين الإناث، وهو أمر غير موجود مع مرض الفصام، كذلك فإن مرض التوحد يأخذ طريقه في الظهور في مرحلة الرضاعة أو في الطفولة المبكرة جداً، وقد يصاحبه التخلف العقلي وتوابع من مرض الصرع Mental retardation and epilepsy.



يسهران سيرةً حسناً عندهم. فقد يظهر الطفل تصرفاً في التسلق والاهتزاز والتوازن.

لا نقول إن مريض التوحد انسحب من الحياة الاجتماعية؛ لأنه في الأصل لم يختلط بالناس منذ البداية، الأطفال الأسوياء الصغار يحبون الالتصاق بالأم. ولكن مريض التوحد لا يظهر هذه الرغبة، على الآباء بذل جهد أكبر للاتصال بالطفل والتعاطف معه، الطفل لا يحب أن يشرك والده معه في اللعب، بل انهم لا يرغبون في الاشتراك مع الأطفال الآخرين في اللعب أو بذات الدمى أو الألعاب، إذا وجد الطفل إنساناً، فإنه يستدير، أو يمتطيه ظهره، ولا يرغب أن ينظر إليه الآخرون. لا يقدمون التحية لأحد، أو يودعون أحداً لا بالكلام ولا بالتعبير اللفظي ولا حتى بالابتسامة أو الاتصال عن طريق العين أو بالإشارة أو الإيماءة، ويحضرزون ويغادرون دون إشارة، لا يسحب الطفل لكل من يريد التواصل معه، قد لا يفرق الطفل بين شخص وآخر، ولكنه يرغب في الاتصال بالأشياء غير الحية أي الحماض كالمفاتيح أو قطع الورق.

المزلة الاجتماعية تحول بينه وبين تعلم مهارات أخرى، كالمهارة اللفوية وقد لا يفهم العالم المحيط به، فلا يستجيب له، كما أنه لا يفهم الأشياء من وجهة نظر الغير ولا يفهم استجاباتهم الانفعالية والعاطفية، حيث يعانون من العجز في العاطفة أو التعاطف الوجداني أو المشاركة الوجدانية Empathy، فعندما يرى الطفل أمه تعاني من الضيق أو الألم، فإنه يتركها وينسحب بدلاً من إظهار التعاطف معها (Davison, G.C. and Neale, J.m.2001). وللأسف، فإن عدم تجاوب الطفل عاطفياً مع الوالدين، يجعلهما يمزحان عنه أيضاً، لأن استجابة الابتسامة للاب أو الأم تشجعهما على حمل الطفل ومداعبته وتقبيله ولمسه.

#### صفات مريض التوحد

- من صفاته كما يحددها الآباء ما يلي.
- يتجاهل الناس.
- يبقى بعيداً عاطفياً.
- يتعاشى الاتصال بالعين.
- لا يظهر تعاطفاً أو اهتماماً عندما تحمله أمه.
- يشعر بالتعجز والجمود عندما يحمله أحد.
- يتجاهل التعاطف.
- ينسحب من التعاطف.
- يبدو عليه أنه لا يحتاج إلى أم.
- لا يمي غياب أمه.

(المصدر داته ٢٠٠١: ٤٤٥)

حتى الشاغم أو الأصوات التي يصدرها الطفل الرضيع Babbling لا توجد لدى هؤلاء الأطفال، واتصالاته اللفوية، بعد ذلك، تمتاز بعدة خصائص منها ما يعرف باسم الترددية أو التكرارية أو ما يمكن أن يطلق عليه

هو he

هي she

أنت you

فإذا سألته: أنت اسمك أيه؟ قال أنت اسمه عباس (مثلاً).

ويتصل هذا العرض بمرض الترددية، حيث يشير إلى نفسه كما يسمع الآخرين يصفونه.

الأب: ماذا تفعل الآن يا إسماعيل؟

الابن: إنه هنا

الأب: هل تستمتع بوقت حميل؟

الابن إنه يعرفها

ظاهرة قلب الضمائر هذه قد تتلاشى، وقد تستمر طويلاً، وقد يحتاج الطفل إلى تدريب مكثف لتعلم الوضع اللغوي الصحيح، ومن خصائص اللغة عند هؤلاء الأطفال كذلك ظاهرة اختراع الكلمات أو استخدام الكلمات في غير موضعها أي اختراع ألفاظ أو كلمات جديدة Neologism, made-up Words فقد يشير الطفل إلى اللبن الحليب مثلاً بكلمة أخرى (المصدر ذاته ٢٠٠١: ٤٤٧).

ومن بين خصائص هؤلاء المرضى أنهم «حرفيون» في استخداماتهم اللغوية Very Literal فإذا حمل الأب ابنه عندما قال الابن كلمة «نعم»، وعلى ذلك فكلمة أراد الولد أن يحمله والده قال له «نعم» فالحقيقة أن مرضى التوحد يعانون من عجز واضح في عملية الاتصال بالآخرين أو التعبير عن ذاتهم.

#### العجز في الاتصال

Communication هو السبب في تخلفهم الاجتماعي، أي عجزهم في التفاعل الاجتماعي والأخذ والعطاء، وإقامة علاقات اجتماعية، ولذلك يشعرون بالتعاطف عندما يتم تعليمهم الكلام، ولكن حتى بعد تعلم الكلام، فإنهم يظلون يعانون من العجز في التفاهة اللفظية كما أن حديثهم متفرق أو متناثر أو غير كثيف أو ضئيل



المصادرة (من الصدى) Echolalia حيث يرد الطفل أو يعمل صدى لما يسمع فقط من أي شخص آخر، فقد يسأله المدرس هل ترغب في تناول فطيرة؟

فيرد الطفل قائلاً: هل ترغب في تناول فطيرة؟ العبارة نفسها أو السؤال نفسه يردده دون إجابة، هذه الترددية الآتية أو الحالية، ولكن الطفل قد يسمع كلمة اليوم ويردها غداً.

ولقد كان العلماء يعتقدون أن هذه الترددية لا وظيفة لها، ولكن الآن ينظر إليها على أنها محاولة من جانب الطفل للتواصل، فقد يرغب في الحصول على هذه الفطيرة.

ومن الخصائص اللغوية أيضاً لدى الطفل المتوحد ما يعرف باسم قلب الضمائر Pronoun Reversal فالطفل يشير إلى نفسه بكلمة أو بضمير «هو» أو إذا كان المريض أنثى يشير إلى نفسه بكلمة «هي» أو كلمة أنت.

أربعة منهم قضوا معظم حياتهم داخل مؤسسات الإيواء.

ثلاثة منهم ظل أحدهم أحرس، ولكنه عمل في مزرعة، وكان يعيش في بيت من بيوت الرعاية. اثنان منهم حققا شفاءً جيدًا وظلا يعيشان مع أسرهما، ولم يكن لهما حياة اجتماعية إلا قليلا، وعملا وكسبا من وراء هذا العمل، ولقد كونا اهتمامات حول بعض النشاطات الترويحية أو الترفيهية.

وهناك دراسات تتبعية أخرى اتفقت مع هذه الصورة القاتمة، فلقد تبين أن هناك ٥- ١٧% من هؤلاء الأطفال حققوا تكيفا جيدًا في مرحلة الرشد، وعاشوا حياة مستقلة، ولكن مع بعض البقايا من المشكلات مثل الخجل أو الارتباك في المواقف الاجتماعية، الباقون عاشوا حياة محدودة، وتم إيداع نصفهم في المستشفيات والمؤسسات.

ولقد أوضحت الدراسات الحديثة أن الأطفال أصعب نسبة الذكاء العالية، الذين تعلموا الكلام قبل سن السادسة، حققوا نتائج جيدة، وقليل منهم تصرفوا في الرشد تصرفا سيئاً تقريباً، ويدل بعض الدراسات التتبعية أو الطولية أن معظم هؤلاء الأطفال لا يحتاجون الإيداع في المؤسسات، بل إن بعضهم التحق بالكليات الجامعية واستطاع أن يعمل نفسه من خلال العمل، ولكن العجز يبدو في مجال العلاقات الاجتماعية Social Relationships، فقبل صدور قانون حماية العجزة في عام ١٩٧٥م، في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يطردون من المدارس العامة، ولم يتمتموا ببرامج التعليم المكثف أو التدخل التربوي المكثف أو البرامج السلوكية في العلاج.

ولذلك نحن في حاجة إلى إجراء العديد من الدراسات التتبعية لمعرفة ما إذا كان هذا الاضطراب شديداً كما كان في الماضي، وقيل وضع برامج تدريب وتعليم مرضى التوحد وقيل الاهتمام الاجتماعي هؤلاء الأفراد [المصدر ذاته ٢٠٠١: ٤٤٩]

Sparse ولا يستخدمون اللغة استخداماً صائباً، من بين الأعراض الشائعة رغبتهم الوسواسية في المحافظة على الأعمال شكل طقوسي وفهري هم Obsessive-Compulsive and Ritualistic acts يشعرون بالضيق من تغيير حياتهم الروتينية أو تغيير الأشياء المحيطة بهم، فإذا قدم له كوب من الحليب ولكن في كوب آخر شعر بالضيق، وإذا غيرت الأم ترتيب الأثاث في غرفته شعر بالضيق، بل قد يبكي وينفجر غاضباً أو يفقد أعصابه Temper Tantrum فإذا كانت الأم معتادة أن تحيي ابنها في كل صباح قائلة: «صباح الخير يا محمود، أنا سعيدة جداً جداً لرؤيتك».

فإذا حدث أي تفهّر في أية لفظة أو إذا حذفت كلمة «جداً» وأبقيت على واحدة فقط، انزعج الطفل أو إذا أضافت الأم كلمة أخرى «جداً جداً جداً»، صاح الطفل، وهكذا في العابه يلتزم بالروتين اليومي دون تغيير، وعندما يكرر يلتزم أيضاً بمواعيد القطارات والمترو والسيارات العامة، ويلتزم بالسير في الطريق الفرعي نفسه الذي يسلكه كل يوم.

وقد ينشغل الطفل ببعض السلوكيات الطقوسية النمطية مثل حركة اليد أو الذراع، ويلتزم ببعض السلوكيات النمطية مثل المرجحة في الحركات الغريبة أو اهتزاز الجسم Body Raking أو فرقة الأيدي Hand Flopping أو المشي على أطراف الأصابع، ويلعبون بالخيط أو العصي أو الأقلام أو الأطباق، نشاطات مثارة ذاتياً عندهم، يشغل الطفل نفسه بتحريك شيء ما، ويفضّب جداً إذا منع من ذلك.

ماذا يحدث للطفل المتوحد عندما يكبر؟ لقد تابع كاتر أطفاله الأحد عشر الذين بدأوا دراستهم في العام ١٩٤٣م، ووجد حالتهم كالآتي

اثنا عشر منهم عانوا من نوبات من الصرع، ثم مات واحد منهما والآخر ظل في إحدى المستشفيات الحكومية.





#### ما أسباب نشأة مرض التوحد؟

ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو ما الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا الاضطراب المثير في مجال البحث عن العوامل السببية لهذا الاضطراب Etiology of Autistic Disorder لقد كانت الدراسة التتبعية، في هذا الصدد، ترجع إلى عوامل نفسية Psychogenic أي أن العوامل النفسية هي المسؤولة عن نمو هذا المرض، ولكن ظهر حديثاً

#### اتجاه يؤيد وجود عوامل بيولوجية أي حيوية أو

بدنية في نشأة هذا المرض Biological Factors . لقد لاحظ العلماء السابقون أن ذكاهم كان متوسطاً، وأن مظهرهم ووظائفهم الفسيولوجية كانت تبدو طبيعية، ولذلك استبعد القدماء وجود عامل بيولوجي أي عضوي في نشأة هذا المرض، كانت الأنظار تتجه نحو الظروف الأسرية، والحقيقة أنه يمكن قحص العوامل التالية عند



النظر في نشأة هذا الاضطراب

. نظرية التحليل النفسي.


. نظرية المدرسة السلوكية.

. النظرية البيولوجية.

. نظرية العوامل العصبية.

[المصدر ذاته ٢٠٠١ : ٤٤٩]

ويقول بعض أنصار الاتجاه التحليلي في تفسير مرض التوحد، إن البِلادة Apathy وفقدان الأمل اللذين لوحظا بين نزلاء معسكرات التركيز الألمانية النازية German Concentration Camps في الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥م) يوجدان لدى مرضى التوحد، وعلى ذلك يفترض أن هناك عوامل سلبية حدثت لهم في الطفولة المبكرة، وعلى ذلك فالرضيع رهض الآباء، وأدرك مشاعرهم السلبية، ورأى الصغير أن سلوكهم لا يؤثر في اتجاه الآباء نحو عدم الاستجابة له، ولذلك اعتقد الصغير أن جهوده لا يمكن أن تؤثر



الوسوسة Metaculous أو شدة التدقيق في التوافه والتفاصيل. كأن يعمل هؤلاء الآباء إلى عزل أنفسهم أو عدم الارتباط أو عدم الانتماء إلى أبنائهم Disaffiliate إلى جانب البرود العاطفي والشك والسخرية والتشاؤم والنقد Cynical في العلاقات الشخصية. وبعضهم كان يتسم بالسلبية والبلادة Apathetic فيما كان بعض آخر وسواسياً في علاقاته بالناس.

ولكن هذه كانت مجرد انطباعات إكلينيكية ولم تؤدِّ إليها الدراسات التجريبية، من ذلك دراسات أجريت مقارنة بين هؤلاء الآباء وآخرين. ووجدوا سواء في الدفء والتعبير الانفعالي والاستجابة والاتجاه الاجتماعي أو النزعة الاجتماعية.

والحقيقة أن هؤلاء الآباء لديهم أطفال آخرين تربوا بمعرفتهم أيضاً وشبوا أسوأ. يضاف إلى ذلك أن رد فعل الآباء إذا كان شاذاً، فقد يكون ذلك رد فعل لسلوك الطفل نحوهم وليس العكس.

سببه لا يزال غير واضح

مصدر

سلبية الآباء نحو الطفل

لا يوجد دليل على أن أسر هؤلاء كانت تعامل هؤلاء الأطفال معاملة سيئة أو كانوا يعانون من الحرمان Deprivation أو الإهمال، ولذلك فإن إسناد هذا المرض للآباء فيه ظلم كبير.

**الأسباب البيولوجية أو الأسباب البيولوجية لمرض التوحد**  
من ذلك ما يشاهد من ظهور هذا المرض في سن مبكرة جداً من حياة الطفل قبل أن يتأثر بالعوامل والظروف البيئية. وهناك أدلة مستمدة من علم الأعصاب والوراثة مما يوحي بوجود أسباب بيولوجية لمرض التوحد.

الدراسات الوراثية تواجهها صعوبة هي ندرة هذه الحالات، وفي القلب فإن مريض التوحد لا يتزوج، ومن الأدلة الوراثية أن نسبة انتشارها بين

في العالم، لأنه شبه معتقداً أن العالم غير حساس بالنسبة له، ويذهب أنصار هذا الرأي إلى القول: إن مريض التوحد لم يدخل إلى هذا العالم، ولذلك لجأ إلى الاعتماد عن العالم حتى يتحاشى الآلام والإحباط.

وهناك اتجاه تحليلي جديد ينظر لمرض التوحد على أنه أحد صور ضغط ما بعد الصدمة في شكله الطفولي Posttraumatic Stress كصدمة القطار والحرمان من الثدي، والشعور بالانفصال عن الأم Separation وذلك يلجئ الطفل إلى الانزواء Insulation.

وهناك اتجاه تحليلي أيضاً يرى أن مريض التوحد ينشأ من جراء وجود استعداد بيولوجي لدى الطفل ويظهر عندما تكون الأم قلقة أو مشغولة البال أزيد من اللازم، إذا عجزت عن فهم طبيعة رضيعها.

وبالمثال: فإن المدرسة السلوكية تفسر نشأة مرض التوحد بالقول: إن الطفل تعلم بعض الخبرات التي أدت إلى إصابته بمرض التوحد، من ذلك عدم توجيهه الآباء، وخاصة الأمهات الانتباه لطفلهم، مما يمنع تكوين الترابط بين الطفل وغيره من الناس، فلا يجعل منهم قوى معززة ومشجعة للطفل، الآباء هنا لا يعززون أي لا يشجعون حاجات الطفل، ولا يقدمون له المكافآت، ولذلك فهم عاجزون عن السيطرة على سلوك الطفل. ولذلك يصاب بالتوحد أي العزلة والانطواء والانسحاب وعدم التواصل.

ولكن ما الموقف العلمي من إرجاع مرض التوحد إلى عوامل سيكولوجية؟  
[المصدر ذاته ٢٠٠٩: ٤٤٩]

تذهب النظريات النفسية إلى القول: إن للآباء دوراً في نشأة مرض التوحد، فما سمات هؤلاء الآباء؟ لا بد أن معاملة الآباء للأبناء كانت سيئة، أو مدمرة للغاية. فلقد وصف هؤلاء الآباء بالبرود العاطفي، وعدم الحساسية، والانطواء والتباعد عن الأطفال، وأن لديهم جفاف عقلي

الأطفال العام، ومعروف أن إصابة الأم بالحصبه الألمانية في مرحلة الحمل قد تؤثر في دماغ الجنين Fetus Brain هذه الأدلة إلى جانب ارتباط التوحد بالتخلف العقلي تجعلنا نؤكد أنه يرجع لأسباب بيولوجية [المصدر ذاته ٢٠٠١: ٤٥٢] - إلى جانب كبر حجم الدماغ.

#### أساليب العلاج والوقاية

هناك محاولات عدة لمعالجهم وتحسين أحوالهم، ولقد كانت المحاولات الأولى في العلاج، شأنها في ذلك شأن مبحث السببية، كانت سيكولوجية في طبيعتها، ولقد أظهر بعض هؤلاء المرضى تحسناً ملحوظاً، العلاج يستهدف التقليل من سلوكهم الغريب مع تحسين قدراتهم على الاتصال وتنمية المهارات الاجتماعية.

والحقيقة أن التدريس لهم يعد مهمة صعبة، فهم لا يقبلون التغيير في الروتين أو في تحريكهم الداني، الأمر الذي قد يعرقل عملية التدريس، وهناك صعوبة تكمن في حفزهم أو دفعهم للنشاط، ولذلك يلزم أن يكون التمييز واضحاً ومجسداً وبارزاً من ذلك التمييز عن طريق المديح مع تقديم الطعام الذي يحبه المريض، فضلاً على أن الطفل يختار فقط ما ينتبه إليه، وقد يكون جزءاً فقط من الموقف، ويترك بقية العناصر، ولذلك فهو لا ينقل ما يتعلمه في مجال إلى مجال آخر، ومع ذلك هناك برامج حققت نجاحاً جيداً في تعليمهم وعلاجهم.

من ذلك العلاج السلوكي، واستخدام التشريط الأدي أو الأداثي Operant Conditioning لتعليم الأطفال الكلام والنطق، والتقليل من عادة الترددية، وتشجيعهم على اللعب مع الأطفال الآخرين، والاستجابة للكبار، ويشترك الآباء في تنفيذ هذه البرامج في المنزل. وتقدم التمييزات للأطفال إذا كفوا عن العدوان، وإذا التزموا بالطاعة، وكانوا اجتماعيين أكثر، كاللعب والكلام مع الآخرين، وهم يستفيدون أكثر إذا عاشروا

الأخوة تبلغ ٧٥ ضعفا مقارنة بالحالات السوية، وهناك أدلة قوية جداً مستمدة من دراسات التوائم Twins Studies تشير إلى الانتقال الوراثي Genetic Transmission وتبلغ هذه النسبة (٦٠-٩١٪) بين التوائم العينية Identical Twins وهم من أصحاب الوراثة الواحدة أو الاستعداد الوراثي الواحد، مقارنة بنسبة تراوح من صفر إلى ٢٠٪ بين التوائم الأخوية Fraternal Twins [المصدر ذاته ٢٠٠١: ٤٥١]

الدراسات التي تتبع التوائم كشفت أن مرض التوحد يرتبط وراثياً بنوع من الضعف في القدرات الاتصالية والاجتماعية، ظهر ذلك في شكل العجز عن الحياة حياة مستقلة أو المعاناة من وجود علاقات فيها صراع؛ من وجوه العجز في الاتصال ضعف اللغة أو تأخرها أو العجز في القراءة والعجز الاجتماعي، كان تنحصر علاقات الطفل الاجتماعية داخل دائرة الأسرة فقط، والعجز عن الاستجابة للأمور الاجتماعية أو التقاليد الاجتماعية، مع عدم وجود التعاطف الثقافي مع من يعطف عليه أو يقدم له الرعاية، وعلى ذلك، فإن الدراسات التي أجريت على التوائم وعلى الأسر، تؤكد وجود أساس بيولوجي لهذا المرض.

ولقد كشفت الدراسات عن وجود عامل عصبي كوجود موجات مخية شاذة، كذلك وجد أن أدمغتهم أكبر حجماً أو يوجد تضخم في الدماغ أو وجود شذوذ في أدمغة هؤلاء، كذلك وجد ضعف في قدرتهم على الانتباه أو على تحويل الانتباه بسرعة من شيء لآخر، ولذلك لا يستجيب هؤلاء المرضى للمعلومات التي تقع خارج دائرة تركيزهم أو بؤرة انتباههم.

ولقد وجد أن هناك ٣٠٪ من المراهقين من أصحاب هذا المرض يعانون من مرض الصرع، وهو مرض دماغي، كذلك وجد أن مرض التوحد يوجد بين أبناء الأمهات اللاتي أصبن بالحصبه الألمانية Rubella في فترة ما قبل ولادة الطفل Prenatal وذلك بنسبة عشرة أضعاف وجودها في مجتمع



Self Mutilation والمدوان، ولكن هناك كثير من الحالات التي لم تستجب لهذا العقار، كما أنه لا يظهر تحسناً في الجانب اللغوي أو في إقامة العلاقات الاجتماعية، ويخشى أن يكون له بعض الأعراض الجانبية، ويستخدم أيضاً عقار يسمى Fenfluramine، ويفترض أنه يحدث تحسناً فيما يلي من الأعراض:

- سلوك المريض.
- تفكير المريض.
- التكيف الاجتماعي.
- توسيع دائرة الانتباه.
- ارتفاع مستويات النشاط.
- تحسين السلوك النمطي.

ولكنه لا يحدث أثراً في أمور عقلية مثل نسبة الذكاء والوظائف اللغوية، ويعالج بعض هؤلاء المرضى عن طريق العقارات التي تعالج فرط الحركة Hyperactivity وبعض المعالجات أدت إلى تحسن في اتخاذ المبادأة في عملية الاتصال، وفي جميع الأحوال يلزم الحذر تحاشياً لحدوث الآثار الجانبية التي من بينها إصابة المريض نفسه بالجروح من جراء تعاطي العلاج الدوائي المصدر ذاته ٢٠٠١: ٤٥٤ .

## المراجع

١. الحفيص، عبدالمعزم (١٩٩٦م) موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، مكتبة مدبولي، القاهرة.
٢. محمد، محمّد عبد الله، (٢٠٠٣)، الأطفال التوحديون: دراسات تشخيصية وبرامجية، دار الرشاد، القاهرة.
- 3-Davison, G.C., and Neale, J. M. Abnormal Psychology. Wiley, London.
- 4- Stratton, P. and Hayes, N., (1999) Astudent's Dictionary of Psychology. Arnold, London.

أطفالاً أسوياء أكثر من عزلهم مع مرضى آخرين. ولقد أدى العلاج بأحد البرامج السلوكية المكثفة إلى تحسين نسبة الذكاء إلى ٨٢ نسبة ذكاء، مقارنة بنسبة ذكاء ٥٥ لدى المجموعة الضابطة الذين لم يحضروا هذا البرنامج المكثف، وتسهم الأسرة في المعالجة أكثر من المؤسسات العلاجية بعد أن يتلقوا تدريباً في معالجة أبنائهم، فالمعالج يستهدف:

## أهداف العلاج

- زيادة درجة الاستجابة.
- زيادة درجة الدافعية.

كذلك فإن إتاحة الفرصة للطفل لاختيار مادة التعلم وتوفير التعزيزات الطبيعية مثل اللعب مع الآخرين.

الاستجابة خاصة من خلال  
سهم

حصوله على التمرير أو المكافأة

تفاعل الأسرة واتصالها الإيجابي يقودان إلى تحسن حالة الطفل، وإلى جانب الأسرة، هناك المؤسسات العلاجية، ويتوقف الأمر على ظروف الأسرة، فليمت جميع الأسر قادرة على تقديم هذه الرعاية المكثفة المصدر ذاته ٢٠٠١: ٥٣ . أما العلاج وفقاً لمنهج التحليل النفسي، فيستهدف توفير الدفء والحب والحنان لتشجيع الطفل، على دخول الحياة، ويتطلب ذلك الصبر والاهتمام الإيجابي دون مقابل في رد الطفل حتى يثق في الآخرين، ويقيم علاقات معهم.

ويستخدم العلاج الدوائي المستخدم لعلاج حالات قصار Halopendol ولقد كشفت بعض الدراسات أنه يقلل من الانسحاب الاجتماعي، ومن السلوك النمطي الحركي، والسلوك غير المتكيف، ومن ذلك إفساد الذات أو تشويه الذات

# التحريك في مصر مصر: كل يوم منذ 1952


عدنان هزاع البباتي



عام ٢٠١٥م، ويرجع هذا الفرق إلى تحسين كفاءة الطيران (١).

ولمعرفة تأثير حركة الطيران والانبعثات التي تطلقها في الغلاف الجوي، سنحاول في هذا البحث دراسة الجسيمات والغازات التي تنبعث من الطائرات في طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير. ودور هذه الغازات والجسيمات في تعديل الخصائص الكيميائية للغلاف الجوي. وكذلك أثرها في تعديل الخصائص الإشعاعية

على الرغم من مرور أقل من قرن واحد على انطلاق أول طائرة بمحرك إلا أن صناعة الطيران شهدت نمواً سريعاً، وأصبح الطيران جزءاً أساسياً من حياتنا المعاصرة. فقد بلغ عدد أسطول الطائرات المدنية عام ٢٠٠٠م، نحو ١٢ ألف طائرة. ونمت حركة الركاب الجوية بنسبة ٩٪ منذ عام ١٩٦٠م، ومن المنتظر أن تزداد بنحو ٥٪ حتى عام ٢٠١٥م. بينما سيزداد الاستخدام الكلي لوقود الطيران بنسبة ٢٪ في كل سنة حتى



الغلاف الجوي بما قد يؤدي إلى تغيير المناخ العالمي. وكذلك اثرها هي طبقة الأوزون بما يعبر الأشعة فوق البنفسجية التي تصل الى سطح الأرض. وسنحاول في هذا المقال هذه المشكلة من خلال المحاور الآتية:

الطائرات وتعدل الخصائص الكيماوية للغلاف الجوي. تطلق الطائرات حميمات وغارات في طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير وتؤثر هذه

الحسيمات والغارات هي الخصائص الكيماوية للغلاف الجوي. فهي تغير نسبة تركيز الغازات الدفينة في الغلاف الجوي، ولا سيما ثاني أكسيد الكربون والأوزون والميثان. وأهم ابعثات الطائرات هي ثاني أكسيد الكربون وبحار الماء وأكسيد النيتريك وثاني أكسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت.

ولأن ثاني أكسيد الكربون يظل فترة طويلة في الغلاف لجوي قد تزيد على قرن، فإن كمية



الانبعاثات من الطائرات تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري

انبعاثه من الطائرات لا يمكن تمييزها عن الكميات نفسها الناجمة عن مصادر أخرى. أما الغازات الأخرى والجسيمات، فإنها تبقى في الغلاف الجوي مدة أقصر، وتتركز بالقرب من الطرق الجوية، ولا سيما في دوائر العرض الوسطى في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وتؤدي هذه الانبعاثات إلى حدوث القسر الإشعاعي (١) الذي يوجد بالقرب من الطرق الجوية.

ويمكن الاستدلال على متوسط التغيرات المناخية في العالم بمتوسط القسر الإشعاعي العالمي. ونظرًا لأن جزءًا من إسهام الطيران في القسر الإشعاعي موجود أساسًا فوق دوائر العرض في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن حالة المناخ في هذا الإقليم تختلف عن حالة المناخ المحسوب بمتوسط



الانبعاثات من محركات الطائرات تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري





القارات الذهبية إلى تبريد سطح الأرض. وكان تركيز الميثان عام ١٩٩٨م أقل بنسبة ٢٪ تقريباً مما هو عليه في أجواء الغلاف الجوي الخالية من الطائرات. وتغطي ذبول دحار الطائرات نحو ١ ٪ من سطح الأرض. ولكن هذه القيمة تكون أكبر في بعض الأقاليم. إذ تغطي ٥ ٪ من منطقة وسط أوروبا ويعمل الدخان على احتراق سطح الأرض.


#### الطائرات وأثرها في طبقة الأوزون.

يعد الأوزون من الغازات الدفيئة. وتطعم طبقة الأوزون في السترووسفير وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض وتسبب أكاسيد الستروجن المبيضة من الطائرات في كيمياء الأوزون. ولقد كثفت انبعاثات أكاسيد الستروجن من محركات الطائرات تركيز الأوزون في طرق

#### القصر الإشعاعي العالمي.

ويمكن موازنة تأثير مختلف الانبعاثات الاصطناعية في المناخ باستخدام مفهوم القصر الإشعاعي. فقد بلغ القصر الإشعاعي الناجم عن الطائرات في عام ١٩٩٨م. نحو ٠.٥ واط/ متر مربع. أي نحو ٥ ٪ من مجموع القصر الإشعاعي الناجم عن جميع الأنشطة الصناعية. وبلغت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها الطائرات نحو ١٦ ٪ حياً من الكربون سوياً. وهذه الكمية تمثل نحو ٢ ٪ من مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونحو ١٣ ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جميع وسائل النقل.

ويستؤدي انبعاثات أكاسيد الستروجن لمنفعة من الطائرات التي تعميم تركيز الميثان في الجو. ويؤدي حمض سلف الميثان. وهو أحد




الطيران فوق دوائر المرض المتوسطة في نصف الكرة الشمالي بنسبة ٦٪ موازنة بالمجال الجوي الخالي من انبعاثات الطائرات، لكن انبعاثات الكبريت ويغادر الماء التي تطلقها الطائرات في الستراتوسفير تستنفد الأوزون وتلقي جزءاً من زيادة الأوزون الناجمة عن أكاسيد النيتروجين.

أما معدل الجرعة الملهبة، وهو الإشعاع فوق البنفسجي الذي يسبب الحروق الجلدية، التي تعزى إلى استنفاد طبقة الأوزون فبلغ نحو ٤٪ في الفترة من ١٩٧٠ إلى ١٩٩٨م، عند دائرة عرض ٤٥ شمالاً في شهر يوليو ٢٠٠٠.

الاستنتاجات والتوصيات.

لا تزال هناك أمور غير مؤكدة تحد من قدرتنا على وضع إسقاطات لآثار الطيران في

- المناخ وطبقة الأوزون. وتحتاج هذه النقاط إلى الكثير من البحث والدراسة وأهمها:
- دور أكاسيد النيتروجين في تغيير نسب تركيز الأوزون والميثان.
- انتقال الغازات والجسيمات إلى طبقة الستراتوسفير.
- استجابة الطقس للاضطرابات التي تحدث في طبقة الستراتوسفير.




- إن تحسين تكنولوجيا الطائرات والمحركات سيعود بفوائد بيئية، لكن هذه الفوائد لن تلقي تأثير الانبعاثات المتزايدة الناتجة من النمو المتوقع في حركة الطيران، لذا نقترح أن تشمل السياسات الرامية إلى تقليل الانبعاثات ما يأتي.
- وضع حدود تنظيمية أكثر تشددا لاسعاات محركات الطائرات
- إلغاء الإعانات والحوافز التي لها عواقب سلبية على البيئة.
- فرض جبايات بيئية حسب حركة السوق لتشجيع الابتكار التكنولوجي وتحسين الكفاءة.
- مبادلة الانبعاثات.
- إجراء البرامج البحثية.
- الاستعاضة عن السفر الجوي باستخدام طرق النقل البرية والبحرية.
- ترخيص الطائرات بناء على انبعاثات محركاتها كوسيلة لخفض انبعاثات معينة.

#### المراجع والهوامش

- 1- Ipcc, Special Report, 1999, Aviation and the Global atmosphere, A Special Report of Ipcc Working Group2
- 2- القسور الاشعاعي، هو مقياس لمدى التغير المحتمل في المناخ، وهو يبين الاضطراب أو التغير في توازن الطاقة بين الأرض والغلاف الجوي معبرا عنه بالواط/ متر مربع، وتدل القيم الايجابية للقسور الاشعاعي على الاحترار، والقيم السلبية على التبريد. انظر، WMO, Glossary of Scientific, and technical meteorological terminology, WMO/TD- No.135,1987
- 3- Ipcc, Special Report,1997, the Regional impacts of Climate Change: An assessment of Vulnerability, A Special Report of IPCC Working Group2, pp.18.22




- قدرة الحسيمات على تغيير العمليات الكيميائية.
- تقويم الآثار الاقتصادية التي مستجم عن خفض الانبعاثات في مجال صناعة الطيران.
- فهم الآثار الاقتصادية والبيئية للوفاء بالتصورات المحتملة لبلوغ الاستقرار في نسب تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، بما في ذلك تدابير تقليل انبعاثات الطيران



كمومية أخرى أقل استثماراً، تدعى السبين (Spin). يمكن أن توسع إلى مدى بعيد منافع هذا الجسم .. يتطلع العلماء والباحثون في الوقت الحاضر للاستفادة من الخاصية السبينية للإلكترون في تشييد علم جديد تماماً يعرف بسبين الإلكترونيات، أو اختصاراً السبينترونيات فما هو علم السبينترونيات ؟

السبينترونيات، كما ذكرنا سابقاً، كلمة تعنى مزيجاً من الإلكترونيات والسبين. ويعرف السبين

جميع الأجهزة الإلكترونية، بدءاً من الواديو حتى الحواسيب تعتمد على مظهر واحد للفيزياء دون لدرية؛ الشحنة الكهربائية للإلكترون. فالشحنة هي التي تجعل تدفق التيار الكهربائي من خلال شبكة من الأسلاك ينجز أشياء نافعة وكسيرة. من أهمها احتزان المعلومات، بناء على ذلك، فالإلكترون في قلب علم الإلكترونيات وتطبيقاته الواسعة الانتشار لكن بالإضافة إلى شحناتها الكهربائية، تملك الإلكترونات خاصية




أخرى. مما يسمح بقياس السبين ومعالجته ليمثل الرقم 0 و 1 في المرحلة الرقمية.

يصبح لنا مما سبق ن السبيتروبيات تتيح لنا فرصة الاستفادة المردوحة من خاصية كون الإلكترون له شحنة كهربائية وله عزم دائري أيضا ومن الممكن في نهاية المطاف ن توفر لنا هذه الخاصية دعامة قوية للحواسيب التي تستخدم المحهودات الميكانيكية الكمومية لانجاز الحسابات وإذا استغلنا معالجة

سبانه العزم الدوراني الدائري الذي يجعل الإلكترونات تقوم بدور المغناطيس الصغيرة الحجم. التي يكون لها قطب شمالي وأحمر جنوبي. وبما ان الإلكترون يمكن ان يوجد في احدى حالتين سبين علوي او سبين سفلي. فيمكننا التمييز بين الحالتين بواسطة الطريقة التي نتوجه بها الحقول المغناطيسية المعاندة لن الإلكترونات وفق الشمال الجنوبي او الجنوب الشمالي. وهكذا فان تطبيق حقل مغناطيسي خارجي سيقبل الإلكترون من حالة الى





حقلاً مغناطيسياً ذاتياً. وهذا هو السيب الذي يجعل السببوترونات، من عدة وجوه، وسيلة مثالية لتمثيل الصفر والواحد. لغة ثنائية التشغيل - الإغلاق التي تستخدمها الحواسيب في عملها. ففندما يكون السيبين - وهو جهة الحقل المغناطيسي للإلكترونات - متجهاً نحو الأسفل، فذلك يمثل الصفر، أما عندما ينقلب السيبين إلى الأعلى، فذلك يمثل الواحد. يمكن أن يتشابك السيبينان معاً، على نحو لا يمكن لأي منهما أن يتوجه بوضوح نحو الأعلى أو نحو الأسفل، بل يعدان تجميعاً لكل من الاحتمالين. وهذا يشابه مفارقة قطرة شرودينجر الشهيرة التي تعدّ حية وميتة في الوقت نفسه، من جراء وضعها في صندوق مغلق مع مادة سامة .

بما أن السيبين يوجد في الحالتين معاً، فالحاسوب الكومبيوتر المبنى على خاصية السيبين يمكنه باستخدام السيبين، من الناحية النظرية، أن

السيب ميكانيكياً، نكون بذلك قد حصلنا على متحول جديد نتلاعب به، كما يقول مارك جونسون، أحد الباحثين في مختبر نافال للأبحاث في واشنطن. وفي مسؤتمر السببوترونات الذي عُقد في واشنطن عام ٢٠٠١، راجع المؤتمر الإنجازات الحاصلة والتحديات المتفاوتة التي تواجه العاملين في هذا الميدان. وقد تبين لهم بشكل قاطع أن استخدام السببوترونات يعزز تزايد سعة الحواسيب التي تستعمل الأقراص الصلبة، عندما تتم صناعة الجزء الذي يقرأ المعطيات من أطباق دوائر أشد حساسية للحقول المغناطيسية .

يلوح في الأفق العلمي القريب احتمال إنتاج ذاكرة للحواسيب - مبنية على السيبين، تدعى ذاكرة القراءة والكتابة المغناطيسية Magnetic Random Access Memory، أو اختصاراً M-RAM . يمكنها أن تسترجع المعلومات بعد إغلاق الجهاز وربما تلتفي زمن الإقلاع الذي يحتاج إليه الحاسوب كلما أردنا تشغيله. وفي حين حصل تحسن مفيد في صناعة الأقراص الصلبة ورقائق الذاكرة، لا يزال الباحثون في مجال السببوترونات يفتشون عن شيء ما يدفع الحقل في الطريق الذي يجعله يقوم بدور محولة إلكترونية من أنصاف النواقل. لكن هذا الأمر لن يحدث غداً أو بعد غد، ولن يجد الناس تطبيقاته المفيدة في متاجرهم بين عشية وضحاها. وحالياً، فإن معظم الباحثين في هذا المجال يتقاسمون الهدف البعيد نفسه: استخدام السببوترونات لبناء حواسيب من طراز جديد لها ميزة الطبيعة القريبة التي للميكانيك الكومبي، يمكنها من إنجاز جميع الحسابات المتفرقة في وقت واحد .

يمكن عدّ الإلكترونات وكأنها بلابل تدور وفق جهة عقارب الساعة أو عكس الاتجاه ولكن بسرعة ثابتة دوماً، وأن الدوران الذاتي لها يولد

أحرون من جامعة سانتا بربارا أن بالإمكان أخذ الإلكترونات سببيات مصطلحة نحو الأعلى في نصف ناقل من 'رسييد الجاليوم ودفعها في صحيفة محاورة مكونة من نصف ناقل آخر، هو سيلينيوم الترك.

ومن الحدير ذكره، 'إن الإلكترونات تبقى مصفوفة نحو الأعلى عندما تغير من صفيحة إلى أخرى. هكذا تصيح إحدى العقبات التي تواجه الباحثين في السينيتروبيات هي أن بوبة المرور بين الصميجتين تحلط من دور انتظام سبيات الإلكترونات، ويمكن لأرسييد الجاليوم، كما يمين باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن يعمل كبطارية سبينية. تجهز بانفجارات من الإلكترونات ذات السبيات المصنفة وفق ما هو مطلوب.

أحد الطرق لخلق حوران من الإلكترونات المصنفة السبي هو أن بطمر في نصف ناقل عنصر الكوبالت أو ذرات مغناطيسية أخرى. يمكن لها أن تدفع برفق سبيات الإلكترون باتجاه واحد. وحتى عهد قريب، فإن أنصاف نواقل مغناطيسية كهذه لا تعمل إلا عند درجات حرارة منخفضة فقط، لكن هناك بعض النقصيات تفيد أنها تبقى مغناطيسية حتى ١,٦٠٠ درجة فهرنهايت.

ومع النحس الحاصل في تقنية ايجاد الكتروبيات مصممة السبين، لا يزال العلماء يبحثون عن كيميعة الاستمادة من ذلك و يتحيل الدكتور جوسون، من معبر الانبحاث هي نافال، أن رقائيق الحاسوب قابلة لاعادة البرمجة. حيث يسمح نقر السبين بفتح الدارة أو علقها وبدلا من ساعة رقبيقة حديدية، ما عليك إلا أن تدخل الحاسوب وترسل إليه تعليمات جديدة لتحصل على ما تريد.

يقترح داس سارما من جامعة ميريلاند أنه في الأخير يمكن استخدام M-RAM ليس كذاكرة حاسوب فحسب، ولكن كيديل للأفراص الصلبة، ومن حيث المبدأ، يمكن معالجة المعلومات واختزانها في الرقبيقة نفسها، كما يمكن حذف



يجيب عن كل الأسئلة الممكنة دفعة واحدة، وعلى التقيض من ذلك، لا يستطيع الحاسوب الكلاسيكي أن ينفذ الحسابات المطروحة عليه إلا كل حساب على حدة. ويصبح أكثر بطئا إذا كان عليه أن يتخصص عددا من الإمكانيات المطلوبة منه.

من المرجح أن تكون صناعة الحواسيب الكمومية بعيدة عدة عقود، إلا أن التجارب الحديثة أخذت تحل بعض أجزاء اللغز، مثل كيف تصطف الحقول المغناطيسية للإلكترونات؟ وكيف يمكن أرجعتها حسب ما نريد. ما يتم حتى الآن، هو صدم الإلكترونات بنقصات ضوء ليزرية في كل جزء من تريليون من الثانية، حيث تعمل النبضات الليزرية على إمالة ملايين الإلكترونات دفعة واحدة، لكن ما نحتاج إليه في الحاسوب الكمومي هو إمالة الإلكترونات واحد، بعد الآخر. وهذا العمل الفذ لم يستطع أحد إنجازه حتى الآن.

وهي أعمال أخرى مشابهة، بين باحثون



زمن التباطؤ اللازم لاسترجاع المعلومات من القرص الصلب، الذي يعدّ الفائت الرئيس في الحواسيب الحالية .

يمود المبدأ الأساسي للسبينترونيات، وهو إضافة مركبة مغناطيسية إلى علم الإلكترونيات، إلى عدة عقود من الزمان، لا يوجد شيء جوهري جديد في هذا الميدان كما يقول الدكتور راندال إسحاق، نائب رئيس المركز للعلوم والأبحاث التقنية في شركة IBM، فما يبرز الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والناس تحاول أن تقوم بهذا الدمج، لكن ما وجدته مذهلاً هو تطور الأفكار والتقنيات التي تقربنا شيئاً فشيئاً من هذه التكنولوجيا القابلة للازدهار .

حصل أول انعطاف حاسم عندما اكتشفت ظاهرة عرفت بالمقاومة المغناطيسية العملاقة، ففي العام ١٩٩٨م، وجد العلماء الفرنسيون بتطبيق الحديد مع الكروم، أنهم يخلقون مادة تتغير مقاومتها الكهربائية بشكل ملحوظ عند وضعها في حقل مغناطيسي. يمكن لذرات الحديد أن تقوم بدور المعابر أيضاً، وتتبدل اتجاهات الحقول المغناطيسية عادة من طبقة إلى أخرى.

عندما يتدفق التيار الكهربائي خلال طبقتي الحديد والكروم، ترتد سبينات الإلكترونات بشكل مستمر إلى الأمام وإلى الخلف، وهذا الارتداد يبطئ الحركة ويزيد في المقاومة الكهربائية. وعندما يوضع المادة في حقل مغناطيسي، تنقلب ذرات الحديد جميعاً إلى الاتجاه نفسه، وتتدفق الإلكترونات خلاله بسهولة أكثر.

هذا يثبت أن هذا المركب كاشف حساس للحقول المغناطيسية، شبيه بتلك الكواشف التي استخدمت لاختزان المعلومات على الأقراص الحلبيّة. وفي عام ١٩٩٦م، أدخلت شركة IBM أول قرص صلب له مزية لمقاومة المغناطيسية العملاقة وفيما قبل ذلك، كانت سعة الأقراص الحلبيّة تزيد بمعدل ٦٠ بالمئة كل عام، أما بعد ذلك، فقد تضاعفت سعات الأقراص الصلبة كل





عام، ويعود الجزء الأكبر في هذا التضاعف إلى ازدياد حساسية ذاكرات القراءة والكتابة المغناطيسية.


هناك بنية تعرف بالمتصل النفقي المغناطيسي، بنيت أول مرة في معهد ماسوشتس للتقنية عام ١٩٩٥م. تشكل المركبة الأساسية لـ M-RAM. يتألف المتصل من طبقتين مغناطيسيتين مفصولتين بعضهما عن بعض بمازل. يبقى الحقل المغناطيسي لطبقة واحدة دوماً في اتجاه محدد واحد، أما الحقل في الطبقة الأخرى فيمكن تغييره إلى الأمام وإلى الوراء، فعندما يكون الحقلان متعاكسين، يتدفق تيار صغير عبر المتصل، وهذا الوضع يمثل الصفر. أما عندما ينفتح الحقل في طبقة مغناطيسية واحدة، فتتخط قيمة المقاومة، وهذا الوضع الآخر يمثل الواحد.

ومع أن الذرات في الطبقات المغناطيسية لا تتأرجح إلى الأمام وإلى الوراء من تلقاء ذاتها، يبقى المتصل في الحالة صفر أو الحالة واحد حتى عند إغلاق القدرة الكهربائية، سرعة الـ M-ARM يجب أن تكون عالية إلى حد كاف، إن لم تكن تتفوق على أسرع التقنيات المستخدمة الآن. كما يتوقع لها أن تستهلك طاقة أقل. كل منا في ذاكرته شيء عن الكأس المقدسة للذاكرة، كما يقول د. إسحاق من الـ IBM: فقد تأكد لدينا بشكل قطعي أن الذاكرة المغناطيسية تعمل، والفيزياء العائدة لها تعمل، وأجهزتها تعمل، وأحمل الأشياء تلك التي لم نكتشفها بعد

#### المراجع

- 1- Neil Savage, Discover Vol. 23, No. 1 2001
- 2- Sankar Das Sarma, American Scientist, Vol. 83, 1995
- 3- R. A. Serway, Modern Physics, Jones Madison University, 1997





والطيور الصيادة بالحوارح او الكواسب.  
وتتميز الحوارح بأن صافيرها قوية ومديبة  
ومعكوفة الفك العلوي (من المنقار) وهذا تكيف  
مع طبيعة تغذيتها التي تتركز على اللحوم. حيث  
تساعدها على تمزيق الفريسة. كما تتميز  
ببصرها الحاد ورجلها القوية التي تحمل مخالب  
قوية معكوفة ايضاً تساعدها على الامساك  
بفرائسها. ومن الصفات الأخرى لهذه الطيور كبر  
حجم الإناث عن الذكور ومعظم صغارها تخرج

الجوارح مفردة حارحة للمذكر والمؤنث  
والجوارح من الطير والسباع. ذوات الصيد لأنها  
تجرح لاهلها أي تكسب لهم من الحذر. ح ز ح.  
ويعني عبد العرب أمرين الأول احدث في جسمه  
شوخاً أو جرحاً بسلاح أو أداة حادة. والمعنى  
الثاني كسب أو اكتسب قال الله تعالى في كتابه  
العزيز ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْوِيكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا  
حَرَّحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام ٦٠] ويعني هنا كسبتم.  
ومنه سميت الطيور المستخدمة في الصيد





وأكسيبيريدي Accipitridae، وينتمي للأولى نوع واحد وهو العقاب النساري، أما العائلة الثانية فينتمي إليها العقاب والباز ونسور العالم القديم. أما تحت الرتبة الثالثة فهي تسمى ساكيتاري Sagittarius وتنتمي إليها عائلة واحدة هي Sagittarius tataricus، واحد هو صقر الحديان Secretory bird الذي يتميز بطول ساقيه ووجود ريش على جانبي الرأس يمتد للخلف، وهو من الطيور المقيمة للسهول الأفريقية. وبحلاف الجوارح

من البيض وعليها رعب أبيض، وقد صنفت الجوارح النهارية كرتبة مستقلة تسمى (الصقريات) Falconiformes، وهي تنقسم إلى أربع رتبيات (تحت الرتبة)، وذلك حسب صفاتها الخارجية والحيوية ومنها كاثارتي Cathartidae وينتمي إليها جميع نسور العالم الجديد (الأمريكتين)، أما تحت الرتبة الثانية فهي أكسيبيريدي Accipitres وهذه تنقسم إلى عائلتين وهما باديونيدي Pandionidae

منه مقيمة تعيش في المملكة ومجموعات تأتي إلينا خلال هجرتها.

ويهدف هذا المقال إلى توثيق ما تحويه المملكة من هذه الطيور لتكون مرجعاً للباحثين في هذا المجال ولحبي هذه الأنواع من الطيور، فالمراجع العربية التي تتكلم عن أنواع الطيور الجوارح قليلة بوطننا العربي. وأغلب ما هو متداول يركز على الصقور وما يتعلق بها من طرق صيدها واستخدامها في الصيد ورياضة وتراث يجب المحافظة عليه ودعمه، كما أنها يمكن أن تكون مرجعاً للأجيال القادمة فلربما اختفت أنواع بسبب ما تتعرض له هذه الطيور من مخاطر عديدة كالصيد والتسميم والمبيدات الحشرية والتلوث واعمدة كهرباء الضغط العالي والإزعاج في مناطق تكاثرها وتدهور موائلها، وأخيراً لربما يستفاد من هذا المقال في توفير المعلومات لسائحي الحياة الفطرية التي هي جزء من السياحة البيئية، وتعريف أبناء المملكة أولاً والزوار ثانياً بما تحويه المملكة من طيور جوارح، وقد بدأت دول خليجية بعمل برامج سياحية لمشاهدة الطيور المهاجرة، منها البحرين.

والتسجيل هذه الأنواع استغنت بالله أولاً ثم بدراسات ومشاهدات أجريتها عليها خلال مسيرتي في مجال دراسات الطيور التي بدأتها قبل ستة عشر عاماً بوصفي باحثاً في علم الطيور بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ولتأكيد بعض المشاهدات استغنت بمشاهدات بعض الباحثين بالمركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف الذي أعمل فيه، بالإضافة لبعض المراجع المتخصصة بهذا المجال للتعرف أكثر على كيفية تكاثر هذه الطيور ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي. ولعرض هذه الطيور بشكل يمكن أن يهتمه المتخصصون وغير المتخصصين قسّمت الجوارح العيشة في المملكة إلى أربع مجموعات هي مجموعات النسور والصقور والعقبان وأخيراً الجوارح الأخرى.



الأخرى يفضل هذا النوع من الطيور المشي على رجليه أكثر من طيرانه، والرتبة الأخيرة للطيور الجوارح هي تحت رتبة الصقور Falcons وبها عائلة واحدة هي Falconidae وينتمي إليها جميع أنواع الصقور والمواشق.

ومن خلال هذا الموضوع سوف أركز على الطيور الجوارح العيشة في المملكة العربية السعودية التي بلغ عددها ٢٢ نوعاً، وذلك من بين ٤٢ نوعاً تم تسجيلها في المملكة، منها ما هو مقيم ومنها ما هو مهاجر. وهناك أنواع توجد منها مجموعات مقيمة وأخرى من النوع نفسه مهاجرة، فمثلاً النسور الأسمر هناك مجموعات



#### ١. مجموعة النسور (Vultures).

من أهم مميزات النسور بصفة عامة هي خلو رءوسها من الريش، وهذه الصفة لها علاقة بتكيفها مع طبيعة التغذية الرمية، حيث تتغذى على الحيوانات النافقة، وهذا النوع من الغذاء يحتوي على سوائل مثل الدم والماء المتعفن نتيجة تحلل أحشاء الحيوان النافق، وعندما تتغذى النسور عليها؛ فإن التصاق هذه السوائل بالريش بمنطقة الرأس شيء طبيعي ونظراً لعدم قدرة النسور على تنظيف منطقة الرأس؛ فإن خلو هذه المنطقة من الريش مهم حتى لا يتأثر بالملوثات التي قد تسبب لها الأمراض. وقد أبدلها الله

بهذه المنطقة زغباً أبيض خفيفاً كثيفاً يتساقط بشكل دوري، فهو يمنع وصول المواد السائلة لسطح الجلد كما أنه يتجدد دائماً فيعمل على إسقاط المتسخ منه.

وقد يستغرب البعض عند معرفة المنطقة التي تتغذى منها النسور من الحيوان النافق (الجيفة) من خلال النظر للمنطقة التي بها الريش بالرأس والرقبة، فمثلاً نجد أن نسر الأذن يبدأ عنده الريش تقريباً من منطقة الرقبة أما منطقة الرأس فهي خالية من الريش. وهو يستطيع بمناقيره القوية القاطعة تمزيق الجلد والتغذي عليه وعلى الأنسجة الداخلية منها، وهو

يختفي فقطع من مقدمة الرأس ليواكب طريقة تغذيتها. وذلك على الأنسجة المسطحة الناعمة كالعيون واللسان والأنسجة العضلية المتساقطة من الطيور الكبيرة. أما النوع الأخير في المملكة وهو النسر الملتحي فهو من بين النسور جميعها الذي يوجد على معظم أجزاء رأسه ريشاً. وهذا ربما يخالف الصفة الأساسية للنسور. وهو خلو منطقة الرأس من الريش. ولكن عند دراسة تغذية هذا الطائر وجد أنه يتغذى على عظام الحيوانات النافقة، فسبحان الله، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] فبالنظر إلى هذه الطيور وهي تتغذى على جثة أحد الحيوانات يظن أن الكبير منها سوف يأكل نصيب الصغير. لكن هذا لا يحدث فكل يأخذ نصيبه منها. وفي المملكة العربية السعودية سجل تعيش أربعة أنواع من النسور، وهذه النسور هي نسر الأذن (لُبد، النسر الوردي)، والنسر الأسمر، والنسر المصري (الرخمة المصرية)، والنسر الملتحي؛ وقد قامت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بعمل استراتيجية لحماية هذه الطيور في المملكة حيث تم تطبيق جزء منها والباقي مازال العمل عليه قائماً.

#### ١٠١ نسر الأذن (لبد)

Lapper-faced Vulture (Torgos tracheliatus)

هذا النسر هو الوحيد بين النسور المعيشة في المملكة الذي يبني أعشاشه على الأشجار، بخلاف الأنواع الأخرى التي تضع بيضها على المنحدرات الجبلية. وهذا النوع كان محور دراساتي العليا للتعرف أكثر على حياة هذه النسور. والإسهام بوضع استراتيجية لحمايته في المملكة العربية السعودية. ويوجد لنسر الأذن ثلاث سلالات أولها في الجزء الجنوبي لأفريقيا والثانية في شمال أفريقيا والثالثة بمنطقة الجزيرة العربية وبلاد الشام. وتمثل المجموعة الموجودة بالمملكة أكبر المجموعات عدداً للسلالة الخاصة بالجزيرة



بذلك لا يحتاج للتوغل برأسه داخل الحيوان النافق بخلاف النسر الأسمر الذي يتغذى على الأنسجة العضلية من الجيفة فقط ولا يستطيع قطع الجلد لذلك فهو يحتاج إلى رقبة طويلة للوصول إلى هذه الأنسجة؛ لذا فإن منطقة الرأس والرقبة الطويلة خالية من الريش. أما لو نظرنا إلى الرخمة المصرية فإننا نجد أن الريش



وتبلغ فترة الحضانة للبيض بين ٥٥ - ٥٦ يوماً أما رعاية الصغار حتى وصولها لمرحلة الطيران فتتراوح بين ١٢٠ - ١٥٠ يوماً، تأتي بعدها مرحلة المتابعة والتعلم التي يقضيها الفرخ بعد طيرانه، والتي تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وهذه من أخطر المراحل لهذه الطيور، وتصل هذه الطيور إلى مرحلة البلوغ في سن ما

العربية وبلاد الشام، حيث يعتقد أنها انقرضت من بلاد الشام واختفت من بعض المناطق بشرق الجزيرة العربية، لذا؛ فالمجموعة المعشقة بالمملكة هي من أهم المجموعات عالمياً.

وتتراوح أوزان الطيور البالغة من نسر الأذن بين ستة وتسعة كيلوجرامات، وقد يصل بعض الصغار إلى أكثر من ١٢ كيلوجراماً وذلك خلال مراحل نموها قبل طيرانها، وتتميز أيضاً بأن رموس بعضها يقلب عليه اللون الأحمر القاتح، لذا يطلق عليه أحياناً النسر الوردي. وعلى الرغم من أن النسور تتغذى جميعها على الحيوانات النافقة إلا أن نسر الأذن هو الوحيد الذي يمكنه الاقتراس، فقد سجل في المملكة يقوم بصيد الضب، وذلك بالوقوف على أحد جانبي الجحر أو بعيداً عنه ينتظر خروج الضب، فيقفز عليه ليمسكه بأرجله ومخالبه الحادة.

والنسور بصفة عامة من الطيور المعمرة، ويقول العرب: (عمره عمر نسر) وقد ذكر الجاحظ في كتابه (الحيوان) واصفاً طول عمر النسر أن أحد شعراء العرب والمسمى الخزرجي ذكر واصفاً عمر معاذ بن مسلم بن رجاء مولى القعقاع بن شور في قوله:

إن معاذ بن مسلم رجل

قد ضح من طول عمره الأبد

قد شاب رأس الزمان واختضب

الدهر وأثواب عمره جدد

يا نسر لقمان كم تعيش وكم

تليس ثوب الحياة بما لبد

وتضع الأنثى بيضة واحدة، وذلك في فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة مما يساعد الزوجين على حضانة البيض. وربما يكون لذلك علاقة بالصغار عند ائتمامها عن الاعشاش حيث إن فترة الصيف التي تبتدئ فيها الفراخ عن العش تزيد فيها نسبة النافق من الحيوانات وهذا يوفر كمية كبيرة من الغذاء لها، الأمر الذي يعطي للصغار فرصة أكبر للعثور على غذائها.





ويشاهد أيضاً في عدد من المناطق السهلية وذلك خلال بحثه عن الغذاء ويصل وزنه إلى ١١ كجم، وطول جناحيه عند فردها بين ٢٤٠ - ٢٨٠ سم، وثقل وزنه فهو يحتاج إلى مساعدة للتخليق، ويهدد المساعدة يمكن أن يحدث في المناطق المرتفعة عن المنحدرات حيث يساعد الهواء، المنبع من أسفل إلى على لرفعها، أما هي

من ستة و أحد عشر عاماً وسر الأذون يعد من الحسور المهددة تانياً بالانقراض حسب تصنيف المحسن، العاش لحياة الطيور.

٢.١ النسور الأصفر (Gyps fulvus) : ينتشر هذا النوع من النسور في المنطقة الحبيبية العربية ووسط المملكة وشمالها


وتتغذى هذه النسور بشكل عام على الحيوانات النافقة من الثدييات الصغيرة أو الكبيرة، وذلك على الأنسجة الناعمة منها، حيث إن مناقيرها ليست بالكفاءة التي تمكنها من فتح الجيفة، وتقوم الطيور بالتعاون لإيجاد غذائها بمساعدة بصرها الحاد، فهي تقوم بالتحليق في الجو كل على مسافة من الآخر، وعندما يشاهد أحدها الغذاء؛ فإنه يطير فوق منطقة الغذاء، وطريقة طيرانه تدل النسور الأخرى على موقع وجود الغذاء.

ويبدأ موسم التكاثر لهذه النسور في فصل الشتاء، ويستمر وضع البيض إلى بداية شهر مارس، ويعمل كل زوج على بناء عشه على المنحدرات الجبلية والكهوف، وتبني أعشاشها في مستعمرات قد تصل في بعض المناطق إلى ١٥٠ زوجاً في مستعمرة واحدة، وتضع الأنثى بيضة واحدة فقط، ويتناوب الأبوان في حضانة البيض وذلك لمدة ٥٠ - ٥٨ يوماً، ويصل الصغير لسن البلوغ بين ١١٠ - ١٢٠ يوماً، ويبقى الصغير أحياناً بالقرب من العش يعتمد على أبويه في الغذاء مدة ثلاثة أشهر ليبدأ بعدها بالاستقلال عنهما، وعندما يصل عمره أربع سنوات وهو سن البلوغ ربما يعود للمستعمرة نفسها للتعيش، وهذه الطيور من الطيور المعمرة حيث تصل أعمارها إلى ٤٠ سنة، ودلت المتابعة لأحد هذه الطيور في الأسر إلى أنه عاش حوالي ٢٧ سنة. وقد أشارت الدراسات الأولية التي أجريتها على هذا الطائر أن أعداده بدأت في التناقص بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية، حتى أن هناك مستعمرات كانت قد سجل بها أعشاش لهذه الطيور من قبل قد اختفت منها.

#### ٢٠١ الرخمة المصرية (النسر المصري)

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)

من الطيور الممروقة في المملكة والحريرة العربية، وتسمى الاوق وتكنى بأب حمران وأم فيس وأم كثير، ويتميز البالغ منها بلونه الأبيض



المناطق المفتوحة فهي تعتمد على الهواء الساخن المرتفع إلى أعلى على شكل دوامات هوائية ناتجة من تسخين أشعة الشمس لسطح الأرض مما يؤدي إلى تسخين الطبقة الهوائية الملاصقة لسطح الأرض وارتفاعها إلى أعلى. وهذا الهواء الساخن هو المسئول عن طيران هذه النسور وكذلك الطيور الكبيرة المحلقة.



وأطراف أجنحة سوداء وبمنقار ووجه أصفر وسواد بمقدمة المنقار، ويختلف لون الفرخ في سنته الأولى والثانية حيث يتميز بلونه الأسود، ويصل وزن البالغ بين ١٦٠٠ - ٢٢٠٠ جرام وهو ينتشر في معظم مناطق المملكة ما عدا أواسط الربع الخالي كما يوجد أيضاً في بعض الجزر بالبحر الأحمر كمحمية جزر فرسان.

وقد حير وجود هذا النوع من الطيور العلماء في اسباب وجوده بهذه الجزر البعيدة، فهذه الطيور لا تستطيع الطيران لفترات طويلة إلا بطريقة التحليق وليس بطريقة الرفرفة بالأجنحة، وكما ذكرت بالسابق فإن هذه الطريقة (التحليق) تعتمد على تيارات الهواء المنبعثة من الأرض التي تختفي فوق المياه، وهذه الجزئية من الدراسات تحتاج إلى دراسات جينية لمعرفة اصول هذه الطيور - وتعيش هذه الطيور في اعالي المنحدرات الجبلية، وقد اشار العرب إلى علو اعشاش هذه الطيور بمثل يطلق على كتم السر فيقال (أبعد من بيضة الأنوق) وقال شاعر:

طلب الابلق العقوق فلما

لم ينله أراد بيض الأنوق

ويبدأ تكاثر هذه الطيور مع شهر ديسمبر وبسبب اعشاشها من اغصان الأشجار، وتضع الأنثى من بيضة إلى بيضتين وكثيراً ما تضع بيضة واحدة، ويحسّن البيض قرابة ٤٢ يوماً وتصل الصغار لسن الطيران وعمرها بين ٧٠ - ٨٥ يوماً، وتبقى بجوار العش لتحصل على غذائها من والديها قرابة الشهر قبل أن ترحل بعيداً لتعتمد على نفسها. وتصل هذه الصغار لسن البلوغ لتبدأ في التكاثر ووضع البيض بين سن الرابعة والخامسة.


وتتفقد هذه الطيور على النافق من الحيوانات الصغيرة، وربما ترجع تسمية هذه الطيور بالرخمة لطريقة تغذيتها فهي يحكم أن مناقيرها من النوع اللاقط فهي لا تستطيع أن تقطع الأنسجة القوية وكما ذكرت سابقاً، فإن

الريش بمقدمة الرأس فقط يشير الى عدم قدرتها على تقطيع الجيفة أو التوغل داخلها لذا فهي تعتمد كثيراً على ما يسقط من كبار النسور، وتلتقط ما يسقط منها خلال تغذيتها، لذا فوصف العرب لها بالرخمة يطابق سلوكها فهي لا تبذل مجهوداً كبيراً في تغذيتها كما أنها بالوقت الحالي نجدها عند مرامي النفايات حتى بدأ يطلق عليها كنية (البلديات) في بعض الجزر كجزيرة سوقطرة باليمن، وذلك لتغذيتها من النفايات وتخليص المنطقة من المواد المتفجرة.

وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن الرخمة كسولة وفيها نوع من الغباء إلا أنها تعدّ من الطيور الذكية، حيث تعلمت مجموعات منها بأفريقيا استخدام الحجارة لكسر بيض السمك، وهذا يعد تطوراً في السلوك، وذلك لاستخدامها للحجر كأداة فهي تقوم بحمله بمناقيرها ومن ثم قذفه على البيضة لكسرها أو إحداث ثقب بها للحصول على المادة بداخلها، وليس كل مجموعات الرخمة المصرية تستطيع فعل ذلك، ولكن مجموعات محددة بأفريقيا وبالتحديد في محميات سيرنكييتي بكنيا وتزانيا، وللتعرف

بحلقة حمراء حول عينيه كذلك الريش الخفيف المتدلي من قاعدة المنقار بالراس الذي يشبه اللحية. ومنها يرجع اسمه النسر الملتي، كما يتميز البالغ منه برقبة ذات ريش برتقالي، أما الصغار في سنتها الأولى والثانية فيقلب على ريشها اللون الأسود.

ومن بين النسور جميعاً: فإن تغذية هذا النسر تعتمد كثيراً على العظام. فقد أشارت إحدى الدراسات بجنوب أفريقيا إلى أن العظام تمثل مائتيه ٨٥٪ من غذاء النسر الملتي والباقي عبارة عن الأنسجة العضلية لحيوانات عشبية نافقة.



على إمكانية قيام هذه الطيور في المملكة بهذا العمل، فقد تم القيام بتجربة في محمية محازة الصيد، وذلك بتقديم بيض النعام لهذه النسور ولكنها لم تحركها بل لم تقبل عليها أبداً كما فعل الثعلب الذي أخذ يدحرجها عنها تكسراً. وهذا يعني أن تلك المجموعات ربما تعلمت من أسلافها في تلك المنطقة.


والرخمة المصرية بالمملكة أخذت أعدادها في التناقص بشكل كبير خلال العقدين الماضيين خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية، وهذا التأثير السلبي ليس في المملكة فحسب، ولكن في معظم مناطق انتشاره حتى أن بعض المنظمات بدأت في إعداد برامج إكثاره وإعادة توطينه مرة أخرى في موائله الطبيعية.

#### ٤-١ النسر الملتي

:Bearded Vulture (Gypaetus barbatus)

هو من أجمل النسور في العالم، وقد استوطن هذا النوع بالمملكة المناطق الجنوبية الغربية على المرتفعات الجبلية، وذلك من الطائف شمالاً إلى الحدود اليمنية جنوباً. ويتميز

وتعيش هذه النسور عادةً منفردة أو كزوج واحد في منطقة واحدة كذلك تبحث عن غذائها منفردة وتعيش هذه الطيور في أعالي المنحدرات الجبلية، وذلك بين شهر يناير إلى شهر مايو، حيث تضع الأنثى بيضة إلى بيضتين وتبلغ مدة الحضانة للبيض بين ٥٢ - ٥٨ يوماً، وتصل الفراخ لسن الطيران وعمرها بين ١٠٦ - ١٢٠ يوماً،



انه على مستوى العالم غير مهدد بالانقراض. وهذا ليس راجعاً لكثرة عدده في مناطق أخرى، ولكن بسبب انتشاره الواسع في العالم القديم (آسيا وأوروبا وأفريقيا) وقد قام عدد من المنظمات الدولية بعمل برامج إكثاره وإعادة توطينه في بيئاته الطبيعية مثل ما حدث في حال الألب بسويسرا وفرنسا،

#### ٧. الصقور Falcons.

يقصد بفتة الصقور هنا الأنواع التي تنتمي لجنس Falco التي سجل منها في المملكة العربية السعودية نحو أحد عشر نوعاً ينتمون لهذا الجنس منها ما هو مقيم ومنها ما هو مهاجر،

ويبقى الفرخ مع أبويه إلى أن يصل عمره السنة قبل أن يغادر منطقة العش ليمتد على نفسه.

والنسر الملتحي من الأنواع المهددة بالانقراض في المملكة إن لم يكن قد اختفى فعلاً، فخلال عملي بالطيور خلال الستة عشر عاماً الماضية لم أشاهده إلا مرة واحدة بمحمية ريدة بمنطقة عسير وذلك في عام ١٩٩٠م، كما أن المهتمين بالطيور في المملكة لم يسجلوا هذا الطائر منذ ثماني سنوات، كما تم التعرف على أحد افراد هذا النوع في بداية التسمينات يباع في سوق الطائف للطيور بثمن بخس، وعلى الرغم من ندرته أو انقراضه من المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأفريقية والأوربية إلا



٦٠٠ جرام، والسلالة المحلية للوكري -F. b. tanyp- terus تختلف عن السلالات الأخرى سواء الجنوب أفريقية أو الأوروبية بأن حجمها أصغر قليلاً. كما أن هناك اختلافاً في الألوان لا يميز بينها سوى خبير بالصقور.

وتكاثر هذه الطيور من شهر فبراير إلى شهر مايو. وقد سجلت أعشاشه في شهر أبريل على طريق بني سعد بمنطقة الطائف، ويعرف عن هذه الطيور أنها تمشش في المنحدرات الجبلية وعلى الأشجار وعلى أعمدة الإنارة. وكذلك قد تستخدم أعشاشاً قديمة لطيور أخرى كالفربان، وتضع الأنثى بين ٢ - ٤ بيضات ويحضان البيض لمدة ٣١ - ٣٢ يوماً، وتصل الفراخ لمرحلة الطيران وعمرها بين ٢٥ و٤٧ يوماً، وتقوم الأنثى بمساعدة الفرخ في الصيد خلال مرحلة ما بعد الطيران قبل أن يستقل وتبقى معه مدة من شهر إلى ثلاثة أشهر. بعدها يستقل الفرخ عن والديه، ويتغذى الوكري على الطيور الصغيرة كالحمام والسمان والقوارض والزواحف كالضبان.

#### ٢.٢ الشاهين الجبلي

Barbary Falcon (Falco pelegrinoides)  
سجل تمشيش هذا الطائر في المناطق الجبلية بوسط وجنوب غرب وشمال المملكة، وقد سجل عشه في جبال تنومة وذلك في شهر مارس من عام ٢٠٠١م. وتتحرك صغار هذه الطيور بعيداً عن مناطق تعشيشها بالجبال إلى المناطق السهلية للصيد. وقد شاهدت أحد هذه الفراخ تصطاد الحمام من على سهل تهامة وذلك في شهر يونيو عام ٢٠٠١م.

وطيور الشاهين موجودة في كثير من مناطق العالم وتتميز السلالة التي بالمملكة بأنها أصغر حجماً، وكمعظم الجوارح فالأنثى أكبر حجماً من الذكر ب ١٥ - ٢٠٪، وتتغذى هذه الطيور بشكل كبير على الطيور الصغيرة والمتوسطة الحجم وأحياناً الثدييات الصغيرة ويتراوح حجم فرائسها

ويصل عدد المقيم أو المعشش منها بالمملكة خمسة أنواع هي الوكري، والشاهين الجبلي، والموسق أو الشبوط، والمويسق أو الموسق الصغير، وأخيراً صقر البكاء. وتمتاز هذه الطيور بقوة أجنتها فهي تستطيع الطيران عن طريق الرفرفة والتحليق. وبالطريقة الأولى يمكنها قطع مسافة طويلة سواء على اليابسة أو فوق الماء، كما أنها تعتمد في غذائها على الافتراس، وقد يفضل العرب نوعين من هذه الطيور في الصيد وهي الشاهين البحري منها (المهاجر) والجبلي والوكري. وبما أن الكثير من الكتب قد تحدثت عن الصقور والصيد بها فسوف أكتفي في هذه المقالة بأن أتحدث فقط عن وجودها بالمملكة مع نبذة بسيطة عن حياتها.

#### ١.٢ الوكري (Lancer Falcon) (Falco biarmicus)

هذا النوع من الصقور يمشش في المناطق الجبلية لجنوب غرب المملكة، وقد كان من أكثر الطيور التي سجلتها خلال نهاية الثمانينات وبداية التسعينات خاصة على طريق بني سعد السياحي ومحمية ريدة وتنومة، ولكن في نهاية التسعينات قلت التسجيلات لهذا الطائر بشكل كبير، وربما يرجع ذلك إلى إقبال كثير من صائدي الصقور بالاستيلاء على بيضه وفراخه لاستخدامها في الصيد أو كملراد خلال موسم مسك الصقور المهاجرة، والصقارون الذين يستخدمون هذا النوع من الطيور في الصيد هم قلة، ومنهم من يقومون بالصيد بهذه الطيور في أوقات الربيع (خارج موسم الصيد) بمنطقة تهامة، مخالفين بذلك انظمة الصيد بالمملكة، والمشكلة هنا أن معظم الفراخ التي تأخذ من الأعشاش لا تعيش حتى تصل لسن الطيران، كما أن استخدامها كملراد تنتهي ربما بالقضاء عليها، وهذا يزيد في تناقص أعداد هذا النوع من بلادنا.

والأنثى أكبر حجماً من الذكر حيث يتراوح وزنها بين ٧٠٠ - ٩٠٠ جرام بينما الذكر ٥٠٠ -

أعداده بشكل كبير خاصة بالمملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى استيلاء الصيادين على أفراخ هذه الطيور، كما أن الكسب المادي وكثرة العاملين بالصقارة زاد من الضغوط على المجموعات البرية المستوطنة، كما أن تغير طرق

من ٢٠ - ٢٠٠٠ جرام، وتعيش بالمملكة من شهر فبراير إلى شهر مايو ولا تبني أعشاشاً واضحة ولكنها تضع بيضها بين الصخور أو في أعشاش طيور أخرى كالقريان. ويدافع الزوج منها عن منطقتة ضد الطيور الأخرى، وتضع الأنثى بين ٢



الصقارة الخاصة بهذا الطائر أثر على أعداده ففي الماضي كان الصقاريون يحصلون على أفراخ هذه الطيور ويقومون بتربيتها وتدريبها ومن ثم الصيد بها خلال موسم القمص. وبعد ذلك يقومون بإعادة إطلاقها في المنطقة نفسها التي تم أخذها منها لتكاثر وتنتج طيوراً أخرى، ليعود إليها قبل موسم الصيد المقبل ليمسكها ويعاود الصيد بها وهكذا. أما الآن فمعظم التي تمسك لا

٣ - بيضات ويحض البيض لمدة ٢٩ - ٣٢ يوماً، ويصل الفرج لسن الطيران وعمره بين ٣٥ - ٤٢ يوماً، وتبقى الصقار مع أبويها لمدة شهرين قبل أن تفصل عنهما.

والوكرى من الطيور غير المهددة عالمياً بالانقراض ولكن بسبب الصيد الجائر عليه فإن هناك منظمات تدرس وتنادي بتسجيله ضمن قائمة الطيور المهددة بالانقراض، وذلك لتتاقص

## ٤.٢ المويسق (الموسق الصغير)

Lesser Kestrel (Falco naumanni)

يشاهد هذا النوع في المناطق الشمالية والوسطى والغربية وذلك خلال موسم الهجرة، وقد شاهدت هذا الطائر بمحمية محازة الصيد وذلك خلال شهر مارس من عام ٢٠٠١م، أما مناطق تعيشه بالمملكة فهي منحصرة في شمال المملكة، وقد سجل عش له في محمية حرة الحرة. ويختلف هذا النوع عن الموسق بأنه أصغر حجماً حيث يتراوح وزنه بين ٩٠ - ١٧٢ جراماً للذكر و١٢٨ - ٢٠٨ جرامات للإناث، كما أن الذكر معظم رأسه رمادي اللون وريش الظهر غير منقط ويغلب عليه اللون البرتقالي المائل للون الأحمر، أما الأنثى فهي مشابهة لأنثى الموسق ولكنها أصغر حجماً ومخالبها تميل للبيضاء وليست سوداء كآنثى الموسق.

ويفضل هذا النوع المناطق المفتوحة ويوجد أيضاً في المناطق الجبلية. وقد سجل تعيش هذا الطائر بين الصخور البازلتية بمحمية حرة الحرة وذلك في شهر مارس، ويعرف عن هذه الطيور أنها تعيش بين مارس ومايو، كما يعرف عنها أنها تعيش في مستعمرات يتراوح عدد الأزواج بها بين ٢٥ - ١٠٠ زوج، وإن كان ما سجل بالمملكة هي أعشاش فردية؛ وأشهر هذه المستعمرات الموجودة في الجدار المحيط بالقدس القديمة بأرض فلسطين المحتلة، وتضع الأنثى بين ٣ - ٦ بيضات، ويحضن هذا البيض لمدة ٢٦ - ٢٨ يوماً ويصل الفرج لسن الطيران وعمره ٣٥ - ٢٧ يوماً ليتترك العش خلال مدة لا تقل عن اسبوع.

وتتغذى هذه الطيور بشكل كبير على الحشرات التي تمثل ٩٠٪ من غذائها، أما النسبة الباقية فهي تمثل الزواحف الصغيرة كالسحالي وأحياناً قليلة القوارض الصغيرة. ويعد هذا النوع من الطيور الجارحة النادرة والمهددة عالمياً بالانقراض.

يعاد إطلاقها في مناطقها حيث تبقى في غرف مكيفة ولا تعطى فرصة للتكاثر مما يقلل من أعداد الطيور المتكاثره وبالتالي يقل الإنتاج وهذا يؤدي إلى تناقص في أعداده.

## ٣.٢ الموسق (صقر الجراد أو الشبوط)

Kestrel (Falco tinnunculus)

من الطيور المقيمة المتكاثره بالمملكة، وقد سجل في عدد من مناطق المملكة الشمالية الغربية والوسطى ويزداد بالمناطق الجنوبية الغربية وذلك على جبال السروات، وتكثر أعشاشه بالمناطق الجبلية وذلك بين الصخور وحتى على المباني وأحياناً أيضاً على أعشاش الغربان القديمة، وذلك بين شهر فبراير إلى شهر أغسطس، وقد سجل تعيش هذا الطائر طبيعياً على برج الهوائي للهاثاف في المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف.

ويمتاز هذا النوع بأن الرأس والذيل رمادياً اللون مع وجود خط أسود على طرف ريش الذيل، وريش الظهر منقط، وتزيد البقع في الأنثى التي تشبه الفراخ، ويتراوح وزن الذكر بين ١٣٦ - ٢٥٢ جراماً أما الأنثى فهي أكبر حجماً حيث يتراوح وزنها بين ١٥٤ - ٢١٤ جراماً. ويوجد هذا النوع من الطيور بالمملكة في وسط ومعظم المناطق لجبال السروات.

وتتغذى هذا النوع من الصقور على الطيور والثدييات الصغيرة والحشرات والزواحف، وتضع الأنثى بين ٣ - ٥ بيضات وتستغرق حضانة البيض بين ٢٧ - ٣١ يوماً، وعادة تقوم بها الأنثى فقط ويقوم الذكر بجلب الغذاء لها وحتى المرحلة الأولى من فقس البيض، وتعمل الفراخ لسن الطيران وعمرها شهر تقريباً، تبقى بعدها قريبة من والديها قبل أن تغادر منطقة العش مدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة، والموسق من الطيور غير المهدة عالمياً بالانقراض ولكنه بالمملكة بدأت أعداده في التناقص بشكل كبير ولافت للنظر.

٥٠٢ البكاء أو الصقر الفاحم

Sooty Falcon (Falco concolor)

هو من الطيور التي تعيش في الجزر الصخرية أو الرملية ذات الغطاء النباتي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، ويمكن

(الخريف بالمناطق الجنوبية من الكرة الأرضية) لتمود مناطق تعيشها في الربيع بالبحر الأحمر. ويتميز هذا الطائر بلونه الرمادي الفاتح وحلقة صفراء حول العين. ومع وصول هذه الطيور إلى مناطق



مشاهدة أعشاشه على الجزر الصغيرة القريبة من السواحل، ومن أشهر المناطق التي يعيش بها هذا الطائر بالملكة محمية جزر فرسان. وهذه الطيور من الطيور الزائرة الصيفية التي تأتي في بداية الربيع لتعيش على الجزر، ومن ثم تفادر مع حلول الشتاء ولا يعرف أين وجه المجموعات المتكاثرة بالملكة، ولكن يعتقد أنها تصل لجزيرة مدغشقر وجنوب أفريقيا لتبقى لحين الربيع

تعيشها يتجمع الأزواج في مناطق التعشيش وذلك مع بداية شهر مايو لتضع الأنثى بيضها بين شهري يوليو ويونيو لتخرج الصغار في شهر أغسطس وهو موعد هجرة الطيور التي تشكل الغذاء الرئيس لهذه الطيور، حيث تتغذى على الجواثم منها وغير الجواثم الصغيرة، وكذلك طيور القناير، ومن الفرائس التي وجدت بأعشاش هذه الطيور على جزر

## ٣. العقاب Eagles .

العقابان من الطيور الكبيرة الحجم وتتميز غالباً بكبر رعوسها ومخالبها، وسجل في المملكة سبعة أنواع هي العقاب النساري، والعقاب الاسحم، والعقاب الذهبي، والعقاب الأسود،

بالقرب من منطقة الليث كانت لطيور الصفري وأكل النحل والسنونو وبقايا لطيور أخرى لم تعرف بعد .

وتعشش هذه الطيور في الجرز بالمملكة منفردة أو في أزواج قليلة بين (٢ - ٤) بشكل



والعقاب المخطط، والعقاب المصنف، وعقاب الثعابين ذو الساق القصيرة.

## ٣-١ العقاب النساري Osprey Pandion haliaetus

من الجوارح التي تعيش بالقرب من المسطحات المائية وهي توجد في المملكة على سواحل وجزر البحر الأحمر والخليج العربي وأما منطقة تعيشها فهي عادةً على الجزر، ويتميز العقاب

متباعد، وعادةً ما تكون منفردة وتضع العش على الأرض تحت الشجيرات بالجزر الرملية وبين الصخور بالجزر الصخرية. وتضع الأنثى بين ٢ - ٣ بيضات، وتحضن عادةً من قبل الأنثى وذلك لمدة ٢٧ - ٢٩ يوماً، وتصل الفراخ لسن الطيران وعمرها بين ٢٢ - ٢٨ يوماً حيث تبقى مدة بسيطة مع والديها تصل بين أسبوعين لأربعة قبل ان تستقل عنهما.

النساري يلون بطنه البيضاء وبياض منقطة التاج، ويتراوح وزن البالغ منه بين ١٢٠٠ - ١٦٠٠ جرام، ويبدأ موسم تكاثره في شهري ديسمبر ويناير، وينتهي مع بداية الصيف حيث تغادر الصغار الأعشاش. لهذه الطيور أعشاش مميزة تبنيها من أغصان الأشجار على الأرض أو الصخور ويقوم الكثير منها بتجديدها، وذلك ببناء أعشاش جديدة فوق القديمة ليرتفع العش ليصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أمتار.

وتضع الأنثى بين ١ - ٣ بيضات وأحياناً بيضة واحدة، وتتراوح فترة الحضانة للبيض بين ٢٥ - ٤٢ يوماً وغالباً لا يصل لسن الطيران من هذه الفراخ سوى واحد، وعمره تقريباً من ٥٠ - ٦٠ يوماً، حيث تصل لمرحلة البلوغ وعمرها ٢ - ٤ سنوات، والعقاب النساري من الطيور المعمرة حيث تبلغ أعمارها بين ٢٠ - ٢٥ سنة. وهذه الطيور ليست مهددة بالانقراض عالمياً وإن كانت محلياً تأثر بعض أفرادها بالتلوث الناجم عن الصرف الصحي حيث اختفت من سواحل المدن الكبيرة كجدة وينبع وجازان ولكن عددها مازال جيداً بالقرب من الجزر البعيدة عن الشاطئ، وتعيش هذه الطيور في أزواج منفردة وليس في مجموعات، فهي تحتاج لمنطقة نفوذ كبيرة، لذا فإن تأثر السواحل بالقرب من المدن الكبيرة سوف يقلل من المساحة المخصصة لهذا الطائر وبالتالي تقل أعداده ومن ثم إنتاجيته. ويتغذى هذا النوع من العقاب بشكل كبير على الأسماك، وطريقة صيده للسمك جميلة جداً حيث يراقب بعينه الحادة أسراب الأسماك التي تسبح على سطح البحر وعند تحديدها يطير ليأتي من خلفها (عكس مسارها) حتى لا تلاحظه الأسماك ويلتقط برجليه السمكة ويمسكها جيداً بمخالبه القوية.

#### ٢.٣ العقاب الأسحم أو العقاب التلوي

(Tawny Eagle (Aquila Rapax

يتشابه العقاب الأسحم مع عقاب السهول

المهاجر ويصعب تمييزها حتى بين بعض العاملين بالطيور، وذلك لظلة الاختلافات بين أفراد هذين النوعين، ومن أهم الفروقات بين النوعين قاعدة فتحة المنقار لأنها تكون أصغر في العقاب الأسحم من عقاب السهول، ويعيش هذا النوع في المناطق الحبلية بجنوب غرب المملكة ويعيش بين شهري ديسمبر وأبريل، وتضع الأنثى البيض في أعشاش كبيرة الحجم ومبطنة بالحشائش وشعر الماشية وذلك على أشجار شوكية كالسمرة. ويبلغ عدد البيض عادةً بيضتين، يحضن لمدة ٢٩ - ٤١ يوماً وتصل الأفراخ لسن الطيران وعمرها بين ٧٧ - ٨٤ يوماً. وتتغذى هذه الطيور على الثدييات والطيور المتوسطة الحجم كالآرانب والحجل وتتغذى أيضاً على النافق من الحيوانات، ولا يعرف الكثير عن هذا الطائر خاصة بالمملكة سوى أن أعداده تتناقص بشكل كبير وقد قلت المشاهدات لهذا الطائر خاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة.

#### ٣.٣ العقاب الذهبي

(Golden Eagle (Aquila chrysaetos

أول مشاهدة لي لهذا الطائر كانت بجبال الحمراء بمنطقة وادي الدواسر، والمعروف هو وجود هذا الطائر بالجنوب الشرقي للمملكة مع الحدود السعودية العمانية، كما سجل بجبال الفقرة بمنطقة المدينة المنورة، وهو من العقاب الجميلة، وقد استخدمه المنغوليون والصينيون قديماً في الصيد، وتتميز الذكور بأنها أصغر من الإناث حيث تتراوح أوزانها بين ٢٨٤٠ - ٤٥٥٠ جراماً أما الإناث فيتراوح وزنها بين ٣٦٢٠ - ٦٦٦٥ جراماً ولون الريش بني غامق وبني فاتح يميل للصفرة في منطقة تاج الرأس. ويعيش بالمناطق الصحراوية ذات الأشجار وكذلك الجبلية والسهلية، ويتغذى على الحيوانات المتوسطة الحجم كالآرانب البرية والوبر ومن الطيور الحجل وأحياناً صغار





١٩٩٠م، بعد ذلك لوحظ الطائر بوادي تربة، ومنطقة الفقرة بالمدينة المنورة ومنطقة الهدا بالطائف، كما سجل أحد العاملين بالمركز عشاً للعقاب الأسود بوادي تربة جنوب الطائف، ومن أهم مميزات هذا الطائر هو اللون الأسود والبقة البيضاء من الريش على ظهره والأنثى أكبر من الذكر حيث يتراوح وزنها بين ٣١٠٠ - ٥٨٠٠ جرام، أما الذكر فيتراوح وزنه بين ٣٠٠٠ - ٤١٥٠ جراماً

ويتغذى هذا النوع بشكل كبير على الوبير، وقد شاهدت خلال مراقبتي لمجموعة من الوبيران بوادي قرننين نزول هذا الطائر بشكل سريع ليلتقط أحد أفراد الوبيران بسرعة مذهلة جداً، ويتغذى العقاب الأسود أيضاً على الحيوانات النافقة، كما سجل في مناطق بأفريقيا تغذيته على صفار القروود، ويعتقد أن هذا الطائر ربما يتغذى على قروود اليابون بالمملكة، حيث لوحظت تفسيرات في سلوك القروود خلال وجود هذا الطائر بالمنطقة، وتعيش هذه الطيور بين شهري ديسمبر ومايو، وتبني أعشاشها على المنحدرات

الماشية إذا لم يكن معها راع وأحياناً على الحيوانات النافقة من الماشية، كذلك يمكن أن يتغذى على الزواحف كالنعاين والضبان.

وتتكاثر هذه الطيور في شهر ديسمبر إلى شهر أبريل وتضع الأنثى عادةً بيضتين، ويحضن البيض بواسطة الأنثى أما الذكر فيقوم بجلب الغذاء خلال فترة حضانة البيض التي تستغرق ٤١ - ٤٤ يوماً، وتصل الفراخ لسن الطيران وعمرها حوالي ٦٥ - ٨٥ يوماً، ويبقى الصغير مع والديه لمدة من شهرين إلى أربعة وربما أكثر قبل أن يتركهما ليعتمد على نفسه. والعقاب الذهبي من الطيور غير المهددة بالانقراض عالمياً ولكنه مهدد في بعض المناطق خاصة بالمملكة.

### ٤.٣ العقاب الأسود

Verreaux's Eagle or Black Eagle (Aquila verreauxi)

يستوطن في المناطق الجبلية بجنوب غرب المملكة، وأول مشاهدة لهذا الطائر كانت بوادي قرننين بمنطقة عسير في شهر ديسمبر من عام

### ٦.٣ العقاب المصفر

(Bateleur (Terathopus ecaudatus)

أول تسجيل لي لهذا الطائر كان عام ١٩٨٧م وذلك بالقرب من وادي الليث، ويوجد هذا الطائر في المملكة بمنطقة تهامة ومنطقة الهضاب بالقرب من جبال عسير جنوب غرب المملكة، وذلك من منطقة الليث شمالاً حتى حدود اليمن جنوباً، وعلى الرغم من هذا الانتشار فلم يسجل تشييشه إلا حديثاً بالقرب من أبو عريش بمنطقة جازان. وهذا النوع من الطيور ترجع أصوله لأفريقيا، وهو من الأنواع التي تمثل النطاق الجغرافي الأفريقي الاستوائي بالجزيرة العربية.

ومن أهم مميزات هذا النوع قصر الذيل وطول في الريش الأول للأجنحة، كذلك الأحمر الغنابي عند قاعدة المنقار والجزء السفلي من الذيل، ويمكن التفريق بين الذكر والأنثى خلال طيرانهما بأن الريش الثانوي بأجنحة الذكر غالباً أسود، أما الأنثى فهي رمادية من أعلى ومائلة للبيضاء من أسفل مع خطوط سوداء، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة من طيور وثدييات كالقوارض، وكذلك يتغذى على الحيوانات النافقة وأحياناً على الحشرات والزواحف.

وتضع الأنثى بيضة واحدة في أعشاش كبيرة الحجم مقارنة بحجم الطائر الذي يتراوح وزنه بين ١٨٢٠ - ٢٩٥٠ جراماً، ويصل الفرج لسن الطيران بين ثلاثة وخمسة أشهر، وفي مناطق أفريقيا وصل الفرج لسن الطيران في عمر ١٩٤ يوماً، ويبقى بالقرب من أبويه بعد ذلك لأكثر من أربعة أشهر قبل أن يستقل عنهما.

### ٧.٣ عقاب الصيادين قصير الساق

(Short-toed Eagle (Circaetus gallicus)

يشاهد هذا الطائر بكثرة خلال فصل الشتاء بمنطقة تهامة خاصة جنوب القنفذة، وقد سجل أحد باحثي المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية تشييش هذا الطائر بمحمية ريدة. ومما يميز هذا

الجبيلة وذلك من أغصان الأشجار، وحجم العش كبير يصل قطره إلى متر ونصف المتر. وتضع الأنثى بيضة إلى ثلاث، ويحضان البيض لمدة ٤٢ - ٤٦ يوماً وتصل الأفراخ لسن الطيران وعمرها أكثر من ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من أن العقاب الأسود ليس من الطيور المهددة بالانقراض عالمياً إلا أن أعداده بدأت في التناقص بأفريقيا موطنه الأصلي، وفي المملكة أيضاً فالطيور التي كانت تعيش بمناطق معروفة لم تعد تشاهد أعشاشها في الوقت الحالي، ويرجع ذلك ربما للصيد حيث لوحظ قبل فترة طائر مصوب برصاصه وآخر معروض للبيع بمسوق الطيور بالطائف، كما أن تدهور المواطن جراء الرعي الجائر أو التحطيب للذين يؤثران على فرائسها مما يقلل عددها وبالتالي على هذا النوع من الجوارح، كما أن صيد الوبر الجائر بالمناطق الجبلية ربما يكون له علاقة بقلة أعداد هذه الطيور.

### ٥.٣ العقاب المخطل (عقاب بونيليز)

Bonelli's Eagle (Hieraetus fasciatus)

يعيش هذا النوع من العقاب في المناطق الجبلية بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، ويمتاز عند الطيران بخطوط بيضاء وسوداء ويقع بيضاء على ريش الظهر، والأنثى أكبر حجماً من الذكر ويتراوح وزن هذه الطيور بين ١٦٠٠ - ٢٤٠٠ جرام.

ويتغذى هذا النوع على الطيور والثدييات متوسطة الحجم مثل الحجل والوبر وأحياناً الفريان والزواحف، ويعيش من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل، وتضع الأنثى بيضة أو بيضتين، تحضنها لمدة ٣٧ - ٤١ يوماً وخلال هذه الفترة يقوم الذكر بجلب الغذاء للأنثى حتى المراحل الأولى من نمو الصغار، حيث تقوم الأنثى بالمساعدة في جلب الغذاء، ويبقى الصغار إلى عمر ٦٠ - ٧٠ يوماً قبل أن تستطيع الطيران، ويحضر هذا النوع من الجوارح إلى أكثر من عشرين عاماً.

ويأكلها وهو طائر. فكان بالفعل منظراً جميلاً لا ينسى. ويؤدي هذا النوع من الطيور دوراً كبيراً في التوازن البيئي، وذلك بتغذيته على الثعابين التي لو زادت يمكن أن تزيد مخاطرها على الإنسان والحيوان.

١. جوارح أخرى تعيش بالملكة العربية السعودية.

١-٤ الحدة ذات الجناح الأسود

(Black Shouldered Kite (Elanus caeruleus)  
من الطيور الجميلة في مملكتنا الحبيبة وتتميز بالريش الأسود على جناحيها، ومن هنا جاء اسمها وتوجد في المنطقة الجنوبية الغربية



النوع من الطيور كبر حجم الرأس خاصة من الجهة الخلفية منه، وكذلك العيون الصفراء والبياض بباطن الأجنحة خلال الطيران. ومن اسم هذا الطائر يتضح أنه يتغذى على الثعابين والزواحف التي تمثل تقريباً حوالي ٧٠ - ٨٠٪ من غذائه، كذلك تضم قائمة غذائه الطيور والديديات الصغيرة والضفادع والحشرات.

وتعشش هذه الطيور غالباً على الأشجار بالمناطق الشجرية (الكثيفة الأشجار) حيث تبني أعشاشها من أغصان الأشجار وتبطنها بالأوراق والحشائش، وأعشاش هذا الطيور صغيرة مقارنة بحجمها وعادة تضع الانثى بيضة واحدة فقط تحضنها لمدة تتراوح بين ٢٥ - ٢٧ يوماً، ويقوم الذكر بتغذيتها خلال هذه الفترة، ويصل الفرج لسن الطيران وعمره بين ٦٠ - ٨٠ يوماً ومعدل اعمار هذه الطيور حوالي ١٧ سنة، وهذا النوع من الطيور يرغب الكثير من محبي الطيور في مشاهدته لجماله وطريقة انمصاصه على فرائسه من الثعابين، ومهم حق فقد شاهدت هذا الطائر وهو يلتقط أحد الثعابين بالقرب من وادي حلي

للمملكة وذلك على ساحل تهامة، وتشاهد بشكل حيد بمنطقة وادي بيش ووادي حاران وذلك بين مزارع الذرة والخبز. وإن كان هذا النوع لم يتأكد من بعشيشه لكن مشاهدته بمعظم اوقات العام تدل على تكاثره بالملكة، وتتميز هذه الحدة بصغر حجمها وغيوتها

وهي تلتقط الحيوانات الصغيرة النافقة على الطرقات السريعة.

وموسم التكاثر للحدأة السوداء يبدأ في فصل الربيع وفي مناطق أخرى يبدأ قبل ذلك من شهر ديسمبر إلى شهر يوليو حيث تضع الأنثى بين ٢ - ٣ بيضات، وتقوم الأنثى بحضانة البيض منفردة، ويقوم الذكر بحراستها وجلب الطعام لها، وتصل الفراخ لسن الطيران بين ٤٢ - ٥٠ يوماً وعادة لا يصل منها لهذا السن سوى فرخ واحد. والحدأة السوداء ليست من الطيور المهددة بالانقراض عالمياً ولكن بالملكة يعتقد أن المجموعات المستوطنة تناقصت خلال العقود الثلاثة الماضية بشكل كبير.

#### ٣-٤. باق كابر

Gabar Goshawk (Micronisus gabar)

لم يعرف تمشيش هذا النوع بالملكة إلا في وقت قريب، وذلك حينما كنت برفقة مجموعة من معبي الطيور البريطانيين خلال شهر مارس من عام ٢٠٠١م بمنطقة أبو عريش لمتابعة بعض الطيور بالمنطقة، وذلك على شجرة تمر هندي بمشروع حاكمه التابع لسد وادي جازان حيث سجلت العش وبه ثلاث بيضات بيضاء اللون، وخلال زيارة سريعة قمت بها منفرداً خلال شهر أبريل قمت بتصوير الفراخ بعد فقس البيض، وهذا النوع من الطيور يرجع أصله إلى النطاق الجغرافي الأفريقي الاستوائي.

ويختلف حجم الذكر عن الأنثى في هذا النوع، حيث يتراوح وزن الذكر بين ١١٠ - ١٧٣ جراماً والأنثى بين ١٨٠ - ٢٢٠ جراماً. ويتميز الطائر باللون الأحمر على المنقار والبيض بين الذيل والظهر والأرجل البرتقالية اللون، ويتغذى على الطيور الصغيرة والزواحف الصغيرة والقوارض الصغيرة والحشرات، ومن سلوكياته في التغذية الوقوف على أعالي الأشجار ليصمر بنظره الحاد أية تحركات لفرائسه، ومن ثم

الحمراء والأنثى أكبر حجماً من الذكر، حيث يتراوح وزن الذكر تقريباً بين ١٩٧ - ٢١٧ جراماً أما الأنثى فيتراوح وزنها بين ٢١٩ - ٢٤٢ جراماً. وتشاهد هذه الطيور بالملكة منفردة أو زوج إلى اثنين على أسلاك الكهرباء أو محلقة فوق المزارع، وفي بعض المناطق من العالم التي تكثر فيها هذه الطيور تتجمع خارج مناطق التمشيش للراحة أحياناً بأعداد كبيرة. وتبني هذه الطيور أعشاشها على الأشجار وبين الأعشاب الكبيرة الكثيفة، حيث تضع الأنثى بين ٢ - ٤ بيضات وتحضنها لمدة تصل بين ٣٠ - ٣٢ يوماً، وتصل الفراخ لسن الطيران وعمرها بين ٣٠ - ٣٥ يوماً. وتتغذى هذه الطيور على الفئران والزواحف الصغيرة والحشرات، لذا فهي تؤدي دوراً في التخلص من الآفات الزراعية التي قد تؤثر على المحاصيل. وعلى الرغم من أهمية هذه الطيور بيئياً إلا أن أعدادها قد تأثرت بالمبيدات الحشرية التي ترش بشكل كبير بمنطقة تهامة.

#### ٤-٤. الحدأة السوداء (Black Kite (Milvus migrants)

هي أكبر حجماً من الحدأة سوداء الجناح، حيث يتراوح وزنها بين ٥٦٧ إلى ٩٤١ جراماً، وتمشش في جنوب غرب المملكة على الهضاب بالقرب من جبال عسير وعلى ساحل تهامة، وتشاهد بكثرة بالقرب من ميناء جازان والتمعة والدرب، وتكثر خلال الهجرة في معظم مناطق المملكة خاصة بالقرب من مرامي النفايات.

من أهم مميزاتها أن لونها يميل إلى الأحمر البني، وكذلك الذيل الذي على شكل سبعة يتحرك عند الطيران للحفاظ على توازنها. وتمشش هذه الطيور على الأشجار وأعمدة الكهرباء العالية، وقد تم تسجيل أحد الأعشاش في بداية عقبة ضلع على إحدى الأشجار المرتفعة، وقد استخدمت عش أبو مطرقة وتتغذى هذه الطيور على الحشرات والزواحف وعلى الحيوانات النافقة الصغيرة، وكثيراً ما تشاهد



صورة  
القطر

الأنثى بين ١ - ٤ بيضات وعادة اثنتين، وقد وجدت بالعيش الذي تم اكتشافه بالملكة ثلاث بيضات فقسّت كلها، وتبلغ مدة حضانة البيض بين ٢٢ - ٣٥ يوماً، وتصل الفراخ لسن الطيران بين ٣٠ - ٣٥ يوماً أيضاً، وهذا النوع من الجوارح من الطيور المهددة بالانقراض بالملكة،

ينقض على فريسته لذا فهو عادةً يرى طريدته قبل أن يتحرك لصيدها وإن كان قد سجل بهاجم طريدته خلال الطيران.

ويعش خلال شهر مارس حيث تضع الأنثى في عش من الأغصان النخيلة والقصيرة ومبطّن بالريش والحشائش وخيوط العنكبوت، وتضع

ولكنه ليس مهدداً عالمياً فهو منتشر في كثير من مناطق أفريقيا.

#### ٤-٤ الباشق القائم

(Dark Chanting-goshawk (Melierax metastases)  
هذا النوع أكبر حجماً من باشق كابر حيث يتراوح وزن الذكر منه بين ٦٤٦ - ٦٩٥ جراماً والأنثى بين ٨٥٢ - ٨٤١ جراماً. ويختلف عنه أيضاً في طول الأرجل. ولون الباشق القائم رمادي غامق، ويمكن تمييز الذكر من الأنثى في هذا النوع من الحناج حيث يكون لون الريش الغظلي للحناج فاتح في الذكر وغامق في الأنثى. يشاهد هذا النوع من الطيور في منطقة

تهامة من حبوب حدة الى الحدود اليمنية، ويكثر في المناطق الشجرية خاصة في منطقة حلي بالقرب من القنفذة. ويتغذى على الحشرات والرواحف كالثعابين والطيور الصغيرة والضفادع، وتتشابه طريقة صيده لطرائده مع باشق كابر، ويتكاثر عادةً من شهر فبراير، وقد تم تسجيل اعشاش له بعد امطار الخريف ويقوم هذا النوع ببناء عشه على الأشجار. حيث يضع كمية من الاغصان كقاعدة للعش واحيانا يضيف الطين علاوة على اعشاش لطيور صغيرة كعش طائر الحباك ويبطنه بالحشائش وشعر لمائية وريش الطيور وخبوط العنكبوت. وتضع الأنثى بين بيضة الى بيضتين ويحضن





ويونيو، وذلك بمنطقة الهضاب بجنوب غرب المملكة بين سهل تهامة وجبال عسير، وتتميز الأنثى بأنها أكبر من الذكر وأن قاعدة الفك العلوي للمنقار تميل للون البرتقالي بينما الذكر يميل أكثر للون الأحمر، ويوجد هذا النوع في المناطق الشجرية والسهلية، ويتغذى على الزواحف والطيور الصغيرة والحشرات.

ويتكاثر هذا الطائر بين شهري يناير ومايو ويبنى عشاً صغيراً على الأشجار، وتضع الأنثى بين ٢ - ٢ بيضات، ويحضان البيض لمدة تتراوح بين ٢٣ - ٣٥ يوماً، وهذا النوع من الطيور ليس مهدداً بالانقراض عالمياً لكن أعداد الطيور المعششة بالمملكة منه قليلة جداً، وقد سجل أحد باحثي المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية عش هذا الطائر بمحمية ريدة.

#### ٦.٤ الباز ذو الأرجل الطويلة

Long-legged Buzzard (Buten rufinus)

هذا النوع من الجوارح منتشر في وسط وشمال المملكة وبشكل أكبر في جنوب غربها، وقد تم تسجيل عش هذا الطائر بوادي سبيل بمنطقة هدي الشام كذلك بالأودية أسفل عقبة ضلع، والأنثى أكبر من الذكر حيث يتراوح وزنها بين ٩٤٥ - ١٧٦٠ جراماً والذكر بين ٥٩٠ - ١٢٨١ جراماً، وعلى الرغم من الاختلافات الفردية في النوع نجد أن هذه الخطوط بالذيل تختفي أكثر في ريش الذيل وبشكل عام لونه بني محمر.

ويتغذى على القوارض والطيور الصغيرة والرواحف، وتبنى هذه الطيور أعشاشاً كبيرة على الأشجار، وتضع الأنثى بين بيضتين إلى ثلاث بيضات، ولا يعرف عن هذه الطيور الكثير من ناحية فترة الحضانة أو سن الطيران للفراخ، ولكن الصغار تبقى مع والديها فترات طويلة بعد طيرانها تصل إلى أربعة أشهر، وهو إن كان غير مهدد عالمياً بالانقراض إلا أن أعداده تناقصت بشكل كبير بالمملكة.



البيض لمدة لا تقل عن ٣٠ يوماً، وتصل الفراخ لسن الطيران وعمرها بين ٤٠ - ٥٠ يوماً وفراخ هذه الطيور مزعجة عند الاقتراب منها حتى بعد طيرانها حيث تبقى بالقرب من العش لتحصل على غذائها، وهذا النوع من الطيور غير مهدد بالانقراض عالمياً، ومحلياً بدأ يحتمي من عدة مناطق حيث أشار أحد المسوحات بمنطقة حاران خلال ربيع هذا العام إلى أنه لم يشاهد أيّاً من أفراد هذا النوع.

#### ٥.٤ البازق الكستنائي (هيكرا)

Shikra (Accipiter badius)

يلاحظ صغار هذا الطائر في شهري يوليو



#### ٥. دور الجوارح في النظام البيئي.

من خلال استعراضنا للطيور الجوارح وطرق تغذيتها وكذلك غذائها نجد أنها تؤدي دوراً كبيراً في المحافظة على التوازن للنظام البيئي، فالنسور تتغذى على النافق من الحيوانات، لذا فهي تخلصنا من بقايا هذه الحيوانات النافقة التي قد يكون نفوقها بسبب الأمراض، لذا فهي تحد من انتشار هذه الأمراض بتفديها على النافق من الحيوانات. وقد وضعها العلماء في قمة الهرم الغذائي في المناطق الحشاشية حيث تخلص البيئة من النافق من الحيوانات وتحفظ التوازن البيئي. وحتى في طريقة تغذية هذه النسور فهي على الرغم من أنها تتغذى على الجيفة وتتراحم

عليها فهي تقسمها فيما بينها كل يأخذ نصيبه، فلو نظرنا إلى هذا التوزيع في الغذاء بين هذه الطيور على الحيمة نجد أن هناك توازناً حتى في توزيع الغذاء بين هذه الطيور الرمية فتنسر الادون يفتح الحيفة ويأخذ نصيبه منها وتأتي النسور السمراء لتتغذى على الانسحة العضلية وتقوم الرخمة المصرية بالتغذي على ما يتساقط من النسور الكبيرة ليأتي النسر الملتهج ليتغذى على العظام، فسبحان الخالق.

تعمل العقبان والصقور الحوارح الأخرى من خلال تغذيتها على أنواع معينة على الحد من زيادة أعدادها، فالعقبان تتغذى على الوبر الذي يتكاثر بشكل سريع وبزيادة أعداده ربما يؤثر على



المواطن التي يعيش بها، لذا فإن تغذيتها على هذه الثدييات وحتى الطيور يعمل على موازنة أعدادها، بالإضافة إلى أنها تعمل على التخلص من الأفراد الضعيفة، أما القوية منها فيمكنها أن تهرب لتبقى وتتناسل، حتى الصقور فهي تصيد الطيور الضعيفة أما القوية فيصعب عليها إمساكها، فالصقر الفاحم (البكاء) يعتمد في غذائه على الطيور المهاجرة وهذه الطيور تكون مجعدة من طول المسافة التي تقطعها فيعمل على إمساك الضعيف منها والتي تكون صغيرة أو مجعدة أما القوية فيصعب عليه إمساكها، وكما أن الطيور التي تتغذى على الحشرات تؤدي دوراً في تخليصنا من الحشرات المؤذية وكذلك التي

تتغذى على القوارض تعمل على تخفيف الضرر على المزروعات، وبذلك تقوم هذه الطيور بالحد من زيادة أعداد هذه الحيوانات الضارة بالإنسان ومزروعاته.

#### ٦. العوامل التي أدت إلى تناقص أعداد الجوارح بالملكة.

هناك عدة عوامل أدت إلى تناقص أعداد الجوارح بالملكة منها: الصيد، والتسميم، والمبيدات الحشرية، والإزعاج في مناطق التعشيش، والتعذية، وأعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي، وتدهور المواطن، وأخيراً اختفاء بعض الأنواع التي لها علاقة غير مباشرة بهذه الطيور.




#### ١٠٦ الصيد:

بمسك الصقور وهدفهم الأساسي الرياح المادي فقط. والكثير منهم لا يعرف الفرق بين العقاب والنسر والصقر الحر والعوسق فتجدهم يمسكون أي شيء، أما الصقارون الحقيقيون هم ممن وروثوا الصقارة عن آبائهم وأجدادهم ويميزون بين أنواع الصقور وأعمارها وكيف يحافظون عليها وكيف يدربونها ويعتنون بها.

وإن كان من هذه الطيور ما يستخدم كطعم (طراد) لمسك الصقور، فتجد الكثير من الجوارح تباع بالسوق ليس لها أي نفع لمن يشتريها بل على

الصيد هنا مقصود به الصيد للقتل وكذلك مسك الطيور حية، والأول - وللأسف الشديد - موجود ويمارس من قبل الشباب وذلك مع العقاب والنسور. وقد تم تسجيل عدة حالات بالطائف والقصيم وينبع خاصة خلال الهجرة هي الخريف. أما مسك الطيور حية فهو وإن كان يمارس للاستفادة منها مادياً ببيعها لاستخدامها بالصيد. ولكن خلال السنوات الأخيرة لوحظ كثرة العاملين



من الأميين أو الذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية لفهم التعليمات المدونة، لذا فإن برامج التوعية عن مخاطر هذه المواد ربما تكون مهمة للحد من هذه المشكلة.

### ٣.٦ المبيدات الحشرية:

اشتمت الدراسات بالملكة وكثير من مناطق العالم ان المبيدات الحشرية هي السبب وراء تدهور اعداد الحوارج في أنحاء العالم، ومن أكثر الجوارح تأثرا بهذه المبيدات النسور والعقبات.

العكس فريما تتفع وهي طليقة. وعادة تكون حالة هذه الطيور يرثى له. وليس هذا فحسب بل إن بعض هؤلاء أخذ يمتدي على الجوارح المحلية، ويأخذ بيضها وفراخها ومن هذه الجوارح المحلية صقر الشاهين الجبلي والوكري اللذان تناقصت أعدادهما بشكل كبير جداً، كذلك هناك العقاب الأسود والحدآت.

### ٢.٥ التسميم:

يتم ذلك بوضع السموم على الحيوانات النافقة وذلك للقضاء على الكلاب الضالة أو المفترسات كالذئاب أو الضباع، وعندما تأتي النسور أو العقبات للتغذي من هذه الحيوانات النافقة فإنها تتفقد، وللأسف الشديد: فإن الحصول على هذه المواد سهل جداً وذلك مباشرة من الأسواق المحلية فهي متوافرة بالصيديات البيطرية، وكذلك عن طريق فروع وزارة الزراعة والبلديات المحلية، ومن هذه السموم التي تم العثور عليها ما هو على شكل حبوب أو سائل وقد لوحظ استخدام Strychnine Sulfate بالقرب من محمية محارة الصيد.

وهي كثير من بلدان العالم التي تستخدم هذه المواد للقضاء على الكلاب أو القطط الضالة وحتى الطيور التي لها تأثير على البيئة كالغربان: فإنها تتم بعد متابعة ودراسة بيئية لتقييم التأثيرات الجانبية، فمعرفة المكان والموقع والحيوانات البرية الموجودة بالموقع مهمة جداً في القيام بهذه المكافحة. وللأسف الشديد إن تأثير هذه المواد على الحيوانات البرية كبير ولم يتخذ فيه أية إجراءات، كما أن الكثير من المواطنين المستخدمين لهذه المواد يجهل المضار التي تسببها هذه السموم على الأحياء الفطرية وعلى الإنسان أيضاً بسبب الجهل بالطرق الصحيحة لاستخدام هذه المواد والتعامل معها، كما أن أغلب التعليمات لاستخدام هذه المواد موجودة باللغة الإنجليزية ونادراً ما تكون بالعربية: والمستخدمون لهذه المواد




والحدّات بنوعيتها. وقد تم العثور على عدة حالات بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. وقد زاد ذلك مع استخدامات المبيدات للقضاء على الحشرات والبعوض المسبب لمرض حمى الوادي المتصدع، وللأسف الشديد فكنّير من هذه المبيدات تؤثر على الإنسان قبل الحيوان، والحقيقة أننا بحاجة لدراسة تأثير هذه المبيدات ليس على الجوارح فقط ولكن على الأحياء القطرية بصفة عامة خاصة بمنطقة جازان.

#### ٤.٦ الإزعاج في مناطق التعشيش والتفخيز،

وُجد تأثير هذا العامل على الجوارح التي تعشش على الأشجار. وكذلك في المناطق الحبلية التي تستخدم لرياضة تسلق الحبال والتي أصبح لها عشاقها في المملكة. وقد أشارت الدراسات على النسر الوردي بالمملكة إلى أن من أهم





أسباب تناقص أعدادها بالمملكة هو الإزعاج حول منطقة العش، فقد اختفت الطيور الممثلة خارج محمية محاذة الصيد وزادت الأعداد داخل المحمية، كما أن الدراسات في مناطق أخرى من العالم أشارت إلى أن تناقص أعداد العقبان والنسور وحتى الصقور الممثلة على المنحدرات الجبلية كان نتيجة لإزعاج المتسلقين لهذه الطيور خلال موسم التكاثر.

#### ٥-٦ أعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي،

قد يستغرب البعض هذا السبب ولكنه يحدث وإن كانت لا توجد دراسات متخصصة في هذا المجال بالمملكة، ولكن الكثير من الأبحاث التي أجريت بأفريقيا وأوروبا وأمريكا أشارت إلى ذلك، وقد لاحظت خلال تجوالي في بعض هذه المناطق تحت أعمدة الكهرباء وجود طيور كالبيوم والفران، وتأثر الطيور خلال وقوفها على منطقة التوصيل على أعمدة النور التي عادة ما تكون غير عازلة. ولتفادي هذه المشكلة في جنوب أفريقيا تم تصميم أعمدة كهرباء تكون الأسلاك متصلة من أسفل بحيث لا يستطيع الطائر الوقوف عليها.

#### ٦-٦ تدهور المواطن،


يقصد بالمواطن المناطق أو البيئات التي تعيش فيها الجوارح، وتدهور المناطق التي توجد بها الجوارح يأتي إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فمثلاً الرعي الجائر سوف يؤثر على الغطاء النباتي بالموطن وبالتالي تتأثر الحشرات والقوارض والطيور التي تتغذى على هذه النباتات، ونقص هذه الأحياء التي تعدّ الغذاء لهذه الجوارح سوف يؤثر عليها مما يجعلها ربما تغادر المنطقة أو أنها تنفق خاصة الصغار منها.

كذلك من العوامل التي أثرت على نقص أعداد النسور وصقور الشاهين في المملكة تهديم مواطنها، فمثلاً في المنطقة الجنوبية الغربية

قامت إحدى شركات التعدين بتكسير جبال للحصول على الجرانيت، وفوق أن جمال المنطقة ذهب بذهاب هذه الجبال كذلك هذه الجوارح التي زين بها الله هذه الأرض قال تعالى: ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها﴾ [الكهف: ٧].

٧-٦ اختفاء بعض الأنواع التي لها علاقة غير مباشرة بهذه الجوارح؛

هناك حيوانات تعتمد على حيوانات أخرى للحصول على غذائها، فمثلاً النسور السمر



والرخمة المصرية يعتمدون على الذئاب والضباع والثعالب وحتى النمر لمساعدتها في فتح جلد الحيوان النافق. كما تساعدهم هذه الطيور على تحديد مواقع هذه الحيوانات النافقة، وقد أشارت إحدى الدراسات بأفريقيا إلى أن الضباع تتبع النمر للوصول إلى مكان الغذاء. فهذه النمر تنغذى على الأنسجة الناعمة من الحيوان النافق، وبما أن مناقيرها ليست بالكفاءة لفتح جلود الحيوانات النافقة فهذا يعني أنها تحتاج لمساعدة من هذه المفترسات لعمل ذلك، لذا فإن اختفاء هذه المفترسات ربما يؤثر على وجود هذه الطيور.

#### ٧. هجرة الجوارح بالملكة العربية السعودية.

في منتصف فصل الخريف تصل للمملكة مجموعات كبيرة من الجوارح وذلك خلال هجرتها الموسمية، ويمكن تقسيم هجرة الجوارح إلى أربعة أقسام مثلها مثل هجرة الطيور الأخرى.

الهجرة الأولى تعرف بالزائرة الشتوية: وهي تطلق على الطيور التي تأتي إلينا في نهاية الخريف (أكتوبر - نوفمبر) لتقضي الشتاء بالملكة وتعود مع بداية الربيع (مارس - أبريل) إلى مناطق تعشيشها في أوروبا أو آسيا، ومثل ذلك مجموعات من عقاب السهول والعقاب الإمبراطوري، وكذلك مجموعات من الصقور كالصقر الحر والشاهين البحري والعقاب والبواشق وكذلك الحداد.

الهجرة الثانية تعرف بالمعبرة: وهي تطلق على طيور تمر على المملكة خلال هجرتها بين مناطق تعشيشها في آسيا أو أوروبا. والمناطق التي تقضي فيها فترة الشتاء. وقد تتوقف خلال هجرتها لمترات قصيرة تتراوح بين ساعات إلى ثلاثة أسابيع. وقد تعود خلال هجرتها من المنطقة نفسها ولكن ليس دائما، حيث إن هناك دراسات على مجموعات لعقاب السهول التي تأتي عابرة للمملكة عادت إلى مناطق تعشيشها في الربيع عن طريق صحراء سيناء.

الهجرة الثالثة تعرف بالزائرة الصيفية: وهذه قليلة في الطيور الجوارح حيث يوجد نوع واحد ربما يقوم بهذه الهجرة وهو صقر البكاء (Sooty Fal-con)، حيث يأتي للجزر بالبحر الأحمر والخليج مع نهاية الربيع وبداية فترة الصيف ليعشش فيها معتمداً في غذائه على الطيور المهاجرة الصغيرة التي تبدأ هجرتها من شهر أغسطس.

الهجرة الرابعة تعرف بالطيور المنتشرة: وهي معروفة في صفار الطيور خاصة الجوارح منها. وهذا النوع من الهجرة هي تحركات الطيور بعيداً عن مناطق تعشيشها، مثال ذلك صفار النور التي تبعد لمسافة تصل إلى أكثر من ١٠٠٠ كيلومتر من العش بعد استقلالها عن أبويها، وبعض الباحثين لا يعدون هذه نوعاً من الهجرة لأنها ليست مؤقتة أو موجهة إلى موقع معين ولكن للمسافة التي تحركها هذه الطيور خلالها يمكن أن نعدّها نوعاً من الهجرة.

## المراجع العربية:

- شبراك، م. ١٩٩٦: ملاحظات على بعض ٢٠ أقدام مجلة الوضحي، العدد الثاني.
- شبراك، م. ١٩٩٩: لهدءنصور الأذن مجلة الوضحي، العدد الثاني عشر.
- شبراك، م. ١٩٩٩: م: نصور العالم القديم، مجلة القافلة شهر مصر سنة ١٤٢٠هـ.
- شبراك، م. ٢٠٠١: تقرير عن الرحلة التفقدية لثلاثة أعشاش الطيور في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية (مايو ٢٠٠١).
- شبراك، م. ٢٠٠١: ب: تقرير عن رحلة التعرف على أعشاش الطيور في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية (أبريل ٢٠٠١).
- شبراك، م. ٢٠٠١: ج: متابعة المواجه خلال هجرتها بواسطة الأقمار الاصطناعية بالمملكة العربية السعودية - مجلة الفيصل، جمادى الأولى ١٤٢٢هـ.
- شبراك، م. ٢٠٠٢: نصور .... ودوامه الانقراض - مجلة الوضحي.

## المراجع الأجنبية:

- Castell, P., Coburn, J., Pleasant, B., Quitteden, T., and Shobrak, M. 2002: Further notes on the breeding of some birds in Saudi Arabia. Sandgrouse 24 (1): 33-37.
- Del Hoya, J., Elliot, A. and Sargatal, J eds 1994. Handbook of the Birds of the World, Vol 2. New World Vultures to Guinea-fowl. Lyns Edicions, Barcelona.
- Newton, S. and Shobrak, M. 1993: The fappd-faced vulture *Torgos tracheliotus* in Saudi Arabia. Pore. VIII Pan Afr. Congr. 111-117.
- Ostrowski, S. and Shobrak, M. 2001: Pesticide poisoning in a free-ranging hipper-faced vulture *Torgos tracheliotus*. Veterinary Record 149, XXX-XXX.
- Rahmani, A. Shobrak, M. and Newton, S. 1994. Birds of the Tihama coastal plane of Saudi Arabia. OSM Bull. 32: 1-19.
- Shobrak, M and P., Pallet 1998: Studies on the Migration of Birds of Prey in Saudi Arabia. Proc. of the Symposium on Raptors of South East Asia. Japan.
- Shobrak, M. 2000: The role of avian scavengers in locating and exploiting carcasses in central Saudi Arabia. Raptor at Risk, Ed. Chancellor, R. D. & B. -U. Veyburg eds. W.W.G.R/Hancock house.
- Shobrak, M. and Alsubhany, A. 2002: The Status of the Breeding Seabirds at the Red Sea and the Gulf of Aden. PERNGA.

وتطير هذه الطيور خلال هجرتها بطريقتين الرهرفة، والتعليق فالرهرفة. تعتمد الطريقة الأولى على قوة الأجنحة وهذه الطريقة تمكن الطيور من الطيران في أي وقت وفي أي مكان سواء فوق اليابسة أو فوق البحر، ومثال ذلك الصقور التي تستطيع الطيران فوق البحار فمثلاً صقور الشاهين تستطيع أن تعبر البحر الأحمر خلال هجرتها بدون توقف معتمدة في ذلك على قوة أجنحتها.

أما التعليق فهو يعتمد على كبر حجم الجناح مقارنة بحجم الجسم، وهذه الطريقة معروفة في الطيور الكبيرة كالنسور والعقبان التي تعتمد على تيارات الحمل الساخنة وهي محدودة على اليابسة وخلال النهار وبالتحديد بعد شروق الشمس بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساءً، وهذه الطيور غالباً ما تكون كبيرة الحجم. وهناك من الجوارح من يستطيع الطيران بكلتا الطريقتين كالصقور مثلاً.

إن هجرة الطيور هي إحدى معجزات الخالق سبحانه وتعالى لتدبر قدرته وحسن صنفته فطيوران هذه الطيور الكبيرة منها كالنسور أو الصغيرة يثير العجب وكيف أنها تقطع المسافات الشاسعة، كما أن هذه الطيور المهاجرة هي ضيوف علينا يأتون إلى بلادنا كل عام فيجب أن نكرم ضيوفنا من أمة الطيور وأن نقى الله فيما استخلفنا الله فيهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ أَمَّا لَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٨].

يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: إلا أمة أمثالكم يريد يرفهوني ويوجدوني ويحمدوني، ويقول مجاهد: أمة أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، وقال الزجاج: أمة أمثالكم هي أنها تبعث. وقال ابن هتية: أمة أمثالكم هي طلب الغذاء وابتقاء الرزق وتوقي المهلك.

إن هجرة أمة الطيور هي إحدى معجزات الخالق سبحانه وتعالى التي تدل على قدرته وعظمته وهي أمانة وميراث في أعناقنا نخلفها للأجيال القادمة لترى إحدى معجزات الخالق.

# تاريخ الزراعة النسيجية

## في ظل التطور التكنولوجي

جمال نواف فخران العليمي



### تاريخ الزراعة النسيجية:


تعود بدايات تأسيس علم زراعة الأنسجة إلى عام ١٩٠٢م عندما توقع العالم الألماني هابر لند (Haberlandt 1902) المتخصص في فسيولوجيا النبات إمكانية نمو الخلايا النباتية في أوساط غذائية نقية مثل الكائنات العضوية الدقيقة كالبكتريا والفطريات. وكذلك تنبأ بقدرته الخلية النباتية الواحدة على تجديد نفسها وتكوين نبات كامل. وبعد مرور أكثر من ثلاثة

عقود على هذا التنبؤ وبالتحديد في عام ١٩٣٩م نجح العالمان الفرنسيان جو ثيريه و نو بيكوروسكوج كل على حدة في تنمية خلايا النبات على أوساط غذائية بالمختبر. ولقد أجري العديد من التجارب والبحوث في النصف الثاني من القرن الماضي على العديد من النباتات لدراسة تقنية زراعة الأنسجة، وقد نجح كثير من الباحثين في الحصول على نتائج باهرة خاصة عند استخدام بعض الهرمونات النباتية كالأوكتينات



وقد أسهمت الدراسات التي أجريت منذ  
عشرات المنين على نمو الخلايا والأنسجة  
النباتية في مزارع نقية في زيادة فهمنا للصفات  
الأساسية للنبات، ومنها أسرار الخلية النباتية  
الوراثية والفسيولوجية والكيميائية والحيوية.  
ثم تطور علم زراعة الأنسجة ليقطع خطوات  
متقدمة في إنتاج أجزاء ثمريّة، بمساعدة بعض  
الهرمونات النباتية. ففي عام ١٩٧٤م استطاع  
الباحثان Kumar and Wareing تحفيز تكوين

والسايتوكاينيات مع الأوساط الزراعية.  
وبعد ستين عاما من تنبؤ العالم هابر لاند  
Haberlandet بقدررة الخلية النباتية الواحدة على  
تجديد نفسها، نجح العالمان Vasil and Hildebrand  
(1965) في جامعة ويسكونسون أيضاً في إنتاج نبات  
كامل وتكوينه برزاعة خلية منمردة، ورصد  
انقسامها ونموها، حيث تمكنّا من الحصول على  
ناتات من خلايا مفردة من هجين نباتي التبغ  
(الدخان) *Nicotiana tobacum X N. glutinosa*.



ومهد ذلك الوقت طبقت زراعة الأنسجة النباتية في أكثر عدد كبير من أصناف النباتات الاقتصادية، وكان لها الأثر الفاعل في إنتاج نباتات وأصناف جديدة حالية من الأمراض والحشرات.

لهذا أصبحت تقنية زراعة الأنسجة النباتية من أهم الطرق الحديثة المتبعة في زراعة النباتات سواء بالنسبة لمربي النبات أو الباحثين هكذا خرجت تقنية زراعة الأنسجة النباتية من حيز البحث والتجربة إلى حيز التطبيق العملي والنحاري . وتنمير هذه التقنية خصائص وميزات عديدة أهمها

١ - تستخدم هذه التقنية في عمليات الإكثار السريع للحصول على أكبر عدد ممكن من النباتات لا يمكن نحفصها بيه طريقة أخرى من طرق تكاثر النباتات التقليدية.

الدرنات في نبات البطاطس البري *Solanum an. digena* عندما زرعاً قطعاً صغيره من سيقانها في أوساط عدائية حاوية على تركيز ١٠ جزء بالمليون من حامض *Acid Indole acetic* (أوكسين). كما استطاع الباحث (Stalknecht 1985) تحصيل تكوين الدرنات في سيقان البطاطس المقطوعة بنسبة ١٠٠ / التي زرعت أيضاً في وسط عدائي يحتوي على مادة (ساينوكاينيس) الكومارين *Coumarin* بتركيز ٢٥ جزء بالمليون.

وفعلاته استكمال المسدئ لهذا العلم عندما اكتشف العالم الأمريكي (Skoyg, 1944, 1951, 1957) في جامعة ويسكنسون أن تحصيل خلايا النبات لإنتاج المجموع الخضري أو الحشوي يعتمد بالدرجة الأولى على التوازن بين الهرمونات النباتية في البيئة العذنية وبالأخص الأوكسينات والسيتوكاينينات




وسوف نحاول من خلال هذا البحث ان نعرض للقارئ بعض النماذج العملية والتطبيقية المتبعة في زراعة الأنسجة لإنتاج بعض النباتات المهمة على المستوى الزراعي والاقتصادي لغرض الاستفادة، وسوف نقوم بعرض بعض المشكلات التي تواجه مزارع الأنسجة النباتية وأهم الحلول المناسبة لها.

#### البيئة لزراعة الأنسجة النباتية:

يمكن تلخيص عملية زراعة الأنسجة النباتية بأنها تتم عن طريق أخذ جزء نباتي (خلية أو عدة خلايا) معقم من النبات المطلوب إكثاره، ثم وضع هذا الجزء المعقم في بيئة غذائية معقمة (وسط زرع) تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لنمو الخلايا وتكاثرها إضافة إلى بعض الهرمونات الصناعية المحفزة لانقسام الخلايا ونموها، ثم وضع العينة المزروعة في بيئة ضوئية مناسبة ودرجة حرارة مثالية. فإن هذه الخلية (الخلايا) أو هذا الجزء النباتي الصغير سوف ينمو ويتحول إلى نبات كامل يطابق النبات الأم في جميع الصفات المورفولوجية والوراثية، فيكون هذا النبات الجديد بمثابة سلالة نباتية خضرية يمكن إكثارها إلى أعداد كبيرة من النباتات تحتوي على العدد الكروموسومي نفسه، وتحمل الصفات الوراثية (الجينات) نفسها، وتكون هذه النباتات متشابهة ومطابقة للنبات الأصلي (النبات الأم) بخلاف طريقة التكاثر الجنسي. ومن خلال هذه التقنية استطاع علماء تربية النبات استنباط سلالات غزيرة الإنتاج ذات جودة عالية، مقاومة للأمراض، تتحمل درجات الحرارة العالية والجفاف وملوحة المياه والتربة وغيرها من الصفات... إلخ.

وقد تطورت تقنية زراعة الأنسجة في عصرنا الحالي وخاصة خلال العقد الأخيرين، وحققت نجاحاً باهراً في مجالات كثيرة لأنواع مختلفة من النباتات، مثل إنتاج نباتات أحادية



٢ - سهولة السيطرة على الإصابة بالأمراض والأفات الزراعية التي تصيب الشتلات خلال فترة إعدادها، لذلك يمكن الحصول على سلالات خالية من الأمراض وخاصة الأمراض الفيروسية.

٣ - إنتاج مواد ومستحضرات طبية.

٤ - إنتاج هجن وسلالات يصعب إنتاجها بالطرق التقليدية، وإنتاج شتلات بأسعار رخيصة ولكن من صوباتها ما يلي:

١ - تحتاج زراعة الأنسجة إلى معامل (مختبرات) خاصة، تسمى معامل زراعة الأنسجة النباتية.

٢ - توفير كافة مستلزمات النظافة والتعقيم.

٣ - يجب توفر كافة المستلزمات والمواد الكيماوية الضرورية والأوساط الزراعية،

٤ - تتطلب عمالة فنية ماهرة وعلى درجة عالية من التدريب والخبرة والكفاءة.

الجنس من المتوك أو حبوب اللقاح وهذه مهمة ومفيدة في مجال تربية النبات، وفي إنتاج الأجنة الأصلية أو الأجنة الناتجة من عمليات التهجين Hybndization، أو إنتاج نباتات ثلاثية المجموعة الكروموسومية. وذلك بزراعة نسيج الإندوسبرم على أوساط غذائية زرعية media خاصة. فضلاً عن إمكانية استغلال زراعة الأنسجة النباتية والكالوسيات calluse في الحصول على العديد من المركبات الكيميائية ذات الأهمية الطبية في صناعة الأدوية لعلاج كثير من الأمراض، ومن هذه النباتات الريحان والنعناع والداتورة.

وتكتسب زراعة الأنسجة النباتية أهميتها لأنه يمكن من خلالها المحافظة على الأصول الوراثية التي يحتاجها المربون أو الباحثون والمحافظة عليها من الانقراض، وذلك بحفظها وإدامتها ضمن بيئة مسيطر عليها بدلاً من تعرضها لظروف البيئة القاسية.

يعدّ التكاثر العددي الهائل الذي تحققه تقنية الزراعة النسيجية من أهم صفاتها المميزة، حيث يمكن أن يتم في وقت قياسي إنتاج عدد كبير من النباتات مقارنة بطرق التكاثر التقليدية مثل العقل أو البراعم أو الفسائل.


وأصبح بإمكان مختبر لا تزيد مساحته على عدة أمتار مربعة أن ينتج مئات الألوف من النباتات الخالية من الأمراض والحشرات، والمطابقة لصفات الصنف الأصلي حيث إن إنتاجها بالطرق التقليدية يحتاج إلى مساحات مساحتها العديد من الهكتارات.

#### ما المتطلبات الضرورية لزراعة الأنسجة النباتية؟

لفرض ضمان نجاح زراعة الأنسجة النباتية لا بد من توفر معمل متكامل يحتوي على الغرف التالية

١- غرفة كمخزن للأدوات والمواد الكيميائية وكافة المستلزمات الضرورية.

٢- غرفة للغسيل، سواءً لغسل الأدوات والمعدات




ويجب أن تكون الغرفة مزودة بجهاز شفط الأتربة لحماية الأدوات المفسولة من التلوث، كما يفضل أن تزود الغرفة بفرن (oven) لتعقيم المستلزمات بعد غسلها للمحافظة عليها من التلوث.

٢- غرفة إعداد البينات الغذائية (Media Preparation Room) ويجب أن تحتوي على الأجهزة والمستلزمات التالية:

- جهاز تسخين.
- ميزان حساس.
- ماصات، كؤوس زجاجية، دوارق زجاجية.
- أنابيب اختبار.
- جهاز قياس الأس الهيدروجيني PH meter.
- حمام مائي Water bath.
- فرن مايكروويف.
- موقد بنزن يعمل على الغاز.
- جهاز تعقيم بالبخار (Autoclave) أو قدر ضغط بديل.
- ثلاجة ومجمدة.
- جهاز رج Shaker.
- جهاز تضريع البيئة من الهواء.
- ٤- غرفة الزراعة (Culture room).

يمكن إجراء تقنيات زراعة الأنسجة بنجاح في مكان نظيف وجاف، بعد اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع دخول أي ملوثات إلى الأدوات المستخدمة أو الوسط الغذائي أو العينات النباتية المطلوب زراعتها، كما يستخدم في هذه الغرفة صندوق بلاستيكي مغلق ومطهر جيداً بواسطة استخدام الأشعة فوق البنفسجية ultra violet على أن تظهر أرضيته باستخدام الكحول إيثانول ٩٥٪، أو يمكن استخدام بعض البدائل كتنبيت جهاز الهود Hood داخل غرفة الزراعة، ولكن سعته محدودة في الاستخدام.

ولكن بعد تقدم زراعة الأنسجة والاحتياج إلى إجراء العديد من الأعمال داخل الهود ولصعوبة



أو النباتات قبل زراعتها. ويجب أن تحتوي على أحواض خاصة للفسيل مصنوعة من الرصاص لمقاومة الأحماض والقلويات التي تستخدم داخل المعمل ومزودة بمصدر للمياه الساخنة والباردة فضلاً عن وجود منضدة بالمعمل ذات حجم مناسب يثبت عليها:

- جهاز التقطير لتحضير المياه المعقمة.
- غسالة للأطباق والأدوات الزجاجية والبلاستيكية وغيرها.
- أحواض بلاستيكية ومعننية لإجراء عمليات النقع والشفط والتنظيف.
- جهاز تجفيف يعمل بالطاقة الكهربائية.

بنزن أو موقد كحولي ومشارط وملاقط معقمة. ويجب أن يكون باب الهود محكمًا لا يسمح بدخول أو خروج الهواء منه أو إليه. ومن المتطلبات الأخرى المطلوب توافرها في غرفة الزراعة عربية لنقل الأواني الزجاجية والبيئات الغذائية التي زرعت بفرض نقلها إلى غرفة الحضانة فضلاً عن توافر رفوف لحمل أوعية الماء المقطر المعقم الذي يستخدم في غسل الأجزاء النباتية بعد عملية النقع في محاليل التعقيم مثل هايپوكلوريد الصوديوم (الكلوروكس) أو كحول الإيثانول وغيرها.

٥- غرفة التحضين (الحاضنة) (Incubation Room). هي غرفة تتوافر فيها رطوبة مناسبة ومدة إضاءة مسيطر عليها مع درجة حرارة ملائمة للإنبات والنمو. ويمكن السيطرة عليها من خلال منظمات خاصة بمدة الإضاءة ودرجة الحرارة Thermostat وعموماً فإن درجة الحرارة المثلى لنمو الخلايا والكالوسات والمزارع هي ٢٥ درجة مئوية. أما فيما يخص فترة الإضاءة وشدة الإضاءة فهناك تباين حسب نوع النبات المطلوب تنميته في الغرفة. فأحياناً تتطلب بعض المزارع النمو في ظلام دائم. وبعض المزارع تحتاج إلى نهار قصير (مدة ضوئية قصيرة) وبعضها يحتاج إلى نهار طويل (مدة ضوئية طويلة). أما من حيث شدة الإضاءة فتتقاس بوحدة يطلق عليها (كيلو لوكس). وأغلب النباتات تنمو في ضوء خافت لا تزيد شدة الإضاءة فيه على كيلو لوكس واحد. والبعض يحتاج إلى كثافة ضوئية عالية ٥ - ١٠ كيلو لوكس. أما بالنسبة للرطوبة النسبية فهي أيضاً تختلف باختلاف النباتات. ويمكن التحكم فيها عن طريق أجهزة التحكم بالرطوبة بين ٢٠ - ٩٨٪.

ذلك. أمكن استخدام غرفة كبيرة معقمة بواسطة (ultra violet) بحيث يدخلها هواء نقي خال من الأتربة بواسطة مجموعة من الفلاتر تصل كفاءتها إلى ٩٩,٩٪. ولا تسمح هذه الفلاتر للبكتيريا والأتربة بالنفاذ منها. وهذا النظام يستخدم في معظم معامل زراعة الأنسجة. وهو ما يطلق عليه هود Laminar airflow وهو عبارة عن جهاز مزود بمحرك صغير يدفع الهواء في أحد الفلاتر التي تحجز الأتربة العالقة ثم بعد ذلك يمر الهواء إلى فلتر دقيق HEPA 0.3 MM.

وعادة يكون الهواء القادم من منطقة الفلاتر خالياً من الأتربة والبكتيريا والفطريات. ويعدّ مثل هذا الهود بمثابة كابينة ملائمة لزراعة الأنسجة النباتية، لأنه مكان معقم لزراعة الأنسجة والأعضاء النباتية في الأواني الزجاجية أو البلاستيكية المحتوية على البيئة الغذائية المعقمة sterile media. ويجب أن تحتوي كابينة الهود على موقد



هي غرفة خاصة تحتوي على مناضد (Benches) تتوافر فيها أكياس الزراعة البلاستيكية أو الأصص الصغيرة وغيرها المملوءة بالترية المعقمة الخاصة (Composite) أو البيتوموس، وذلك لنقل النباتات من معمل زراعة الأنسجة وأقلمتها. وتكون هذه الفرقة مجهزة بالإضاءة اللازمة ودرجة الحرارة المناسبة وطريقة الري بالبرذاذ هي المفضلة.

٢ - البيوت البلاستيكية (Plastic Greenhouses) هي أكثر استعمالاً لرخص ثمنها، وتستخدم لتوفير الحرارة اللازمة والإضاءة المناسبة لتربية النباتات المنقولة من المعمل ونموها وحمايتها من البرودة وخاصة عند نقل النباتات في فصل الشتاء. وتستخدم البيوت الزجاجية أو المظلات الخشبية أيضاً لمثل هذه الأغراض.


٣ - الحقل (Field):

بعد أن يتم أقلمة الشتلات يتم بيعها وتوزيعها للمزارعين أو المربين بفرض زراعتها مباشرة في الحقل، ويجب أن تكون تربة الحقل جيدة خالية من الأمراض والأملاح والنيوماتودا وأمراض الذبول، ويجب أن يتوفر مصدر الري المناسب الخالي من الأملاح. إضافة لما تقدم تحتاج زراعة الأنسجة إلى عمال متدربين ومتخصصين وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة.

نماذج عملية وتطبيقية متبعة في زراعة الأنسجة على المستوى الزراعي:

أولاً - إنتاج تقاوي البطاطس الغالية من المبروس من خلال زراعة الأنسجة:

تعد البطاطس من أهم المحاصيل الدرنية العدانية التي تزرع في الدول العربية كافة وهي من الأغذية القنية بالكربوهيدرات، وما زالت دولنا العربية تستورد البذور ( التقاوي ) من البلاد الأوربية بمبالغ ضخمة سنوياً وبالملة الصعبة، والسبب الرئيس لاستيرادها عدم إمكانية إنتاج التقاوي تحت ظروفها المحلية لسرعة اصابتها



ويمكن استخدام حاضنات نمو كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم حسب الحاجة.

٦- غرفة الملاحظات وجمع المعلومات (Observation Room)


تجرى مراقبة ومتابعة نمو الأجزاء النباتية المزروعة داخل أنابيب الاختبار أو الدوايق الزجاجية الخاصة إما في غرفة النمو ( داخل الحاضنات ) مباشرة أو داخل غرفة أخرى معدة لهذا الغرض تتوافر فيها ظروف النمو الموجودة في الحاضنة، وذلك لفحص المزارع ضمن فترات متقاربة ومراقبة الإصابة أو التلوث ومعالجته أول بأول.

ما أهم المتطلبات خارج معمل زراعة الأنسجة النباتية؟

بعد نجاح إنبات ونمو النماذج المزروعة، يجب نقلها إلى بيئات زراعية ملائمة وهي ضرورية لإتمام عمليات التكيف والأقلمة، وهي :

١ - غرفة الأقلمة (Adaptation Room):

السايتوبلازمية plasmodesmata في خلايا القمة المرستيمية التي بواسطتها يتم انتقال الفيروس من خلية إلى أخرى، وكذلك نظام المقاومة لتكاثر



بالأمراض وخاصة الفيروسية. وقد نجح العديد من الدول العربية في إدخال أسلوب تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لإنتاج بطاطس خالية من الفيروس، ومن بين هذه الدول جمهورية مصر العربية، حيث قامت وزارة الزراعة بإنشاء معامل زراعة الأنسجة الخاصة بذلك، وتقوم الوزارة أيضاً بتشجيع رجال الأعمال على إنشاء معامل خاصة لزراعة الأنسجة، وتقوم بالإشراف عليها وتوجيهها التوجيه السليم، وتعطي لهم كافة المعلومات في هذا المجال.

ومن فوائد إنتاج تقاوي البطاطس بالزراعة النسيجية:

- إنتاج نباتات خالية من الأمراض وخاصة الأمراض الفيروسية.
- إنتاج أكبر عدد ممكن من النباتات وبأقل كلفة اقتصادية ممكنة.
- التقليل من استيراد تقاوي البطاطس من الخارج.
- ومن التقنيات المستخدمة في زراعة أنسجة البطاطس

استخدام القمة المرستيمية للساق لكونها صغيرة جداً وطولها يتراوح بين ٠.١ - ٠.٣ مم، وأثبتت الأبحاث العلمية خلو القمة المرستيمية من الفيروسات لعدة أسباب منها: انعدام الروابط

الفيروسات يكون عالياً في الأنسجة المرستيمية. وأهم الخطوات المتبعة في استخدام القمة المرستيمية في زراعة الأنسجة هي:

- ١ - اختيار الصنف الجيد.
- ٢ - كسر طور السكون (Dormancy) في التقاوي المنتخبة بفرض تحضير خروج البراعم.
- ٣ - تغسل الدرناات المحفزة وتنظف جيداً.
- ٤ - تفصل البراعم باستخدام مشرط حاد معقم وتوضع في برطمان به ماء مقطر معقم.
- ٥ - تعقيم الأجزاء النباتية (Sprouts) في كحول إيثانول ٧٠٪ لمدة نصف إلى دقيقة واحدة ثم غسلها بالماء المقطر المعقم.
- ٦ - توضع الأجزاء النباتية (Sprouts) بعد ذلك في محلول كلوركس تركيز ٥ - ٢٠٪ وليلة ٢٠ دقيقة، ويكون ذلك داخل الهود المعقم مع الراج أو التقليب المستمر.
- ٧ - تغسل الأجزاء النباتية (Sprouts) بالماء المقطر المعقم ٤ - ٥ مرات.
- ٨ - تفصل المرستيمات القمية من الأجزاء النباتية



من عدم إصابتها بالفيروس، فيتم استبعاد الأنابيب المصابة وإتلافها. أما الأنابيب السليمة الخالية من الفيروس فنستمر في تكثيرها... وهكذا.

١٢ - مرحلة الإكثار. وفيها يتم تقسيم النباتات الخالية من الفيروس إلى عقل تحتوي كل عقلة على عقدة واحدة وريقة في إبطها برعم، ويستمر الإكثار حتى الحصول على أكبر عدد ممكن من النباتات... ويمكن وضع ٥ - ١٠ عقل في برطمان واحد حسب حجم البرطمان (لمدة ثلاثة أسابيع) ويكون في بيئة



غذائية صلبة، وبعد نجاح مرحلة الإكثار تقسم البرطمانات (أوعية الزراعة) المحتوية على النباتات الصغيرة المنزوعة، وذلك بتقسيم النباتات إلى عقل وزراعتها في بيئة سائلة لمدة (٢ - ٤) أسابيع ثم يتم إكثارها في بيئة صلبة وهكذا، ولكن أخيراً تقسم أوعية الزراعة (البرطمانات) المحتوية على النباتات الصغيرة إلى جزأين:

الجزء الأول: يطور نموه لتكوين الدرينات الصغيرة Macro tubers خلال فترة شهرين باستخدام بيئة (Murashige & skoog, 1962) مع

باطوال صغيرة ٠,١ - ٠,٢ مم، وتتم هذه العمليات تحت الميكروسكوب باستخدام مشرط حاد معقم مع وجود مقياس يطول اسم مقسم إلى ١٠ مم وكل أمم مقسم إلى عشرة أقسام.

٩ - بعد فصل المرستيمات بالطول المحدد تزرع في البيئة الغذائية المعقمة المعدة لذلك.



بحيث يكون كل مرستيم في أنبوبة اختبار بصورة مستقلة، وتعلم هذه الأنابيب بعدد المرستيمات المفصولة.

١٠ - تحضن أنابيب الاختبار في الحاضنة على درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية. وكثافة ضوئية ٣٠٠ - ٤٠٠ لوكس، ومدة ضوئية ١٦ ساعة لمدة شهر إلى شهرين.

١١ - بعد مرور هذه الفترة، يقوم كل مرستيم بالنمو ليمطي ٧ عقل. ثم تفصل كل عقلة من هذه العقل بالطرق السابقة نفسها لتوضع في أنبوبة اختبار وتحضن بالطريقة السابقة نفسها لمدة (٣٠) يوماً.

١٢ - يتم اختبار الفيروس بطرق وتقنيات متقدمة مثل طريقة ELISA، وهي طريقة اختبار كيمائي لكل أنبوبة اختبار على حدة للتأكد

استخدام إحدى الإضافات الهرمونية التحفيزية مثل (BAP) Benzyl Amino Purine بنسبة ٢ - ٥ ملجم/لتر. أو Kinetin بنسبة ٢ - ٥ ملجم/لتر أو Cycocel مع BAP بنسبة ٥٠٠ مل. فقد وجد (El-Shobaky & Ibrahim, 1997) أن إضافة ثيوسلفات الفضة إلى بيئة البطاطس الزراعية أدت إلى الحصول على نباتات ذات نمو جيد داخل الأوعية. وأعطت عددًا أكثر وأطول جذورًا وخاصة في البيئة السائلة والنباتات الناتجة منها لم تعان أي مشكلات عند أقلمتها.

الجزء الثاني: يستخدم لإنتاج شتلات البطاطس. وذلك بنقل النباتات الناجحة إلى أصص أو أكياس بلاستيكية بمعدل شتلة واحدة في كل أصيص أو كيس بلاستيكي يحتوي على بيتموس وطمى ورمل معقم بنسبة ١ : ١ : ١ بالحجم. ثم بعد أقلمتها جيدًا تنقل إلى البيوت الزجاجية أو البلاستيكية أو المظلات الخشبية. ويتم تغذيتها جيدًا ورثها ومقاومة الآفات وخاصة حشرة المن والذبابة البيضاء لأنهما السبب في نقل الفيروس. وبعد حوالي ثلاثة أشهر يصفر السات ويتم حصاد الدرنات الصغيرة (الإيليت) والتي تخزن جيدًا ثم يكسر طور سكونها لتصبح صالحة للزراعة تحت الظروف الحقلية. وتسمى هذه الدرنات بالجيل الأول (F1) وبعد زراعتها يمكن الحصول على درنات (تقاوي) صالحة للزراعة يطلق عليها الجيل الثاني (F2). وهكذا يتم إنتاج التقاوي بهذه الطريقة والاستغناء عن عملية الاستيراد. وقد نجح (El-Shobaky, 1991) في إنتاج درنات البطاطس الكبيرة Minitubers باستخدام تقنية زراعة الأنسجة من الدرنات الصغيرة Macro-tubers ومن الشتلات. وهناك عوامل كثيرة تؤثر على إنتاج الدرنات الصغيرة من خلال زراعة الأنسجة أهمها الساييتوكاينينات التي تضاف إلى البيئة لتشجيع تكوين الدرنات الصغيرة فضلًا عن درجة الحرارة والضوء والسكريز والنشروجن (El-

Shobaky, 1996; Al-Farhan, 2001).

وكذلك وجد (El Shobaky & Ibrahim, 1999) أن إضافة ١٠ ملجم/لتر + ٨٠٠ جم/لتر سكرورز إلى بيئة M & S أدت إلى الحصول على أكبر عدد وأعلى وزن من الدرنات الصغيرة لكل عقلة. فقد وجد (Palmer, 1969) أن أفضل درجة حرارة لتكوين الدرنات بين ١٨ - ٢٠ درجة مئوية.

#### ثالثاً. إنتاج الخضراوات من خلال زراعة الأنسجة:

نجحت تقنية زراعة الأنسجة في مجال إنتاج الخضراوات وتكثيرها في استنباط سلالات جديدة من أنواع مختلفة من الخضراوات. وتستخدم تقنية القعة النامية للنباتات كإحدى طرق التكاثر، لأنها الطريقة المفصلة على الطرق الأخرى كما وجدنا ذلك في إكثار البطاطس. أما بالنسبة للمواد الغذائية والهرمونات والمستلزمات فيتبع في ذلك الخطوات نفسها التي ذكرناها في زراعة أنسجة البطاطس.

وفي مجال التحسين الوراثي للخضراوات على سبيل المثال، نجح معهد الكويت للأبحاث العلمية باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية في استنباط سلالات جديدة من الباذنجان والطماطم ذات مقاومة عالية للموثة التربة والمياه.

كما نجحت في مصر زراعة الخضراوات بهذه الطريقة ومنها الثوم والخرشوف والطماطم وغيرها. ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على بحث (Zimmerman, 1986; Torres, 1989).

#### رابعاً. إنتاج الفاكهة (Fruits Production):

١ - إنتاج الموز من خلال زراعة الأنسجة: بعد الموز من محاصيل الفاكهة المرغوبة التي يمكن أن توجد على مدار العام في دول البحر المتوسط مثل مصر والبلدان شبه الإستوائية كاليمين والصومال. وقد نجحت مزارع الأنسجة في مصر لدرجة أصبحت معظم مزارع الموز الحالية إن لم يكن كلها تزرع من نباتات موز

### على البيئة الغذائية الأنثوية

M & S +3 mg/l BA +30 g/l sucrose  
+100 mg/l Inositol +2 g/l Gelrite

ثم تنقل الأنابيب إلى غرفة التحضين (٢٥ درجة مئوية) وكثافة ضوئية ١٥٠٠ لوكس ومدة صونية ١٦ ساعة لمدة شهر إلى شهرين حسب التسبيح والصف.

مرحلة التصاعف يتم اختيار النموات الخالية من التلوث ونقلها إلى وسط غذائي حديد يحتوي على

M & S +3 mg/l kin +30 g/l sucrose +100 mg/l Inositol +2g/l Gelrite or (6 g/l Agar)

ومدة هذه المرحلة سبعة أجيال بين الحيل والآخر شهر، فهذا ينتج كمية كبيرة جداً من النباتات.

### مرحلة التجذير (Rooting stage)

وهي آخر مرحلة من مراحل إنتاج الموز. حيث يتم في هذه المرحلة نقل النباتات إلى وسط غذائي آخر يشجع على تحفيز الجذور ومدة هذه المرحلة شهر. ويحتوي الوسط الغذائي على

1/4 MS +30 g/l sucrose +100 mg/l Inositol  
+1 mg/l NAA or 2 mg/l IBA +6 g/l Agar +active charcoal (A.C.).

### مرحلة التحضين

يتم التحضين تحت درجة حرارة (٢٧ ± ٢ درجة مئوية) ومدة اضاءة ١٦ ساعة وشدة صونية ٣٠٠٠ - ٤٠٠٠ لوكس.

### عملية الأقامة

تنقل النباتات من مرحلة التجذير. وتستخرج بعناية من الأوعية. ونعقم ثم تورع إلى بيئة عدائية جديدة مكونة من بيتموس + رمل بنسبة ٣ : ١ بالحجم. ويتم غسل الرمل جيداً من الأملاح. ثم يزرع كل نبات كامل مع مجموعته الحدي في اصص صغيرة حجم ٦. ونحصد النباتات في حاصنة مزودة بكثافة ضوئية ٣٠٠٠ لوكس لمدة ١٦ ساعة يومياً تحت درجة حرارة (٢٧ ± ٢ درجة



نانجة من معامل زراعة الأنسجة.

بعد ائد القطع اللازمة من المرامم الطرفية والجانبية، يتم اتباع الخطوات نفسها التي ذكرناها في زراعة البطاطس النسيجية ثم تمر

النباتات بعد ذلك بعدة مراحل

مرحلة البداية وفيها يزرع التسبيح الببائي



مستوى الطموح. وقد نجحت هذه المراكز في إنبات وإنتاج آلاف النباتات سنوياً، ونطمح أن ينتشر مثل هذه المراكز في مناطق أخرى من عالمنا العربي لفرض إنبات وإنتاج مئات الآلاف من الفسائل سنوياً لكي تنتشر وتزدهر زراعة التمر في كافة أرجاء عالمنا العربي وربما يأتي اليوم الذي تتحول فيه بلادنا إلى مراكز عالمية لتصدير جميع أنواع فسائل النخيل لدول العالم كافة فضلاً عن التقدم في مجال صناعة التمر وتسويقها وتعليبها.

ولكي نطلع القارئ على مزيد من المعلومات، فإن هناك دولا مثل أستراليا تدرس مشروع إنتاج التمر في أراضيها لتصديرها إلى منطقة الخليج العربي والمناطق الأخرى إمام فصل الشتاء نظراً لملائمة الظروف البيئية لزراعتها.

ومن الفواكه الأخرى التي نجحت تقنيات زراعة الأنسجة في إكثارها الموالح والشفاح وغيرها. ولمزيد من المعلومات لفرض الفائدة بهذا الخصوص يمكن الاطلاع على بحث (Zimmerman, 1986).

#### رابعاً، النباتات الطبية والعطرية:

تستخدم بعض النباتات كمصادر أولية للحصول على كثير من المواد الفعالة مثل الجليكوسيدات والقلويات والفينولات... إلخ. وتعدّ النباتات الطبية والعطرية من أفضل النباتات في إنتاج هذه المواد. ولهذه المواد فوائد طبية في صناعة الأدوية والمطور ومستحضرات التجميل وغيرها.

وقد نجحت الزراعة النسيجية في إكثار كثير من هذه النباتات بالاقتصاد على زراعة النسيج الذي يقوم بإنتاج المادة الفعالة بدلاً من زراعة النبات بكامله. تزرع الأجزاء المحتوية على المادة الفعالة مباشرة في البيئة المقمة باتباع كافة خطوات تقنية زراعة الأنسجة، التي أشرنا إليها سابقاً مع إضافة بعض الأوكسينات

بمرحلة التجذير، وفائدة إضافة هرمون (NAA) هي هذه المرحلة هي تحفيز تكوين الجذور.

- في حالة تكون مجموع جذري مناسب وقوي تكون النباتات جاهزة للخروج من الأنابيب أو الدوايق وتكون مستعدة لإجراء عملية الأقلة. - أقلمة النباتات: هي المحصلة النهائية للخطوات التي ذكرناها آنفاً. ويتم إخراج النباتات من الأنابيب أو الدوايق، وتفسل جيداً وتزال الأوراق القديمة والتالفة، ويهذب المجموع الجذري جيداً ثم تعامل النباتات بمبيد فطري لمنع التلوث بالفطريات، وتزرع في أصص ذات حجم ٦ تحتوي على بيتموس Vermiculite وتوضع في مكان مناسب من رطوبة ودرجة حرارة وري بانتظام مع الحذر من تعريض النباتات لإضاءة شديدة. يتم فحص النباتات بشكل دوري مع استمرار المكافحة بالمبيدات الفطرية لحين وصول النباتات إلى نمو جيد، ثم يتم تدويرها إلى أصص أكبر حجماً بالطريقة السابقة نفسها إلى أن تصل إلى نمو مناسب، وبعد مدة شهرين تنقل إلى المظلة الخشبية لحين موعد نقلها في الموسم التالي إلى الظروف الحقلية.

وبعد إنتاج الفسائل النسيجية بهذه الطريقة أفضل بكثير من إنتاجها بالطريقة التقليدية سواءً من الناحية الاقتصادية أو الفواحي الأخرى مثل: الجودة، والتنوع، والكمية، وخلوها من الأمراض والأفات... إلخ.

ويبلغ سعر الفسيلة الواحدة التي تنشأ بالطرق التقليدية حوالي ١٠٠ دولار أو أكثر. ولا يقل وقت تربيتها عن سنتين لفرض استئصالها من النخلة الأم، بينما يتمكن المربي أو المزارع بفضل تطور علم زراعة الأنسجة النباتية من شراء عشرات الفسائل النسيجية القوية والممتازة ببيع المبلغ الذي كان يدفعه بالسابق لشراء فسيلة واحدة.

وتوجد عدة مراكز مشهورة ومنتجة للأنواع الممتازة من أصناف التمر في السعودية والكويت والمغرب ومصر وإيران وغيرها، ولكنها دون



وثمار البن لإنتاج الكافيين وغيرها .

**بعض المشكلات التي تواجه مزارع الأنسجة النباتية:**

تتعرض مزارع الأنسجة النباتية لكثير من المشكلات والمعوقات لذا ينبغي أخذها في الحسبان قبل العزم على تنفيذ أي مشروع بهذا الخصوص. ومن هذه المشكلات ١ - التلوث Contamination وأسبابه كثيرة، هي:

والسايتوكاينينات ثم تحصى هي ظروف خاصة من الرطوبة والصوء ودرجة الحرارة كي تنتج هذه الأخرى كتلا من الخلايا البركيميية ( الكالوس ) الحاوية على المادة الفعالة. ومن هذا الكالوس يتم استحلاص المادة الفعالة. ومن أمثلة النباتات الطبية ازرهار نبات الياسمين لإنتاج زيت الياسمين، وازهار نبات الورد لإنتاج زيت الورد، وعشب نبات النعناع لإنتاج المايبتول.



النباتية. وبما ان المركبات المينولية موحودة في الأنسجة النباتية. وقد تكون موجودة في بعض الكيماويات المستخدمة. لذا نقترح الآتي

- تدريب العاملين في هذه المعامل تدريبا علميا وفيها حيدا. ويجب ان يكونوا على مستوى جيد من الخبرة والكفاءة.

- يجب ان نقلل حجم الحروق في الأجزاء النباتية الى اقصى قدر ممكن

- استخدام مصادات الأكسدة مثل حامض الاسكوربيك بسنة ١٠٠ ملغم لتر

- وجد ان إضافة الفحم النباتي الفعال  $1000 \text{ g Charcoal}$  يعادل ١ - ٢ جم لتر يساعد على تقبل المواد الفينولية

- غلب الأصباغ بقل من تكوير المركبات الفينولية

- عند إزالة الهرمونات (الأوكسين والسايتوكاينين) من النسبة لعدتيه فيها يحسن نمو النبات لأن الهرمونات تعمل على زيادة مستوى المواد الفينولية لذا يمكن استخدام لدوره أي إيقاف استخدام الهرمونات في الوسط العداس ثم بعد تحسن حالته بعد استخدامها لتثبيع النمو وهكذا

#### خاتمة:

تعد تقييد الزراعة لمساهمة من المعارف الزراعية الحديثة المهمة في تحسين إنتاج الزراعي وبالتالي توفير العدا. وتحسين الاكتفاء لدتي

من الأمور التي يمكن استنتاجها من خلال تقنية زراعة الأسبجة لنباتاته انه بالإمكان إنتاج أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية تكثر من لحاصل الزراعة ونماز هذه الأصناف بمقاومة الأمراض والحشرات أو ملوحة التربة والماء أو الحفاف أو البرودة والظروف الأخرى كما يمكن استخدامها في أكثر النماز التي يصعب إكثارها مثل العجبل ن اساع صناف جيدة عالية

- تلوث الهواء المحيط بالبيئة الزراعية بالعنار والحرائث
- عدم غسل الأجزاء النباتية بشكل جيد وتعيمها
- عدم غسل وتعيم الرحاحيات والأدوات الأخرى كالملاقط والمشارط وتعيمها بشكل جيد.
- عدم توفير الأوساط الزراعية بالشكل المطلوب
- التلوث الناتج من الأجهزة المستخدمة في تحصيل البنية
- تلوث حسام وملابس المبيدات العاملين في محال زراعة الأسبجة
- ٢ - قد نسب بعض المواد الكيميائية المستخدمة تغييرا في التركيب الوراثي للنبات
- ٣ - عدم حروق الجذور بسهولة في بعض الأنواع النباتية
- ٤ - في بعض أصناف التفاح والنم لا يحدث تحديد لتبيح الكالسيوم المكون
- ٥ - ارتفاع معيار الهرمونات النباتية
- ٦ - من المشكلات الفسيولوجية حدوث صبرز للقيمة المائية. وتكون النور التي يمارح لأسبجة النباتية كما يحدث عند زراعتها المحل كما يحدث نمو كبير في المجموع الخدري على حساب المجموع الخصري لعدة أسباب منها نقص في تركيزات السرات والكلوروتات والكالسيوم في النسبة. زيادة في استخدام الصايتوكاينينات. ويطلق على هذه العملية بالظاهرة الرحاحية وللمركبات الفينولية تأثير على تكون هذه الظاهرة
- اهم الحلول والمقترحات
- (١) معالجة مستكبات التلوث بكل دقة وحذر وهي التي أوردناها في الفقرة (١) نفا
- (٢) استخدام المواد والمحاليل الكيميائية وتحصيلها بصورة دقيقة
- (٣) ان أكسدة المركبات الفينولية غير ثلثة الى ملوثة ب لون بني تعد ظاهرة سامة للأسبجة

## المراجع العربية والانجليزية

- ١- عبد الرحيم توفيق لرحاعي، سمير عبد الوكيل الشوكي، تقنيات القرن ٢١ لتحسين النبات، باستخدام زراعة الأنسجة، سلسلة الفكر العربي لراجع العلوم الأساسية (٣٠)، دار الفكر القومي، القاهرة، ٢٠٠٢م
- ٢- إبراهيم المليحي الزراعة النسيجية، مجلة العربي، العدد ٢٠٤، ٢٠١٢م، ص ٣٦ - ٤٥
- ٣- دول عربية في حقل، مجلة العربي، العدد ٥٠٩، ص ٢٠٤ - ٢٠٥
- ٤- البرهوي، محمود هاشم، إبراهيم محمد حاسد (١٩٩٤م)، زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء.
- 5- Al-Farhan, H.N. (1989) The effects of plant growth substances on the yield of potatoes. PhD Thesis, Univ. of Wales, Bangor, U.K.
- 6- Al-Farhan, H.N. (2001), Tuber initiation and tuber growth. In Potato Physiology ed. By H.N. Al-Farhan, Awan for Information Services, Sanaa, Yemen, pp. 21-34
- 7- Al-Farhan, H.N. (2001) Potato tissue culture in potatoes. In Potato Physiology ed. By H.N. Al-Farhan, Awan for information Services, Sanaa, Yemen pp. 153-162.
- 8- El-Shobaky, S.A. (1991). Application of tissue culture technique to potato production. PhD Thesis, Hort. Dept., Faculty of Agriculture, El-Minia Univ. pp 113
- 9- El-Shobaky, S.A. (1996). Application of tissue culture technique to potato (*Solanum tuberosum*) seed production. Review of Article. Un-published, pp. 65
- (نقلا عن الرفاعي والشوكي ٢٠٠٢م)
- 10- El-Shobaky, S.A. and I.B. Ibrahim (1997). Effect of silver thiosulphate (STS) and Indole Butric Acid (IBA) on potato growth through tissue culture technique. Zagazig J.

الإنتاجية بأقل التكاليف يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكف عن استيراد الحبوب والفاكهة والخضراوات والزيوت النباتية، ويمكن الاتجاه بعد تحقيق هذه الخطوة إلى التصدير لتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة تسهم في زيادة مستوى الدخل القومي، والارتقاء نحو الأفضل في تحقيق أفضل المستويات المعيشية للمواطنين. وتحقيق الرفاهية للمجتمع من جهة، ومن جهة أخرى يمكن توظيف الأموال التي كانت تنفق في استيراد المواد الغذائية والبذور والتقاي وغيرها في إنشاء مشاريع خدمية وزراعية وصناعية وعمرانية... إلخ: تسهم في تحقيق التنمية الحديثة التي يسعى لها الجميع.

والسؤال المطروح في هذا الصدد كيف يمكن للدول العربية الوصول إلى تحقيق تنمية زراعة الأنسجة النباتية وتعميمها؟

قد يبدو الجواب صعبا عن هذا السؤال. ولكن بإمكان كل دولة عربية أن تخصص مبلغاً لإقامة معمل واحد متكامل للأنسجة النباتية وتجهيزه بكافة المعدات والمستلزمات والخبرات، يستطيع هذا المعمل أن ينتج سنوياً مئات الألوف من النباتات المحسنة الخالية من الأمراض والحشرات والمطابقة لصفات الصنف بدلاً من استيرادها أو إنتاجها بالطرق التقليدية التي تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة تلك المشاتل وبتكاليف عالية.. ويمكن للدولة بهذه الطريقة استثمار هذه المعامل عن طريق بيع شتلاتها لتغطية نفقاتها ربما خلال مدة زمنية قياسية (أقل من سنة)، وبذلك تكون إقامة هذه المشاريع سلاحاً ذا حدين، توفير الشتلات الجيدة للمزارعين والمربين وبأسعار مناسبة، وتقليل الاستيراد نحو تحقيق الأمن الغذائي من جهة ومن جهة أخرى تعدّ مشاريع استثمارية في تحسين الموارد المالية سواء للدولة أو للمستثمرين الآخرين.

Exp. Biol. 11: pp. 118-131.

19- Skoog, F. & Tsui, C. (1951). Growth substances and the formation of buds in plant tissues. In: F. Skoog (ed.), Plant Growth Substances. Univ. Wisconsin Press, Madison, Wisconsin. pp. 263-285.

20- Stalknecht, C.F. (1985) Tuber initiation in *Solanum tuberosum*: Effect of phytohormone and induced changes in nucleic acid and protein metabolism. In: Potato Physiology, Ed. By H. Li, Academic Press, INC, London, Ltd. pp. 231-260.

21- Torres, K.C. (1989) Tissue culture techniques for Horticultural crops. Avi-Van Nostrand Reinhold, N.Y. pp. 1-285

(نقلا عن الرفاعي والشويكي ٢٠٠٢م)

22- Vasil, V. & Hildebrandt, A.C. (1965). Differentiation of tobacco plants from single isolated cells in micro cultures. Sciences, 150: pp 889-890

(نقلا عن الرفاعي والشويكي ٢٠٠٢م)

23- Wang, P.J. & Hu, C.Y. (1982) In vitro mass tuberization and virus-free seed potato production in Taiwan. Am. Potato J. 59, 33-39

24- Wang, P.J. & Hu, C. Y. (1985). Potato tissue culture and its application in Agriculture. In Potato Physiology, ed. By H. Li, Academic Press, INC, London, pp. 503-577.

25- Zimmerman, R.H. (1986) Propagation of fruit, root and vegetable crops. Overview. In R.H. Zimmerman et al. (eds.), Tissue Culture as a Plant Production System for Horticultural Crops, Martinus Nijhoff, Dordrecht, The Netherlands, pp. 183-200.

(نقلا عن الرفاعي والشويكي ٢٠٠٢م)

Agric. Res. V, 24, no. 4, pp. 661-673.

(نقلا عن الرفاعي والشويكي ٢٠٠٢م)

11- El-Shohaky, S.A. and I.B. Ibraheim (1999). Production of potato *Solanum tuberosum* through tissue culture techniques. The first Inter. Conf. In Egyptian Plant Tissue Culture and its Application, 12-24 Sept. 243-253

(نقلا عن الرفاعي والشويكي ٢٠٠٢م)

12- Haberlandt, G. (1902). Kulturversuche mit isolierten pflanzenzellen. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. Abt., 1, 111: 69-92

(نقلا عن الرفاعي والشويكي ٢٠٠٢م)

13- Ismaeel, Sh. A. (1995). Performance of globe artichoke plants developed from tissue culture under low plastic tunnel. M.Sc. Thesis, Fac. Agric. Ain Shams Univ. pp 79

(نقلا عن الرفاعي والشويكي ٢٠٠٢م)

14- Kumar, D. & Wareing, P. F. (1974). Studies on tuberization of *Solanum andigena* II. Growth hormones and tuberization. New Phytologist, 73, pp 833-840.

15- Murashige, T. and Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco cultures. Physiology. Plant, 15, 473-497 (Cited in Wang & Hu, 1985)

16- Palmer, E.C. (1969). Hormonal control of tuberization of *Solanum tuberosum*. Ph. D. Dissertation, California Univ. U.S.A.


17- Skoog, F. (1944). Growth and organ in tobacco tissue cultures. Amer. J. Bot. 31: pp: 19-24

18- Skoog, F. & Miller, c. (1975) Chemical regulation of growth and organ formation in plant tissue cultured in vitro. Symp. Soc.



فالمحيط المائي للأرض، يحتضن نحو ٥٨٠ من  
التنوع الأحيائي في العالم ويعتقد بعصر الحبراء  
من ملابس الألب من الكائنات الحية، تعيش هي

تتكوّن اجسامها من نحو ٧٠٪ من الماء وتختلف نسبة الماء في خلايا مخلوقات. طبقاً لنوعها وطبيعتها. قال تعالى ﴿... وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ (الأنبياء: ٣٠). إضافة إلى هذا فإن مياه البحار والمحيطات تعدّ محروبا هائلا لمود عمداية وطنيية. وصروية لرفاهها و استمرار حياتها ويُقدّر العلماء ان اكثر من ثلاثة ارباع سكان الارض. مستثم اعالتهم من المؤرد المائية. خلاا السنوات القليلة الماضية. من هيا



البشر. وإن يوفقا زحف شبح الجوع الهائج.  
بـتصميم القائمة المحتملة، وما عرفه الناس  
من طعام تقليدي. مثل الأسماك والقشريات  
والرخويات، وأنواعا جديدة مستقبلية من  
الماكولات البحرية، وربما ياكل أولادنا أو أحفادنا  
وحبات طعام مكونة من حساء الطحالب أو  
عصيدة قشعرير البحر. وقد تصبح لحوم  
السلحفاة البحرية أو بيوضها، وحتى مناسل  
التماسيح، من الأطباق لشهية ١. وقد جاء في

مناطق لم يصل إليها الإنسان بعد، ولا نعرف  
عنها شيئا. ومقارنة مع الأنظمة البيئية على  
اليابسة، التي تقدم منافع اقتصادية تقدر بما  
يقرب من ٢٢ تريليون دولار؛ فإن عوائد البيئة  
البحرية، طبقا لتقدير الباحثين في جامعة  
ميرييلاند الأمريكية، قد تفوق ٢١ تريليون دولار.  
ويرى المختصون أن الإدارة الحكيمة  
والتخطيط السليم، لمنشآت البحار والمحيطات،  
كفيلان بأن يزودا بالطعام كل فرد من أفراد



العالم، حركة رائجة في تجارة بعض اللافتاريات البحرية. فقد ارتفع الإنتاج العالمي من بلح البحر، وهو نوع من الرخويات البحرية، من نحو ١.٥ مليون طن في عام ١٩٨٨م، إلى نحو ٣.٢ مليون طن عام ١٩٩٨م، كما ازداد إقبال الناس على بيع خيار البحر وقنأذه وشرائهما، بشكل ملحوظ، في جنوب شرق آسيا، وهو الآن في مرحلة التوسع إلى شرق أفريقيا وأوروبا. وتعتمد المأكولات البحرية، من الوجبات التي تتوافر فيها عناصر غذائية، لا توجد في المصادر

القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿و هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا...﴾ [النحل: ١٤]. كما ورد في كتاب «الذبايح والصييد والتسمية على الصيد» في صحيح البخاري في باب «أحل لكم صيد البحر و طعامه» [المائدة: ٩٦]. قول شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح، وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم يز الحسن بالسلحفاة بأساً. وبالفعل، شهدت الأسواق في بعض دول



كما ربط بين انخفاض مستوى هذا الحمض في الدم، بمادة «السيروتونين» التي يؤدي انخفاض تركيزها، إلى الاكتئاب وبعض الاضطرابات العقلية الأخرى.

وأوضحت دراسة بريطانية، أجراها اختصاصي علم الأوبئة في جامعة جارديف بولاية ويلز، الدكتور مايكل يور، على نحو ٢٠٠٠ من مرضى الذبحة الصدرية، تناولوا زيت السمك مرتين أسبوعياً، انخفاض خطر الموت بالذبحة بينهم، بواقع الثلث (أقل من ٢٩٪). كما أثبتت الدراسة، أن الغذاء المتمثل في تناول الأسماك مثل المكريل والرنج، بإمكانه المحافظة على حياة المصابين بالذبحة الصدرية. ويستند العلماء في تحليل ذلك، إلى أن أنواع الحموض الدهنية في السمك تعمل على مكافحة أمراض القلب، من خلال تخفيض نسبة التجلط في الدم.

مما سبق تتضح أهمية تطوير وزيادة مساحة الشعاب المرجانية الطبيعية التي تشكل فقط نحو ١٧ ٪ من قيعان المحيطات والبحار في العالم .

وتمثل بيئة الشعاب المرجانية، والحشائش البحرية (Seaweeds)، جزءاً مهماً من البيئة البحرية؛ لأنها تعدّ مصدراً غذائياً غنياً، بالنسبة إلى كثير من المخلوقات المائية. كالأسمك وقناص البحر وبقر البحر ... إلخ، إضافة إلى أنها تعدّ مكاناً مناسباً للتكاثر، ووضع البيوض، والحماية من حرارة الشمس والمخاطر الأخرى.

ويطمح العلماء في استخدام البحار لإنتاج الغذاء البروتيني والمستحضرات الطبية. فقد أثار اهتمام المختصين بعلم المعادن، تلك الأحجار المرجانية التي تتكون من مخلفات الهياكل العظمية، لبعض الكائنات البحرية الصغيرة، فآخذوا منها عجينة من الكالسيوم. وعندما حققت هذه العجينة عبر الجلد ووصلت إلى العظام، وجد أنها تتصلب بعد نحو ١٢ ساعة. وتؤدي إلى الشفاء الأجزاء المكسورة، بشكل

النباتية والحيوانية البرية، فالطحالب البحرية مثلاً، تحتوي نحو ٦٠ عنصراً معدنياً وعنصرًا نادرًا. ويشكل السمك مصدرًا غنيًا بالفلورايد، الذي يزيد من صقل ولعان الأسنان، مما يحميها من التسوس، وهو يساعد أيضاً على تقوية العظام. كما أن السمك، ومختلف الأطعمة البحرية مثل المحار، من أهم مصادر الزنك. ومن المعروف أن الزنك يعمل على الإسراع في شفاء الجروح، ويحافظ على البشرة. ويسهم في النمو والنضج بصورة طبيعية، ويحفز نشاط الإنزيمات. وتخزن الأسماك والمحار، عنصر السيلينيوم، ويحمي السيلينيوم الخلايا الحية من التلف نتيجة تعرضها لعمليات الأكسدة في الدم. وعلاوة على هذا، فإن عنصر السيلينيوم يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات. ويزيد من مرونة أنسجة الجسم. ويذكر أن المحار غني بالنحاس، الذي يضبط نشاطات الإنزيمات التي تستخدم في تخليق الأنسجة الرابطة، والصيفة التي تحمي الجلد، ويساعد في إنتاج الهيموجلوبين للحديد. ومن أفضل مصادر اليود، أسماك المياه المالحة والمحار والطحالب البنية. وبعد اليود مهمًا في تكوين هرمونات الغدة الدرقية، التي تتحكم في النمو والنضج، وكذلك في توليد الطاقة داخل الجسم. وهناك اعتقاد سائد بأن اليود يعمل على تأخير ظهور الشيب، وأن المرو وراء صحة شعر الصينيين واليابانيين وحيويتهم يكمن في كثرة تناولهم للأغذية البحرية.

ومن الملاحظات الطبية الشهيرة ما نشره الطبيب الأمريكي جوزيف هيلين، في مستشفى روكينيل بولاية ميريلاند، عن نتيجة بحث معاد أن ارتفاع نسبة مرض الاكتئاب والقلب في الولايات المتحدة الأمريكية (٥٠٪)، بالمقارنة معها في اليابان (١٠.٠٪)، قد يعزى إلى حب اليابانيين لأكل الأسماك. وفسر هيلين ذلك بوجود كميات عالية من الحمض الدهني -دوكوسا هيكسا نويك، DHH، في الأسماك.

المرجانية، وأصبحت تتحرك بتحريك عضلات العين، كما هو حال العين السلمية. ويحاول العلماء تصنيع بعض أنواع المرحان. وتعديل مكوناته، لتترب من خصائص المرحان الطبيعي وتبدو التجارب مشجعة لتعويض العيون المفقودة، وتحفيز المعالجة البصرية للمصابين بإعتام البصر.

ومن الأسماك الرائدة هي محال تسخير المخلوقات الأخرى في خدمة الأساس المركب المصنوع للمكتيريا. الذي يوصلت إليه عائلة الأحياء الدقيقة دينورا شتيرج. من نوع آخر من ليكتيريا التي تعيش في شواطئ البحار.

يضاهي شكلها الطبيعي قبل الكسر. يقول طبيب العيون روين براماد: إن الشيء الرائع في مادة المرحان هو أن تركيبها الكيميائي والعصوي، مشابه جداً للتركيب الكيميائي لعظام البشر وأعضاء الحسد لذا فإن الجسم يتقبلها ولا يرفضها، مثلما يرفض الأعضاء الصناعية الأخرى. كالأستيك والمعادن مثلاً. وقد قام هذا الطبيب مع آخرين، بصناعة عين مرحانية، حيث تمت تهيئتها وتثبيتها جراحياً، في محجر عين إحدى المريصات. وبعد عام واحد، وجد أن الأنسجة والأوعية الدموية، تمتد حل هذه الكرة





الجمبري ضد الفطريات، وكذلك المضاد الحيوي ساليناميد آ و«ساليناميد ب» الذي تفرزه بكتيريا تتعايش سلميًا، مع نوع آخر من قناديل البحر.

ومن التقانات الحديثة الفائقة الدقة، واحدة تسمى «الفريلة الجزيئية»، ويرمي استخدامها إلى تنقية المستخلصات الكيماوية، المأخوذة من أجسام الكائنات الحية وهياكلها، ومن ثم توظيفها كعقاقير طبية طبيعية، وهي

ويسمى المركب الجديد «بيوكسا لوماسين». وكشف خبراء يابانيون، بجامعة طوكيو، الستار عن وجود مركب سام، هو التتروودوكسين، في أجسام أسماك «الفهقة». وقد تبين لهم أن مصدر هذه المادة السامة، بكتيريا تعيش في أحشاء هذه الأسماك. وفي هذا السياق، أيضًا، تمكن العلماء من معرفة سر مقاومة بعض المخلوقات البحرية وبيوضها، لبعض الأمراض. ومن أمثلة ذلك، الاستاتين، الذي يقي ببوص

العجل للحصول على الكمية نفسها، ويتم تحضير غصنورف القرش بعناية، على هيئة مسحوق أو حبوب يابس، تؤخذ عن طريق الفم، ويمكن خلطه بالعصير أو الماء حسب الرغبة، والواقع، أن مسألة اشتقاق العلاجات الطبية وتجربتها، مسألة شاقة وبطيئة، وتواجهها صعوبات جمة.

فمثلاً، يستلزم الحصول على ١٠ ميلليجرامات من المركب البيبتيدي «دولاستين»، الذي يقاوم الأمراض السرطانية، استهلاك نحو ١٦٠ جرام من أرنب البحر، كما أن إنتاج ما يقرب من نصف جرام من مادة «سيجوا توكسين»، يحتاج إلى ما يقرب من ٨٥٠ كجم من أكباد ثعبان السمك (المواري)، أما تحضير ميلليجرام واحد من مركب آخر لعلاج السرطان، من دودة بحرية تعرف بـ (البولوية) فيستهلك ٤٥٠ كجم دودة من هذا النوع.

ومن الأفاق الحديثة في ميدان الطب، عزل بعض أنواع ألياف الأعشاب البحرية وتطويرها، مثل طعلبيات الصوديوم وطعلبيات الكالسيوم البُنِيَّة، لاستعمالها كضمادات تساعد على التئام الجروح المستعصية، كتقرحات الرجلين. إذ توضع الضمادة على الجرح، فتشكل طبقة جيلاتينية، تعمل على توفير الدرجة الملائمة من الرطوبة، للإسراع في اندمال الجرح.

ويتميز هذا النوع المبتكر من الضمادات بسهولة التغيير، دون تعريض الأنسجة للتسلخ، لأنها تتفرد بخاصية عدم الالتصاق بالجلد، كما هو الحال في الضمادات التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن المركب العضوي المسمى الحين، Aigin - يوجد في حدران حلايا الملحالب البية، وهو يستخلص منها ليستعمل كعامل مكلف ومثبت للطبقات العلوية «Toppings» على أقراص الحلوى والمعجنات والمربطات، كما أنه يدخل كمادة لمرج وتكتيب كثير من المستحضرات الصيدلانية التي بين أيدينا، أو

هذا المضمار، توصلت شركة صيدلانية، في ولاية كاليفورنيا، إلى مركبين مضادين للسرطان من أنسجة الإسفنج، يوقف المركب الأول، ويدعى «باستيدين» نمو خلايا سرطان الدم، وأورام المبيض. أما الثاني، وهو «جاسيلاكينولايد»، فيؤثر في انقسام خلايا سرطان الكلى والبروستاتا، ويسعى العلماء إلى تحسين الصفات العلاجية لكل منهما.

ولعل من الطريف الكشف عن مقاومة سمكة القرش للسرطان، كما جاء في كتاب شهير صدر عام ١٩٩٢م، للدكتور ويليام لين، بعنوان «أسماك القرش لا تصاب بالسرطان»، وكان علماء يابانيون، قد توصلوا عام ١٩٩٠م، إلى البرهنة على وجود عدة بروتينات في غضاريف القرش، وأنها تعمل بشكل متناسق بعضها مع بعض، وهذا ما قد يفسر عدم إصابة سمك القرش بالسرطان، إذا تعمل هذه البروتينات، على منع نمو الأورام، لكونها تمنع نمو الأوعية الدموية التي تغذي الأورام، كما ثبت ذلك من تجارب أجريت على عيون الأرنب.

والمعروف أن الغصنورف نسيج أبيض قوي، يتكون من شبكة كثيفة من ألياف الكولاجين الموجودة داخل مادة جيلاتينية شبيهة بالبلستيك.

وهناك صفة أخرى يتميز بها سمك القرش، وهي إمكانية الحصول على كميات أكبر من الغضاريف، قياساً بالأسماك الأخرى، وغير ذلك من الحيوانات البحرية والبرية؛ فقد تبين أن أجسام الماشية كالأبقار والثيران، لا تحوي كميات كبيرة من الغضاريف، ولهذا فإن الجدوى الاقتصادية لاستخلاص المادة الفاعلة تكون مرتفعة، ويذكر أن كتلة القرش الكبير قد تصل إلى نحو عشرة أمثال وزن العجل، وهذا يعني أن نصف جرام من غصنورف القرش، يكفي للحصول على ميلليجرام واحد من العقار، وبالمقابل، يحتاج العلماء إلى نحو نصف كيلو جرام من غصنورف






النجوم التي تترك في ألوان زرقاء وحمراء وصعراء مائلة إلى البياض. مع مشاهدة محرة درب التبانة تقطع الأفق من جانب إلى الجانب الآخر. ولذلك ليس مستغرباً أن أجدادنا القدماء نظروا إلى السماء برعب وإجلال. فمن السهل تصور أن الله وأبطال الأساطير يسكنون ذلك الملكوت المتلائم.

ولكن على الرغم من روعة النجوم المرئية إلا أن الفلكيين يعلمون بأنها ليست إلا الوميص

يقول الفيريانيون الفلكيون. إن باستطاعتهم أخيراً إخبارنا عن كيفية انتهاء الكون. ولن يتم ذلك بطريقة الانفجار. أولئك الذين يعيشون في المدن أو قريباً منها، لا يحدون في السماء شيئاً يستحق النظر. فهي مجرد مجموعة متناثرة من النجوم في فضاء هابت وصباي



ولكن في ريف (مين) أو شمال داكونا أو هي صحراء الجنوب الغربي. فالنظر يبدو مختلفاً جداً. وتستطيع حتى بدون تلسكوب أن ترى آلاف





وقد تم فهم تلك اللحظة . وهي لحظة الولادة الحقيقية للزمزم والفضاء قبل حوالي ١٥ بليون سنة . على الأقل من حطوطها العريضة مد عام ١٩٦٠م. ولكن ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً، اُخفيت اذكي الفضول في مجال الكويبات عن حل لغز، ماذا يحدث في الجانب الآخر من الزمزم؟ هل سوف تسنمر المحركات في التسارع الى الأبد. ويجيب لمعانها الى ان يصبح الكون بارداً ومظلماً؟ أم هل يتباطى التسارع الى ان يتوقف ثم يعكس الاتجاه

الأولي للحجاب الكوي المبهل الذي لا يمكن تخيله. وقد تمكن هؤلاء المكتشفون مسلحين بأقوى تلسكوب صنع الى الآن من معرفة ان مجرة درب التبانة هي عبارة عن قرص هائل الحجم، دائم الدوران. وانها تتكون من ١٠٠ بليون نجم أو أكثر. كما ان هناك عشرات السلاسل من المحركات تتسارع متباعدة بعضها عن بعض نتيجة للانفجار العنيف الذي يعرف بالانفجار العظيم Big Bang.



وتتقارب المجوم لتصل في النهاية الى الانسحاق العظيم؟ وعلى الرغم من أن الفلكيين راقبوا ولعشود من السنين مستخدمين اقوى التسكوبات إلا أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى نتيجة.

ولكن هنا - والشكر يعود لسلسلة الاكتشافات المذهلة التي كان آخرها منذ أسبوعين فقط (نشر هذا المقال في يونيو ٢٠٠١م). أصبح من الممكن الإجابة عن السؤال الآن ودون تردد. ويفضل العلماء الذين يراهنون على نظرية الانسحاق العظيم أن يرددوا مقالته الشاعر روبرت هورست:

«البعض يقولون بأن العالم سينتهي محترقاً  
والنعم يقولون متجمداً  
ولما ذقته من رغبة

أقف بجانب من يفضلون النار»

ولكن المعسكر الآخر يفصل الاستشهاد بأبيات لـ  
ت. سي. اليوت :

«هذه طريقة نهاية العالم

ليس بالانفجار ولكن بالشيخ-

ويبدو أن الحكم بين الرايين حسم لصالح ت.  
سي. اليوت.

ولكن لماذا نحن مهتمون بذلك؟ لسبب واحد



ولكن الدهشة لا تنتهي هنا. فالطاقة السوداء لا تغطي فقط على الحاذية العادية. ولكن هناك مادة غير مرئية يعرفها العلماء باسم «المادة المظلمة» التي يبدو انها تتفوق المادة المعروفة مثل النجوم / الكواكب والمشمس بسسة ١٠ الى ١٠٠. ويعلق على ذلك الميرياني الفلكي النظري. حول بيرماك من جامعة كاليفورنيا. سائنا كرور بقوله. ليس فقط نحن لسنا في مركز الكون. بل لسنا مخلوقين من مادة الكون نفسها اصلا. هذا الاكتشاف يثير من الاسئلة اكثر من الأجوبة التي يوفرها. فمثلا. مجرد معرفة العلماء بان هناك مادة مظلمة لا يعني أنهم يعرفون تماما ماهي تلك المادة. وذلك ينسحب ايضا على الطاقة السوداء. يقول الفيرياني الفلكي مايكل تيرير من جامعة شيكاغو. «إذا كنت تعتقد بان الكون كان صعب الفهم. فمن الالهضل ان تأخذ حبوبا مشطلة للذكاء. لان الامور سوف تزداد سوءا .

#### صلى الانفجار العظيم

كانت الاشياء تبدو اكثر سهولة في الماضي. ففي عام ١٩٦٥م عندما استطاع فلكيان من معمل «بل هي مدينة هول ميديل هي ولاية نيوجرسي.

لان هذا السؤال شغل الاسان منذ القدم. منذ ان درجنا على هذه الارض. والحواب النهائي. اذا كان هذا هو فعلا مالدنيا. هانه سوف يجبر الملاسعة وزجال الدين على اعادة التمكير هي معتقداتهم ومبادئهم بشأن الخلود (الابدية) وكيفية نهاية العالم. هي حين يرى العلماء ان هناك بعض التفاصيل في هذه الاكتشافات تحتوي على اراء ومعار عميقة وعريضة. فمثلا تسف الملاحظات الجديدة نظرية الانتفاخ التي تقول. ان الكون كان صغيرا جدا. أصغر من الدرة. ثم مر مرحلة تمدد وانتفاخ سريعى فتباعدت مكوناته بسرعة اسرع من سرعة الضوء (يبدو طاهريا أنها تتعارض مع النظرية النسبية لايشتاين).

واحدى النتائج التي لم يتم البت فيها هي ان هناك نوعا عربيا من الحاذية المضادة. تحتاج الكون. وهو مبدأ اقترحه ايشتاين في البداية ثم سده على انه اكبر خطأ ارتكبه في حياته. هذه القوة التي سميت أخيرا بـ «الطاقة السوداء» ليست هي فقط ما يمنع التمدد من أن يتباطأ فقط. بل هي ما يحمل الكون يطير متباعدة بعضه عن بعض بسرعة دائمة التزايد. مثل سفينة فضائية فتحت صماماتها على اكبر مايكون

بالعشرات او بالمئات في كتل تعرف بالعناقيد (Cluster) أو بالعناقيد الجبارة (Super Cluster) وبينهما فضاء لا يوجد فيه شيء على الإطلاق. وقد نشأت هذه الكتل كما يفسرها العلماء النظريون من بعض التكتلات الأولية داخل سحابة المادة التي رفعت مستوى الإشعاع الخلفي. وكان يجب أن تكون المُقد الأكثر كثافة بقليل داخل تلك السحابة - وهي سلف العناقيد الجبارة الموجودة حالياً - أكثر حرارة بقليل من المتوسط. ولهذا بدأ بعض العلماء في البحث عن المرق بين تلك النقاط الحارة.

#### حريق اولنچ

وفي الوقت نفسه يحاول علماء آخرون حل نوعية اخرى من المصاعب. فعند تمدد الكون تحاول الجاذبية المجتمعة لكل مادة ان تبطل من ذلك التمدد - مثل جذب الجاذبية الأرضية لصاروخ منطلق إلى الأعلى وإعادته إلى الأرض. فإذا كان الجذب قوياً بما فيه الكفاية فإن التمدد سوف يقف، ومن ثم ينعكس الوضع، وإذا لم يكن الجذب قوياً فإن الكون سوف يستمر بالتوسع للأبد. فإي الطريقتين يسلك الكون؟

أحدى الطرق للأجابة عن هذا السؤال هي وزن الكون. وهي جمع وزن كل البجوم والمجرات. ومن ثم حساب جاذبيتها ومقارنتها بمعادل تمدد الكون. فإذا كان الكون يتحرك بسرعة غير مقيدة فاذن لا وجود لانسحاق عظيم.

ولكن المشكلة في هذه الطريقة، هي أنه لا أحد يعرف كم من المادة موجود في الحقيقة؟ فبالنجوم والمجرات امرها سهل وباستطاعتنا رؤيتها. ولكن هناك امراً كان معروفا منذ عام ١٩٢٠م ألا وهو وجود شيء مخفي غير مرئي بجانب ماتمكن الفلكيون من رؤيته من النجوم المتوهجة والغازات. فالمجرات المتعقدة تدور حول بعضها بعضا بسرعات عالية ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة، أن تتباعد متطايرة في الفضاء


أن يوفرا تأكيداً مبهرأ لنظرية الانفجار العظيم، عندما كانت في ذلك الوقت مجرد فكرة ضمن افكار عدة تطفو على السطح تفسر كيفية بداية الكون. حدث هذا الاكتشاف عن طريق المصادفة البحتة، فقد كان أرنو بنزياس وروبرت ويلسون يحاولان التخلص من تشويش يؤثر على هوائي (أنتين) الاتصالات، وبعد استبعاد كل الاحتمالات ومن ضمنها روث الطيور، وصلا إلى نتيجة أن التشويش كان مصدره الفضاء الخارجي.

وفي جامعة برنستون القريبة كان الفيزيائيون يصعد وضع مراصدهم باتجاه السماء للبحث عن الإشارات نفسها

وكان الفلكيون يعرفون منذ عام ١٩٢٠م بأن المجرات تتباعد عن بعضها بعضا. ولكن العلماء النظريين ادركوا متأخرين المعنى الرئيس لذلك بأن الكون كان في لحظة من اللحظات صغيراً جداً وساخناً جداً. فبعد ٢٠٠,٠٠٠ عام من لحظة الانفجار العظيم. كان جميع الكون المرئي عبارة عن سحابة حارة، غاز عالي الكثافة وحجمه يقارب حجم مجرة درب التبانة. تلمع بضوء ابيض حار مثل سطح نجم. ولأن هذا الوهج الكوني ليس له مكان يذهب إليه، فهو إذن مازال باقيا، ولكن ولأنه ضعيف كثيراً، فإنه يوجد على شكل موجات دقيقة ضعيفة. وقد حصل كل من بنزياس وويلسون على جائزة نوبل لاكتشافهما بالمصادفة السحرة هذه الموجات القادمة منذ فجر الزمن.

اقنع اكتشاف الإشعاع الخلفي للموجات الكونية الدقيقة العلماء بأن الكون انبثق فعلا منذ بداية الانفجار العظيم نحو ١٥ بليون سنة ماضية، وبدأوا في الحال في الإعداد لمعرفة المزيد من المعلومات.

لقد بدأوا بالأمر الأول، وهو محاولة الكشف عن الفروقات الدقيقة لكثافة الضوء المتبقي. ويبدو واضحا من خلال التلسكوبات العادية أن المادة لا تتوزع بشكل متساو في الكون الحديث. فالمجرات تنحو إلى أن تتجمع قريبة من بعضها بعضا



وما مقداره ؟ وهذه هي الطريقة التي قاد بها  
الملك تشاب ماير إلى شميدت من مرصد مونت  
ستروملو بسويسرا. فهو يقوم هو وزميله بقياس  
تسارط الكون الذي يسمى بـ «حد التسارط» كانت  
الفكرة بسيطة، انظر إلى الكون القريب منا ومن  
ثم قم بقياس ما هي سرعة تمدده، ثم اعمل  
الخطوات بنفسها للكون البعيد الذي وصل إلينا  
صوفاً الآن. بعد أن أطلق عندما كان الكون وليداً.

ومن ثم وزن بين نتائج القياس

وقد استخدمت مجموعة شميدت والمجموعة  
المنافسة التي يقودها سول سزل موتر من معمل  
لورانس بيركلي بكاليفورنيا تقنيات متشابهة لعمل

مثل دوران طفل يدور بسرعة كبيرة، وتدور أيضاً  
كل مجرة حول محورها بسرعة كبيرة، وفي هذه  
الحالة أيضاً يجب أن يكون متناغمة في الفضاء.  
والسبب الوحيد (الذي يجعلها متناغمة) هو أن  
هناك نوعاً ما من مادة مظلمة غير مرئية تمسك  
بالأشياء بعضها ببعض، وفي حين أن باستطاعتنا  
تحسين كتلة المادة المظلمة التي بداخل المجرات  
وحولها، فلا أحد يعرف ما إذا كانت هذه المادة  
تعمل المراععات المظلمة في الفضاء حيث من غير  
الممكن قياس تأثيرها.

لذلك حاول الفيزيائيون الملكيون بطريقة  
أخرى، معرّفه ما إذا كان لتمدد بتباطؤ



ولهدا فقد قام كل من الصريقين، هريق شميدت وهريق موتر، بقياس مسافة السوبر نوبا (عن طريق حساب توهجه) وسرعة حساب ابتعاده (عن طريق احمرار صوته)، وهي ظاهرة تحدث لجميع الاجسام المتحركة، ويسمىها الفيزيائيون (بانحراف دوبلر) وبتركيب هذين المجموعتين مع بعضهما فابها سوف نوفر لنا معدل التمدد في الوقت الحاضر وفي الماضي ايضا.

#### الطاقة المظلمة (السوداء)

كلا الصريقين كانا يعرفان منذ ١٩٩٨م بأن هناك شيد غريبا يحدث. فتمدد الكون كان يجب

تلك القياسات، كانوا يبحثون عن نوع من الانفجارات يسمى سوبر نوبا نوع Ia التي تحدث عندما يتفجر نجم وصل مرحلة الشيخوخة، ويبدو ذلك على شكل انفجار نووي حراري مهول جداً، ويكون هذا الانفجار - انفجار Ia - انفجاراً بالغ التوهج بحيث يرى من جميع انحاء الكون بالاصابة الى انه متحاسن التوهج بشكل كاف يمكننا من حساب المسافة بينه وبين الارض بدقة كبيرة.

هدا هو المفتاح، لان الكون كله يتمدد بمعدل ثابت في اي وقت محدد. كما ان المحرات البعيدة مما تتباعد عما بشكل اسرع من المحرات القريبة.



وانكماش، وليس من الممكن أن يكون ساكناً.

والى الآن: فإن الفلكيين اليوم يصرون على أن هذا هو ما يحدث فعلاً، علماً بأنهم يستخدمون تلسكوبات ضعيفة نسبياً. وخوفاً من فشل معادلاته الأنيقة والحببية إلى قلبه، فقد أضاف أينشتاين إلى معادلات النسبية عاملاً سماه «الثابت الكوني» وهو يعادل فكرة القوة المضادة للجاذبية.

وبعد عقد من الزمان من اكتشاف إدوين هبل بأن الكون فعلاً يتمدد، قرر أينشتاين مباشرةً وبارتياح كبير نيل عامل الثابت الكوني، هاتلاً: إنه كان أكبر خطأ في حياته. (ولو ثبت على موقفه، ولم يتخلص من العامل الذي أضافه فلربما حصل على جائزة نوبل للمرة الثانية).

لأن مبدأ الثابت الكوني لم يمت تماماً، فمعادلات الفيزياء الكمومية تشير هي أيضاً إلى أن ما يبدو فضاءً خاوياً يجب أن يكون مشبعاً بنوع من الطاقة تتصرف بالضبط كمبدأ أينشتاين المرفوض أي المضاد للجاذبية. والمشكلة هنا أن هذه القوى - إن وجدت - فإنها قوى هائلة ضخمة كانت قادرة على العصف بالكون وتشتيته حتى ما قبل تكون الذرات، وبالطبع لن يكون هناك وجود للمجرات أيضاً.

ويعترف مايكل تيرنر من شيكاغو «بأن القيمة التي حسبها فيزيائيو الجزيئات للثابت الكوني، كان الرقم الأكثر إخراجاً في عالم الفيزياء»

وبعيداً عن تلك التفاصيل، فإن سمعة أينشتاين جعلت فكرة الطاقة السوداء، أو الجاذبية لمصادرة، أقل حبوا قياساً إلى مكانة كل من شميديت وبيرل موتر ووزنهما العلمي. وبالطبع هناك بعض من فيزيائيي الفلك ما زالوا مترددين في قبول الفكرة، ولديهم الكثير من الشكوك حيالها. فقد يكون المراقب لم ير توهج السوبر نوفا أو من الممكن أن الضوء القادم من انفجار نجمي بعيد قد خفت بسبب نوع من الغبار غير معروف.

إن يتباطأ كثيراً أو قليلاً، اعتماداً على ما إذا كانت المادة الموجودة فيه كثيرة أو قليلة. وهو تأثير كان من الواجب رؤيته؛ لأن السوبر نوفا البعيدة تظهر أكثر لمعاناً مقارنةً بالقريبة منها. ولكنها في الحقيقة كانت خافتة. كان التمدد كان يزيد من سرعته (بتسارع).


وقد قال آدم برياس، وهو فلكي من معهد علوم تلسكوب الفضاء، الذي كان يقوم بتحليل المعلومات التي جمعتها مجموعة شميديت: «لقد طالت أفحص الأرقام مرة تلو المرة باستخدام الكمبيوتر، ولكن الأجوبة بدت غير معقولة. كنت متأكداً بأن هناك خللاً في البرمجة» في حين أمضت مجموعة بيرل موتر معظم تلك السنة في محاولة فهم ماذا حدث لكي يحصلوا على نتائج مجنونة وغير معقولة.

وقد تبين كلا الفريقين طريقة شرلوك هولمز (التحري المعروف) وهي: عند استبعادك لكل ما هو غير معقول، فإن ما تبقى - مهما كان بعيد الاحتمال - يجب أن يكون هو الحقيقة.

كان الكون يتسارع فعلاً، وهذا يعني بأن هناك قوة كبيرة مضادة للجاذبية تعمل على دفع المجرات للتباعد عن بعضها بعضاً على الرغم من أن الجاذبية العادية جمعتهم معاً. يقول راييس معلقاً «لقد ساعدنا جداً أن فريق سولس حصلوا على النتائج التي حصلنا عليها نفسها، فعندما تحصل على نتائج غريبة، يجب أن لا تكون وحيداً». وقد أعلن كلا الفريقين عن نتائج أبحاثهما في وقت واحد تقريباً. وقد رشحت مجلة العلم اكتشاف تمدد الكون على أنه أهم اكتشاف لعام ١٩٩٨م.

وبشكل عام: فإن فكرة الجاذبية المضادة تبدو أكثر غرابية، فهي فكرة يرجع تاريخها إلى عام ١٩١٦م، وهي السنة التي نشر فيها أينشتاين نظرية النسبية العامة.

وكانت معادلات النظرية النسبية تشير إلى أن الكون إما أنه في حالة توسع أو في حالة تقلص



وعلاوة على ذلك: فإن المميزات الفريدة للشاب الكوني سوف تجعل الكون بطيئاً في المراحل الأولى لنشأته، ومن ثم يتسارع بعد ذلك، بسبب أن الطاقة السوداء تكبر كلما كبر الفضاء (أي أن الطاقة متغير مع الفضاء). وكان الفضاء الوليد آنذاك صغيراً، ولذلك كانت القوة الكابحة - قوة الجاذبية - هي القوة المسيطرة العظمى. وحالياً فإن قوة تضادية تتنافس كلها انسمت المسافة بين المجرات في حين نتراد الطاقة السوداء. ولم يتعمق أحد بشكل كافٍ لسبر الماضي البعيد ليعرف فعلاً ماذا حصل آنذاك. أو بشكل أصح، لا أحد لديه المعلومات الكافية عن ذلك.

ففي عام ١٩٩٧م استخدم كل من الفلكي مارك فيلبس من معهد علوم تلسكوبات الفضاء والفلكي رون فلياند من معهد كارنيجي في واشنطن. استخدمتا تلسكوب هبل الفضائي لتحديد موقع السوبر نوبا البعيدة المسماة (SN1997FF)، وبمشاركة من الفلكي بيتر نوجنت من معمل لورانس بيركلي، وهو من فريق بيرل موتر. استطاعوا تحديد سرعة ابتعاده عن الأرض. ولم يستطع نوجنت تحديد بُعده؛ لأن قياس توهج سوبر نوبا نوع Ia يحتاج إلى قياسات متعددة موزعة على أوقات مختلفة.

وكس رايس من الفريق المنافس. يعرف عن ذلك الاكتشاف، ولكن اتضح بعد ذلك بأن هناك صوراً أخرى التقطها هبل كشفت عن سوبر نوبا بطريقة المصادفة الحقة.

ويقول رايس متذكراً ذلك اليوم: إنه في منتصف عام ٢٠٠٠م اتصلت ببيتر وحاولت الحصول على بعض المعلومات. ويبدو أنني لم أكن حذراً، فقد أجابني مباشرة: هل تسأل عن سوبر نوبا SSN1997FF.

وبدلاً من المناورة قرر الصديقان المتنافسان التعاون فيما بينهما، وسرعان ما اكتشفا أنهما عنرا على شيء مدهش حقاً. فالسوبر نوبا

الجديدة التي هي أقرب إلى ولادة الكون بحوالي ٥٠٪ من أي سوبر نوبا معروفة من قبل. كنت أكثر لمعاً مما كان متوقفاً من قبل. وقد المر ذلك بشكل «يقي فكره الغار» لأن لحوم الأكثر بعداً يجب أن تكون أكثر حموتاً بتأثير عمار الحوم الأقرب وكان مستوى التوهج يدل على أن السوبر نوبا كانت تلمع عندما كان تمدد الكون مازال بطيئاً. يشرح رايس ذلك بقوله: هي العادة نحن نلاحظ أشياء غريبة. ومن ثم نحاول أن نجعل نموذجنا الكوني يتلاءم مع ذلك. ولكن في هذه المرة جعلنا الرصد (الملاحظة) تقفز إلى الأمام ليرشدنا. وقد نجح في ذلك. وهذا ما يجعله أكثر إقناعاً

البحث من كرة النار الكونية

الذي يجعل تلك الفكرة أكثر إقناعاً أن كل

يسمى داسي (DASI). وجميع القياسات التي وفرتها تلك الأجهزة جاءت متوافقة مع بعضها بعضاً مؤكدة على أن التكتلات التي رآها العلماء حقيقية وليست ناتجة من عطل في التلسكوب.


ومنذ أسبوعين فقط (نشر هذا المقال في يونيو ٢٠٠١م) أكد فلكيو ماسح سولون الفضائي الرقمي أن التكتلات الأولية قد انتقلت إلى الزمن الحاضر.

وهم يعملون في بحث مدته خمس سنوات لوضع خارطة ذات ثلاثة أبعاد للكون ومازالو في أول الطريق. وفي ربيع العام ٢٠٠١م أعلن العلماء في المؤتمر الذي عقده جمعية الفلكيين الأمريكيين، والذي عقد في مدينة باسدينا في ولاية كاليفورنيا، أن من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن المجرات تتجمع في تكتلات ضخمة تعكس الأوضاع التي وجدت مباشرة بعد الانفجار العظيم. وتبدو الصور للعين غير المدربة لا معنى لها.

ولكن التحليل الإحصائي يرينا بأن التكتلات الأولية - وهي في الحقيقة بقع إشعاعية أقل حرارة أو أقل برودة - لا تتكون بشكل عشوائي بل تتكون بأحجام ثابتة محدودة.

ويشرح ذلك الفيزيائي الفلكي ماكس توك مارك من جامعة بنسلفانيا بقوله «هي مثل دراستنا لملائة الكلاب، فنحن نجد أن الكلاب تتحدر من ثلاثة فصائل فقط وهي : لابرادور، وبودل، وتشاي هوما».

وقد اتضح بأن هذه المعلومات ذات أهمية بالغة. فمعرفة خصائص أحجام ودرجة حرارة تلك المناطق الساخنة أو الباردة، بدقة تبلغ واحد من المليون درجة مئوية (١/١٠٠٠٠٠٠). توفر للفيزيائيين النظر بين معلومات واسعة عن الكون الوليد. وعن طريق معادلات الفيزياء الذرية، وقياسات المقادير النسبية لكل من الهيدروجين، والهيليوم، والليثيوم في الكون، فإن العلماء حالياً واثقون جداً بأن البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات (وهي لبنات بناء كل ذرة في الكون) تكون نحو ٥ ٪ فقط مما يسمى بالكثافة الحرجة.



نتائج الرصد المختلفة - مثل البحث المستمر عن تكتلات الإشعاع الخلفي الكوني - تقترح، كل على حدة، أن الطاقة السوداء حقيقة واقعة.


وقد اكتشفت تلك التكتلات منذ عقد من السنين، والشكر يعود في ذلك إلى القمر الصناعي الباحث عن الخلفية الكونية (cobe)، فالقمر الصناعي استطاع رؤية التكتلات، ولكن لم يستطع تحديد أي شيء عن ماهيتها. وقد تمكن العلماء فيما بعد من تقديم صور أكثر وضوحاً لتلك التكتلات في أبريل عام ٢٠٠١م عن طريق البالون العلمي الذي أطلق عليه اسم بوما رانق (Boomer Rang) الذي حمل أجهزة القياس إلى الطبقة العلوية من الغلاف الجوي فوق القطب الجنوبي. وأيضاً عن طريق بالون اختبار آخر اسمه ماكسيما (Maxima)، وأيضاً عن طريق تلسكوب مايكرويفي وضع على سطح القطب الجنوبي

### الكون المسطح

وتوفر تلك المعلومات أيضاً مفتاحاً لمعلومة أخرى، ألا وهي إخبار النظريين بكيفية انحناء الكون كما صورته اينشتاين. وليس هناك من طريقة لشرح ذلك المبدأ لغير الفيزيائيين إلا عن طريق استخدام معدين فقط (انظر إلى شكل كيف ينحني الكون؟) يحتوي سطح الكرة على ما يسمى الانحناء الإيجابي. أي إذا دهينا معيداً في اتجاه واحد، سوف لن نصل إلى حافة أو حد، ولكننا سوف نعود إلى النقطة نفسها التي بدأنا منها قطعة الورق الممتدة إلى ما لا نهاية هي مستوية وبلا حافة أيضاً لأنها لا نهائية. وشرح الحصان أيضاً

وهي المقدار المطلوب لحمل الكون المتمدد بقف بواسطة الحادية.

ولكن إذا أضفنا إلى ذلك المعلومات التي أطلق عليها توك مارك «الكلام» وتقدمها المعادلات الدقيقة للبيضاء النووية الجريئة. فسوف يتضح بأننا نحتاج إلى كمية مقدارها ٣٠٪ من المادة إضافية. تأتي أغلبها على أشكال حزيئات بالغة الفراغة عرفت نظرياً فقط ولم ترصد عملياً قط. وهي جزيئات لها مسميات غريبة أيضاً مثل تتراليو واكسيون. وهذه هي المادة السوداء. المادة اللغز. أو الأغلب منها. وقد بدأ الإشعاع الكوني الحلمي بالتوهج عندما كان



إذا امتد إلى ما لا نهاية بعد نلا حافة ويحني انحناءً سالباً. فعندما نجمع مجموع روايا مثلث رسم على ورق سوف يكون مجموع روايا ١٨٠ درجة. ولكن عندما نرسم مثلثاً على كرة فسوف يكون مجموع روايا أكثر من ١٨٠ درجة. ولكن إذا

الكون يبلغ من العمر ٢٠.٠٠٠ سنة. ولكن المروق هي درجات الحرارة وحدث منذ أن كان عمر الكون مجرد جزء من الثانية. ويقول توك مارك انه شيء مذهش أن يكون ماكسا البطر إلى ذلك الماضي السحيق.

غير المربية، وهي ساوي بالضبط. كما لوحظ  
موجراً. بما خُص من طريق المعلومات التي وفرتها  
السوبر بوف يقول الفيزيائي الفلكي ادوين تيرنر من  
برمنغهم (وليس له علاقة قرابة بمايكل تيرنر، ولكن  
كل منهما يطلق على الآخر توامر الشيطاني)  
كنت متشككاً جداً في قبول فكرة الطاقة السوداء  
اعتماداً فقط على المعلومات التي وفرتها السوبر  
بوف، ولكن هذا يجعلني الآن أحد الطاقة السوداء  
شكل جدي.

وبعض تسلط الكون بأن نظرية التمدد قد  
نحنت في الاختار الأساسي. وقد ظهرت بذور  
هذه النظرية في ١٩٨٠م تقريباً (كجرء من علم  
التحريكات الأولية وليس من البحوث لعلمية).  
وتقول هذه النظرية أن كل الكون الممكن رؤيته  
قد نما من مجرد مثقال ذره أصغر بكثير من  
السرونون إلى حجم شرة الحبيب هروت في  
لحظة زمنية بالغة القصر عندما كان عمر الكون  
يلع ١.....

من الثانية (أو ١ وقبلة ٣٥ صمراً بمن الماصلة)  
وهذا التمدد البالغ العنف كان المحرك لطاقة  
شبيهة بالطاقة السوداء، ولكنها أقوى منها بكثير  
وقد حانت هذه الطاقة من مكان مجهول في زمن  
غير معروف، وأحدى نتائج نظرية التمدد، أنها  
تنبأت وقبل ٢٠ عاماً بأن الكون يجب أن يكون  
مسطحاً، وهو ما ثبت فعلاً.


هذا حافظت تلك الاكتشافات على تماسكها،  
وتأكد بمضي الوقت، فإن بإمكان فيزيائيي  
الفلك التاكيد أنهم حصلوا أخيراً على قائمة بكل  
العناصر وهي ٢٥ مواد عادية، و٣٥ من المادة  
السوداء الغامضة، ويحو ٦٠ طاقة سوداء،  
وسوف يكون لديهم تصور واضح لمستقبل هذا  
الكون أيضاً. فلن جميعت مادة الكون كلها من  
حاديثتها لن تكون كافية لوقف التمدد. والأدهى  
من ذلك أن الحاديه المصدرة الناتجة من تأثير  
الطاقة السوداء سوف تزيد من سرعة التمدد  
أصافه إلى أن تأثيرها سوف يتزايد مع مرور

زمن مثلاً على سرح الحصان فسوف يكون  
المجموع أقل من ١٨٠ درجة

وهذا يطبق على الكون، ولكن بأصافه بعد  
ثالث فطيقاً لا ينشأتين هكل شيء، يعني انحاء  
موجبة أو سالبة أو يكون مسطحاً (لا تحاول تصور  
في أي اتجاه سوف ينحني الكون، فهو المستحيل  
تحيل ذلك)، ويعلق تيرنر رسمياً على ذلك بقوله:  
«تدلنا القياسات الحديثة على أن الكون هي  
الحقيقة مسطحاً، فلو رسمنا مثلاً يصل إلى جميع  
اتجاهات الكون، فإن مجموع زواياه تساوي ١٨٠  
درجة»، فطيقاً لا ينشأتين، فإن انحاء الكون يتحدد  
بواسطة المادة والطاقة التي تحتويها، فالكون الذي



يعيش فيه كان من الممكن أن يكون مسطحاً تماماً  
اعتماداً على ما يحتويه من مادة فقط. ولكن  
الاكتشافات الجديدة أثبتت أن المادة العادية  
والجزيئات الغريبة تمثل ٣٥٪ فقط مما هو موجود  
أي أن الانحاء الأصافي هو نتيجة لمزج من الطاقة



القريبة ويدخل في ذلك سحبان ماجلان العظيمة ومجرة أندروميديا، سوف تكونان قد زحفتا واتحدتا مع مجرة درب السادة).  
وهي ذلك الزمن نفسه، أيضاً، سوف تنكمش الشمس وتتحول إلى قزم أبيض، يعطي ضوءاً خافتاً وحرارة ضئيلة لما تبقى من حياة على سطح الأرض، وتدخل في حالة احتضار طويل قد تأخذ حوالي ١٠٠ تريليون من السنوات أي ١٠٠٠ مرة أطول مما مضى من عمر الكون إلى الآن قبل موتها. وسوف يحدث الشيء نفسه لبقية النجوم

الزمن، وذلك بسبب أن كمية الطاقة السوداء تتزايد كلما اتسع الفضاء.

#### مصير الكون (نهاية العالم)

ويعني ذلك (أي تمدد الكون) بأن مايقارب الـ ١٠٠ بليون مجرة التي من الممكن الآن رؤيتها من خلال التلسكوبات سوف تختفي عن مجال رؤيتنا واحدة تلو الأخرى. فمجرة درب التبانة سوف تكون هي المجرة الوحيدة المنظورة فقط بعد نحو عشرات البلايين من السنين (علماً بأن المجرات الأخرى



بعيداً. ففي الأسبوع المقبل (نشر هذا المقال في يونيو ٢٠٠١م)، سوف يقلع من قاعدة كيب كانفرال صاروخ لوضع قمر صناعي في مداره لعمل أدق القياسات التي سوف تعمل لخلاص الكون الإشعاعية.

في حين أن مراقبي السوبر نوكا ما زالوا يحاولون إنشاء لوبي (مجموعة ضغط) لإقناع ناسا لعمل تلسكوب خاص بهم للتخلص من الانتظار الطويل لمستخدمي تلسكوب هبل.

وإضافة إلى ما سبق: فإن التلسكوبات ذات التقنيات المنخفضة وكاشفات الإشعاع الميكرويفي (الموجات الدقيقة) الموجودة على الأرض أو المحمولة في بالونات خاصة بالقياسات سوف تستمر في صقل القياسات السابقة وتحسينها.

وإذا أثبتت النتائج والاكتشافات الأخيرة تماسكها: فإن أغلب الأسئلة التي أثيرت عن الكون، مثل كم عمر الكون؟ وما صنع؟ وكيف سينتهي؟ قد أجيب عنها في وقت قياسي وبعد ٧٠ عاماً فقط من بداية طرحها.

عندما يكتب الفصل الأخير من تاريخ الكون في المستقبل البعيد جداً لا يستطيع عقل الإنسان تصويره. فإن الحياة البشرية أو حتى أي نوع من الحياة ستكون قد اختفت منذ زمن سحيق، ومن الممكن تخيل وجود وعي على شكل روح ذكية رقمية. فإن وجد ذلك؛ فإن الشخص الذي ما زال موجوداً سوف يلاحظ بأن الكون يتحول إلى مجتمع غير متخيل، بارد ومظلم ويتحول إلى مكان عميق خال تماماً.

«يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»  
[التقاب: ١]

«التحديق عميقاً في الفضاء والزمن يمكن العلماء من حل أكبر لغز في الكون»

[ترجمة ملف أصوته مجلة التايم في ٢٥ يونيو ٢٠٠١م]

الأخرى على الرغم من أن بعضها سوف ينهي وجوده عن طريق انفجار كبير ويتحول إلى سوبر نوكا. ويتحول في النهاية كل ما تبقى من جمرات مسطّعة من النجوم، أو قشور ميتة من الكواكب إلى ثقوب سوداء، ويصبح الكون بارداً ومظلماً.

ولكن هذه ليست النهاية، طبقاً للفيزيائي الفلكي فرد آدمز من جامعة ميتشجن، وهو خبير في موضوع نهاية الكون. وقد شارك الكاتب جيريك لافلان في تأليف كتابه «الأعمار الخمسة للكون». وقد توقع آدمز أن جميع هذه المواد الميتة (رهات الكون) سوف تتخسف في ثقوب سوداء، وهذه الثقوب السوداء نفسها سوف تتحلل إلى جزيئات تانها بعد أن يصبح عمر الكون تريليون تريليون التريليون سنة، ومن ثم تتجمع بشكل غير مستقر لتكون «ذرات» حجمها أكبر من حجم الكون الحالي. وحتى هذه سوف تتفكك في نهاية الأمر مخلقة وراءها فراغاً وسكوناً هائلين لا حدود لهما، وهذه هي النهاية إلا إذا حصلت معجزة أخرى كما حصل عند حدوث الانفجار العظيم وإعادة خلق الكون مرة أخرى.

التعقل والحذر ميزتان تميزان الفيزيائي والفلكيين، فاكشاف المادة السوداء، والطاقات السوداء، وتسطح الكون أمور تمتد منعطفاً فكرياً مهماً، لا يستطيع الفيزيائيون أو الفلكيون قبولها بدون تحفظ قبل أن تثبت صحتها.

يقول تيرنر من شيكاغو: «إننا نعيش في مرحلة دقيقة جداً، فنحن لدينا صورة رائعة وغريبة للكون ويجب علينا التحقق منها». ولكن قد يكون الطريق مليء بالمفاجآت، فمثلاً لو أخذنا تصور أينشتاين له التاب الكوني، وهو التصور السابق لفكرة الطاقة السوداء، فقد كان من الممكن أن يكون مبدأ بارداً مختلفاً تماماً. وكان من الممكن أن يكون سبباً قوياً لتغيير اتجاه البحث لتأكيد مبدأ الجاذبية بدلاً من إيجاد مصاد لها.

وعلى كل حال، فإن إجراء تجارب جديدة للتحقق من هذه النظريات الغريبة لن يكون



#### حوادث متفرقة

لم يكن حادث تلوث الأعلاف الحيوانية البلجيكية بمركبات الديوكسين الأول من نوعه، فقد سبقه عدة حوادث خطيرة في أماكن مختلفة من العالم، ففي عام ١٩٧٦م، وعلى أثر انفجار حصل في مصنع لإنتاج بعض الكيماويات الزراعية في مدينة سيفيسو الإيطالية، انطلقت مجموعة كبيرة من الغازات السامة التي تحتوي على كمية كبيرة من أشد مركبات الديوكسين

في شهر مايو/أيار ١٩٩٩م، أعلنت الحكومة البلجيكية تلوث بعض الأعلاف الحيوانية التي تعطى للدواجن والأبقار بمركبات الديوكسين، وعلى الفور، تناقلت وكالات الأنباء هذا الحدث، ونشرت عشرات الدراسات والمقالات المحزنة من خطر هذه المركبات على صحة الأسان وحياته. فما هي مركبات الديوكسين؟ وما مصادرها؟ وما الخطر الناجم عنها؟ وما علاقة هذه المركبات السامة بحوادث التلوث التي تسبب بها الإنسان؟



الذي جعلها غير صالحة للاستهلاك المشري وأُتلفت في حبه.

#### مركبات الديوكسين ومصادرها

الديوكسين Dioxin مصطلح يطلق على مجموعة كبيرة من المتناظرات الكيميائية isomers التي تتكون من حلقتي بنزين ترتبطان بذرتي أكسجين، ويبلغ عددها ١٩ مركبًا كيميائيًا. تتباين فيما بينها وتختلف خواصها الميريانية

خطورة TCDD في الهواء وتلوث منطقة تقدر مساحتها بنحو ١٥ كيلومترًا مربعًا يسكنها ٣٧ ألف نسمة. وفي عام ١٩٦٨م أدى تلوث ريت الأرز في اليابان بمركبات PCBs إلى إصابة العشرات من الأشخاص بأعراض مرضية خطيرة جدًا. وفي عام ١٩٩٧م، في الولايات المتحدة الأمريكية أدت إضافة طين البنتونايت Bentonite clay إلى أعلاف الصويا بهدف تقليل تكتلها، إلى حدوث تلوث حاد للدواجن والبيض بمركبات الديوكسين، الأمر

والكيميائية ودرجة سميتها بشكل كبير تبعاً لعدد ذوات الكلور الداخلة في بنائها الجزيئي ومواقعها، وقد دلت الأبحاث التي أجريت على هذه المركبات، أن ٢٠ مركباً منها سامة جداً وتشكل خطراً حقيقياً على البيئة وعلى صحة الإنسان.

وتشتمل عائلة الديوكسينات على ١٣٥ نوعاً من مركبات Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs)، و ٧٥ نوعاً من مركبات Polychlorinated Dibenzodioxins (PCDDs)، ومركبات شبيهة بالديوكسين مثل Polychlorinated Biphenyls (PCBs)، ويعدّ مركب ٢،٣،٧،٨-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin (TCDD) الأخطر والأشد سمية وفتكاً بالإنسان، والأكثر استقراراً وثباتاً، حيث تبلغ فترة نصف الحياة له full life نحو سبع سنوات،

شكل كبير

#### الأعراض المرضية

معظم مركبات الديوكسين التي تدخل جسم الإنسان تصله عن طريق الطعام، وكأي مادة كيميائية أخرى، يرتبط تأثير مركبات الديوكسين على صحة الإنسان بشكل مباشر مع مستوى التعرض لها، والحالة الصحية للشخص المصاب، ونوع الديوكسين. وقد ركزت غالبية الأبحاث والدراسات التي قام بها العلماء والباحثون لتقصي أثر مركبات الديوكسين على الحالة الصحية للإنسان، من خلال الأشخاص الذين تلقوا جرعات مهنية أو عرضية من مركبات الديوكسين، وكذلك على مجموعة كبيرة من التجارب المخبرية التي أجريت على الحيوانات.

وبناء عليه، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية WHO الحد المسموح والأمن -Atolerable Daily Intake (TDI) بالتعرض للديوكسين يومياً ما بين ١ و ٤ بيكو جرامات لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم الواحد (البيكو جرام يساوي مليون مليون من الجرام)، كما أثبتت القياسات أن كمية الديوكسين التي يتعرض لها الإنسان في

التركيب البنائي العالي الثبات لهذه المركبات يكسبها الكثير من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المركبات الكيميائية، فهي لا تذوب في الماء وتمتلك قدرة عجيبة على الذوبان في الدهون والمواد العضوية التي تتمتع بخواص شبيهة بالدهون، وهي مواد صلبة عديمة اللون والرائحة، ذات درجات انصهار وغليان عالية وضغط بخاري منخفض.

وقد عثر العلماء على مركبات الديوكسين ملتصقة بالمواد المترسبة والمواد العضوية في البحيرات والأنهار. كما وجدت ملتصقة بالتره وبيذرات الهواء والرماد المتطاير (مداخل المنازل والمصانع والمحارق)، ودلت الدراسات والمسوح البيئية أن هذه المركبات موجودة منذ آلاف السنوات في شتى أنحاء العالم، وأن تركيزها في البيئة قد زاد بشكل كبير في عقد الستينات من هذا القرن نتيجة التقدم الصناعي وانطلاق كميات هائلة من الغازات والمواد الملوثة.

وتتعدد مصادر مركبات الديوكسين، فهي تتشكل خلال العمليات الصناعية الكيميائية كتأثير ثانوية By-products غير مرغوب بها،

وتتعدد مصادر مركبات الديوكسين، فهي تتشكل خلال العمليات الصناعية الكيميائية كتأثير ثانوية By-products غير مرغوب بها،


وتتعدد مصادر مركبات الديوكسين، فهي تتشكل خلال العمليات الصناعية الكيميائية كتأثير ثانوية By-products غير مرغوب بها،

في الجهاز الهضمي واعتلالات في الخلايا المصيبة، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز وفقدان التوازن، كما يحدث في بعض الأحيان تهبط مناعي (Im- paired Cell-mediated immunity) وفقر الدم التكويني Aplastic Anemia، مع زيادة ملحوظة في احتمال حدوث بعض أنواع السرطانات المميتة. وهذا ما دفع الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) في عام ١٩٩٧م، إلى تصنيف الديوكسينات كمواد مسرطنة. إن أكثر فئات المجتمع تضرراً بهذه المركبات



هم الأطفال الرضع والأجنة. وقد بينت المسوح الطويلة الأمد التي أجريت عليهم، قدرة بعض مركبات الديوكسين على إحداث تشوهات خلقية Teratogenesis خاصة في المراحل الأولى من تكون الجنين، مع احتمال إجهاض الأم الحامل عند التعرض لجرعات عالية من هذه المركبات لمدة طويلة.

الدول الصناعية يومياً تقدر ما بين ١ و٢ بيكو جرامات لكل كيلو جرام من وزن الجسم. وأول علامة مرضية بعد التعرض لأحد مركبات الديوكسين السامة، تتمثل في أعراض جلدية تعرف بأكثة الكلور Chloracne، مع حدوث ضعف عام في الجسم وغشيان وتغير في مستوى إنزيمات الكبد، ويعقب ذلك اضطرابات



### طرق قياس الديوكسين

يتطلب الكشف عن الديوكسين وقياسه طرقاً معقدة لا تتوافر إلا في عدد محدود من المختبرات في العالم، ومن أهم هذه الطرق . طريقة الاستشراب الغازي (Gas Chromatography) . طريقة التمنيع المشع (Radio-immuno Assay) . طريقة القياس الطيفي (Mass Spectrometry) . ولإجراء مثل هذه القياسات، لابد من توافر تجهيزات فنية وعلمية باهظة التكاليف، لا تتوافر حالياً إلا في بعض المختبرات الموجودة في عدد قليل من الدول الصناعية فقط، ويبلغ عددها ١٠٠ مختبر مؤهل لتحليل الديوكسين في عينات من البيئة (التربة، الماء، الرماد، الهواء)، أما الكشف عن مركبات الديوكسين في المواد الغذائية والبيولوجية (دم الإنسان، حليب الأمهات) وبتراكيز منخفضة لا تتجاوز بيكو جراماً واحداً، فلا يوجد سوى عشرين مختبراً في جميع أنحاء العالم مؤهلاً ومجهزاً لمثل هذه الفحوصات. وتختلف التكاليف المادية لإجراء مثل هذه القياسات تبعاً لنوع العينة غير أنها تتراوح بين ١٥٠٠ دولار لتحليل عينة بيولوجية واحدة إلى نحو ١٠ آلاف دولار أو أكثر لإجراء تقدير شامل ومسح كامل لمنطقة ملوثة بالديوكسين كمكبات النفايات الصلبة، وخطوط تصريف مياه المصانع والبرك المحيطة بها .

### إجراءات لابد منها

لقد أسهمت الإجراءات والتدابير التي اتخذت في المصانع وأماكن حرق النفايات في الحد من إطلاق مركبات الديوكسين السامة في البيئة، كما أدى تحسين تكنولوجيا الإنتاج واستخدام البنزين الخالي من الرصاص والوقود المحسن والمكرر بشكل جيد إلى خفض مستوى هذه المركبات في جميع عناصر البيئة المحيطة بالإنسان .

ومما تجدر الإشارة إليه، وجوب اتباع عدة طرق واساليب حياتية تجنب الإنسان اخطار هذه


المركبات، كتجنب رش الخضراوات والأشجار بالمواد الكيماوية التي يمكن أن تحتوي على أحد مركبات الديوكسين، وعدم زرع المحاصيل الزراعية في المناطق التي تحرق فيها القمامة أو قريب من طرق النقل والمواصلات العامة .

كذلك يجب التأكد النام من خلو الأعلاف الحيوانية التي تستورد من مركبات الديوكسين،



## المراجع

- 1- Cooper, K.R (1989) Effects of polychlorinated Dibenzo -p- Dioxins and poly chlorinated Dibenzofurans on Aquatic Organisms .Rev. Aquat Sci. 1:227-242
- 2- Fletcher, C.L. and McKay, W.A (1993). PCDDS and PCDFS in the Aquatic Environment- aliterature review. Chemosphere 26:1041-1069.
- 3- Hites, R. (1990). Environmental Behavior of Chlorinated Dioxins and Furans, Acets Chem. Res 23:194.
- 4- WCC, World Chlorine Council (1998). Dioxins and Furans in the Chemical Industry January 1998.
- 5- Gough, M(1991) Human Health Effects: What the Data Indicate. sci Total Environ 104:129-158.
- 6- Appel, K.E.et. al.(1986). Approaches to the Health Risk Assessment of PCDDS/PC DF. Chemosphere. 15:1825.
- 7- Rappe C. (1996) Sources and Environmental concentrations of dioxins and Related Compounds. Pure and appl. Chem, Vol.68.
- 8- A. Review of Trend Data Environmental Science and Technology 30/11:3133-3143.
- 9- [www.who.dk/ch/dioxin.htm](http://www.who.dk/ch/dioxin.htm).
- 10- <http://www.who.ch/>
- 11- [abramovs@who.ch](mailto:abramovs@who.ch)
- 12- [www.who.int/fsf](http://www.who.int/fsf)
- 13- [www.who.int/pcs](http://www.who.int/pcs) and [www.who.int/peh](http://www.who.int/peh)



والتخلص من المواد الدهنية الموجودة في اللحوم. وطهي الطعام بشكل جيد. على أن تكون الوجبات الغذائية متوازنة ولا تتركز على نوع واحد من الغذاء. كما أن تضم المواكسه والخضراوات الطازجة إلى جانب الحبوب والخبز والقليل من اللحوم البيضاء والحمراء الخالية تمامًا من الدهون والشحوم.

# مع الدكتور الشيخ

أحمد بن عبد القادر المهندس




## نشأة النجوم

يطلب للمرء ان يمعن النظر طويلا في بحور السماء المنسقة في دفة رائعة وسطاء هرب الى الاعجاز في نبال ضاهية رائعة ومن الارض تلت الأسمان ان السماء هي القبة الزرقاء التي تبدو من فوقه كل يوم، والنجوم موزعة بها لا تظهر الا مع هول لسمي

هذه القبة من لأحقها لا نعرف الا ان تكون حو الارض ولا تخرج في حقيقتها عن

ظاهرة من ظواهر تشتت اشعة الشمس في الغلاف الغازي للأرض والنجوم بعد كبير . يقف العقل البشري في بعض الاحايين حائر شارد القلب عندما يتعامل مع الحقائق العلمية للنجوم مثل طول بعادها وهول احكامها وعظم درجه حرارتها

النجوم هي الوحدات الأولية لبناء المجرات galaxies حيث يدرجه في مركزها ونفل في اطرافها وفي محورها درب الساعة التي يزيد عدد



معين مما يعيق رؤية نجوم حلقه. وهذا ما يسمى  
بظاهرة الاعتناء.

ان أولى خطوات بشاة النجوم تمثل في  
انقسام السدم الغازية الى مجاميع او سحب  
تردد كشافتها الداخلية بفعل ما يسمى  
بالسقوط الحر او الانكماش التبادلي لمكونات  
السحابة نحو المركز الذي يعمل على تجميع  
مكونات السحابة فيه. وبصورة متناسقة  
ومتحاسة في جميع الجهات الفراغية على

النجوم بها على مئة مليون نجم. تراوح المسافات  
بينها بين ملايين الملايين و'الاف ملايين ملايين  
الكيلومترات. فتكون بعض ارجاء المحررة اذا ما  
نظر اليها شبيهة بالسحاب تنكس فيها النجوم.  
ليس المصماء الذي بين النجوم هارعا كما  
يبدو اول وهلة. بل ان هناك عازا يشغل بين  
النجوم وهو مجموعة من ذرات يقلب عليها عاز  
الهيدروجين المحصر الكوي الرئيس الذي ينتشر  
في ارجاء الفضاء الكوني. يكتاث الغاز في اتحاد

حجمه إلى جزء من مليون جزء من حجمه الأصلي. فعلى الرغم من وفرة النجوم إلا أنها تشكل جزءاً ضئيلاً يكاد لا يذكر إذا ما قورنت بحجم الفراغ الذي تولدت فيه، ويبع ذلك تحركها بحرية كبيرة في الفضاء الكوني.

شكل كروي، ومع مرور ملايين السنين على هذه العملية ترتفع درجة حرارة المركز. ومن ثم درجة حرارة سطح السحابة الكرية. التي تعمل درجة الحرارة على تعدد سطحها لئيبداً ما يسمى بالتفاعل النووي، حيث يأخذ غبار




#### أبعاد النجوم

مقاييس الإنسان على الأرض للأبعاد الطولية أو المسافات مثل الميل والكيلومتر ليست بدات قيعة هي قياس أبعاد النجوم، لبعدها السحيق وإذا أردنا تحديد بعد نجم معين عما نملك المقاييس لأصطرنحنا إلى استعمال عدد طويل من الأرقام، مما يجعل هذا التحديد غير عملي؛ لذا ابتكر علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم

الهيدروجين في التحول تدريجياً إلى غاز الهيليوم بتأثير الحرارة العالية جداً في المركز ولكن قبل التفاعل النووي يحصل انتران بين قوة التجاذب التي تريد تجميع كل المادة نحو المركز وقوة الضغط التي تحاول أن تمدد النجم وتشتت مواده في الفضاء وإذا ما حصل هذا الانتران تبدأ عنده نشأة للنجم. وقد يتصاعد السديم الغازي حتى يضل

أقرب النجوم إلينا بـ ٤٠٠٠٠ كيلومتر، والنجوم الأخرى على أبعاد ٩٥٠٠٠ و ٤٠٠٠٠٠٠ من الكيلومترات. وإذا ما مثلنا الشمس ببالون كروي قطره ٤٠ سم فستكون الأرض في حجم بلية قطرها ٢.١ سم، وعلى بعد ١٥٠ مترا من هذا

تسمى السنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة وتعادل ٦ ملايين مليون ميل. ولعل ملائمة هذه الوحدة للفرض تتضح إذا عرفنا أن أقرب النجوم إلينا ألفا قنطورس - يرى من نصف الكرة الجنوبي - يقع على مسافة ٤ سنوات ضوئية




البالون والكوكب المشترى على بعد ٧٧٧ مترا بحجم كرة أطقال وعلى بعد ٦ كم من البالون يوجد كوكب بلوتو بحجم حمصة.

ملاحظة - علينا أن نعلم الفرق بين النجوم والكواكب. فالكواكب أجسام باردة ومعممة تدور حول الشمس. وهي باردة لأنها غير متقدة ذاتياً. وإنما التماعها للناظر إليها من الأرض ناتج من انعكاس أشعة الشمس عليها، أما النجوم فعبارة

أو ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ من الأميال، وهذا يعني أن ضوء هذا النجم يصلنا في خلال أربع سنوات، وإذا ما أطلقت مركبة فضائية بسرعة الضوء، فإنها تصل بعد أربع سنوات.

لكي يسهل علينا ادراك مثل هذه المسافات الشاسعة نقوم باحتزال هذه المسافات افراضياً. فلو كان كوننا أصغر ١٠٠٠ مليون مرة مما هو عليه. عندئذ يمكننا تمثيل المسافة التي بيننا وبين



بإحدى عينيك وأغمضت الأخرى، ثم انظر من خلال الأخرى وأغمض الأولى، فإنك تجد العملة وقد بدا أنه قد تغير مكانها بالنسبة إلى الأشياء التي خلفها، لو علمت المسافة التي بين العينين - والتي تمثل المسافة بين الأرض في موقعين يفصل بينهما ستة أشهر - واستطعت تحديد مقدار الزاوية الهندسية المسببة لاختلاف المنظر لاستطعت وبعملية هندسية بسيطة أن تعلم المسافة بين العملة والعين، والتي تمثل المسافة بين الأرض والنجم !!!

#### احجام النجوم

من الأمثلة الرائعة على ضخامة النجوم النجم بيت الحوزاء، حيث يبلغ حجمه ٢٥ مليون مرة قدر حجم شمسنا. كما أن النجم المعروف باسم قيطس يكبر عن الشمس ٣٠ مليون مرة.

#### لمعان النجوم


تقاس قدرة الأجسام التي يصدر منها الضوء

عن أجسام ملتهبة مشتملة شأنها في ذلك شأن الشمس. أبعاد مسحية وليس لها معنى إلا أنها مسحية !!!

وقد يسأل سائل كيف استطاع علماء الفلك قياس أبعاد النجوم ومعرفتها هناك عدة طرق لقياس أبعاد النجوم، ومن هذه الطرق ما هو مأثوف ومعروف منذ آلاف السنين، وذلك بواسطة قواعد الهندسة المسنوية والفراغية. وبعض هذه الطرق عرف أخيراً بعد أن عرفت نظريات الضوء الحديثة وتحليل الأطياف وتفسيرها.

ومن أشهر الطرق التي توصل إليها الفلكيون طريقة قياس زاوية اختلاف المنظر، فمن الأشياء الملاحظة أن النجم يختلف مكانه بالنسبة إلى الناظر إليه خلال شهور متعاقبة بسبب دوران الأرض حول الشمس، حيث يبدو النجم وقد تغير مكانه بين سائر النجوم الأخرى التي تظهر وكأنها محيطة به، ويمكننا تمثيل ذلك بتجربة بسيطة. فإذا أمسكت عملة نقدية بواسطة الإبهام والسيابة ونظرت إلى العملة - ويدك معدودة -





### الوان النجوم

قبل أن نتحدث عن ألوان النجوم يحسن بنا أن نعرف شيئاً عن أنواع الإشعاعات التي تصدرها النجوم، حيث لوحظ أنه توجد طاقات غير مادية في هذا الكون تعرف باسم الإشعاع، ومن هذه الإشعاعات ما تدركه حواسنا مباشرة مثل الحرارة التي عندما تتعرض لها أجسام ترفع من درجة حرارتها، ويطلق عليها اسم تحت الحمراء ومثل الضوء العادي الذي يثير لنا هذه الأرض؛ إن الضوء الأبيض الذي ترسله الشمس هو مجموع الأشعة المرئية ذات الألوان المختلفة، ومن الإشعاعات ما نلمس آثاره فقط مثل الأشعة فوق البنفسجية، ومثل أشعة إكس، وتنتقل هذه الإشعاعات على صورة موجات تنتشر بسرعة الضوء ولكل موجة - كامواج اللاسلكي أو الضوء - طول خاص، يقاس عادة بوحدة يقال لها ميكرون، وهي جزء من عشرات الآلاف من السنتيمترات طولاً؛ فإنها بمجرد دخولها جو الأرض تشتت في جميع أركان الجو

بالشمعات، بمعنى أن شدة الضوء الصادر من الجسم المضيء يمكن أن تستبدل بعدد معين من الشموع القياسية، تعادل في شدتها شدة الضوء الصادر من الجسم المضيء. القدرة الشمعية للشمس تعادل ٣ ملايين مليون مليون شمعة، بينما القدرة الشمعية لألمع نجوم السماء المعروفة باسم الشعرى اليمانية تفوق قدرة شمسنا ٢٦ مرة. وليست الشعرى اليمانية أكبر النجوم في القدرة الشمعية، فهناك من النجوم ما تزيد قدرته على قدرة الشعرى بألاف ومئات الألاف، فنجم العيوق قدرته الشمعية تفوق قدرة الشمس ١٨٥ مرة، ونجم الرجل تفوق قدرته الشمعية قدرة الشمس بـ ١٥٠٠٠ مرة، وهناك من النجوم ما تشع من القدرة الشمعية في دقائق معدودة ما تشعه الشمس في سنوات. كما أنه توجد نجوم أخفض بكثير في قدرتها الشمعية من الشمس، وتسمى بالنجوم الأقزام بعكس النجوم ذات القدرات الشمعية الكبيرة، ويطلق عليها النجوم العملاقة.



ان النجوم تظهر للناظر اليها بالعين المحرّدة  
 ذات ألوان مختلفة منها الابيض باصع البياض  
 ومنها الاصفر والاحمر والأزرق، وسبب اختلاف  
 اللون هو اختلاف درجة حرارة النجم نفسه،  
 ولذلك استبدل من اللون الأحمر على درجة  
 الحرارة على سطح النجم وأقل هذه النجوم  
 حرارة هي ذات اللون الاحمر، ثم تليها ذات

وتعمره بكميات وفيرة، لما كانت الموجات الرقواء  
 اغزر الطاقات هي حرمة الأشعاع الشمسي على  
 الرعم من كون اقصرها اللون الأزرق، فيبدو  
 الحو بدوره كثبة زرقاء، اما الحقيقة التي يحب  
 ان يعرفها هي انه لا وجود لهذه القسة هي  
 صورة جسم مادي او سماء متجسدة كما يتصور  
 الكثير من الناس فهي لا تعدو ان تكون ظاهرة

## أطياف النجوم

طيف الضوء هو تحليل شعاعه عند اختراقه لمنشور زجاجي بلوري إلى ألوان الطيف السبعة المعروفة وهي: الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والنيلي، والبنفسجي. ولقد اكتشف علماء الكيمياء منذ زمن بعيد أن ضوء الشمس يتحلل إلى ألوان الطيف، ولكن هذه الألوان تتخللها خطوط سوداء دقيقة لم تُمر أي اهتمام في بادئ الأمر. حتى أتى العالم الألماني «فرنهوفر» ولاحظ تغير أماكن هذه الخطوط الرقيقة عند تغير مصادر الضوء، وكذلك تغير درجة وضوحها بتغير درجة حرارة المصدر. فالضوء الصادر من غاز الأكسجين المشتعل مثلاً، له طيف تتخلله خطوط سوداء تتوزع على ألوان الطيف ولا تتغير مواضعها بتغير درجة الحرارة. وكلما زادت الحرارة زادت هذه الخطوط وضوحاً. ولكنها لا تتغير مواضعها. أما الضوء الصادر من غاز الهيدروجين فله طيف تتخلله خطوط سوداء موزعة توزيعاً آخر في ألوان الطيف. ولها الخواص نفسها من حيث زيادة شدتها كلما زادت حرارتها، ومن حيث ثبوت موضعها مهما تغيرت درجة الحرارة. وبالمثل بالنسبة إلى كل مصادر الضوء كالمعادن المتقدة والغازات المشتعلة.

ولذلك تحايل العلماء على قياس درجات حرارة كثير من المواد المشتعلة بالاستدلال عليها من خلال توزيع خطوطها السوداء في الأطياف بدلا من استعمال الترمومتر، وخاصة لقياس درجات الحرارة العالية. وإذا كان هذا ميسوراً على الأرض بالنسبة إلى المواد المشتعلة أو الملتهبة، فكيف يتسنى ذلك بالنسبة إلى النجوم التي تبعد عنا ملايين الأميال؟ والكيف مقدرات؟ لقد تيسر ذلك بملاحظة أطياف الأضواء الصادرة من النجوم. فثبت منها أن النجوم أجسام ملتهبة - تحوي جميع العناصر المعروفة لنا على الأرض كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والهيدروجين والصوديوم وغيرها. ولقد أمكن

اللون الأصفر، ثم ذات اللون الأبيض ثم الأزرق. ورغم أن ألوان النجوم الأساسية أربعة فقط، فقد قسم العلماء ألوان النجوم إلى ست مراتب، وقسموا كل مرتبة منها إلى عشرة أقسام فرعية، أقلها حرارة النجوم ذات اللون الأحمر، ثم تندرج إلى مراتب الأحمر كالفاتح والداكن ثم البرتقالي، ثم الأصفر بمراتبه كالأصفر الفاتح والداكن. وهكذا حتى نصل إلى النجوم ذات اللون الأخضر. ثم الأزرق ومرتبه الناصع والبنفسجي، والنجوم الزرقاء هي أشد النجوم حرارة، ولقد ثبت أن هذه النجوم يتغير لونها مع الوقت.

## حرارة النجوم


إن أقل النجوم حرارة هي النجوم الحمراء، وتراوح حرارتها ما بين (١٤٠٠ و ١٢٠٠) درجة مئوية. بينما تبلغ درجة حرارة النجوم الصفراء، وأهمها الشمس، نحو ٦٠٠٠ درجة مئوية أما النجوم الزرقاء فتزيد على ذلك، وتبلغ درجة حرارة سطحها ما بين (٢٣.٠٠٠ و ٢٢٩.٠٠٠) درجة مئوية. والواقع أن قياس هذه الحرارة لا يتعدى سطح هذه النجوم، أما باطنها فهو يتأجج حرارة تزيد على هذه الأرقام بكثير، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عن مدى تأثير النجوم - التي تمتد مصادر ضخمة للحرارة - على الأرض وأهلها، فبعض النجوم، كالنجوم الزرقاء مثلاً تزيد حرارتها على الحرارة التي يغلي عندها الحديد عشر مرات أو أكثر. على الرغم من هذا؛ فإن بعدها الشاسع عنا يجعل مثل هذه الحرارة غير ذات تأثير علينا؛ لأنها لو اقتربت مثلاً إلى بعد كم يد الشمس لتبخر كل شيء على الأرض، وعلى العكس؛ فإن بعض النجوم ضعيفة الحرارة كالنجوم الحمراء، ولكنها ذات حجم كبير جداً بحيث إنها رغم حرارتها الضعيفة فإن كمية الحرارة المنبعثة من سطحها الكبير تعادل الشمس آلاف المرات.

منا وفي اتجاهات مختلفة يظهرها لنا وكأنها متجاورة ومتقاربة، والأبعاد الحقيقية التي تفصلنا عنها تظهرها لنا متزاحمة بعضها إلى جوار بعض في قبة مهولة تحيطنا. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال لا بد منه: هل هذه النجوم مبعثرة بغير نظام؟ والرد على هذا السؤال أن هذه النجوم لو كانت مبعثرة بلا نظام لاصطدمت بعضها ببعض؛ لأنها تتحرك وليست ثابتة كما أخطأ الفلكيون القدماء في ذلك، ومنذ عهد الفلكي «هالي» تأكد العلماء بأن النجوم تسير بسرعات متفاوتة، واستنتج ذلك من تغير مواقعها، وبعضها يقترب منا والبعض الآخر يبتعد عنا، ولكن الأبعاد الهائلة التي بيننا وبينها تجعل هذه الحركة غير ملموسة إلا بعد مضي عدة سنوات، وبعضها بعد مضي قرون ثم لا نجد هذه الحركة زادت على درجة أو درجتين عند قياس تغير الاتجاه، والشمس تجري كذلك بسرعة خاصة، شأنها في ذلك شأن سائر النجوم، وهي تجر معها كواكبها ومنها أرضنا، ولقد قاس العلماء هذه السرعة فوجدوها (١٢ ميلاً في الثانية)، وما دامت المسافات الفاصلة بين النجوم تعد بالآلاف وملايين وبلايين الأميال؛ فإن سرعات تحركها قد تصل إلى مئات الأميال في الثانية، ولقد تدخل العلم الحديث في قياس سرعات النجوم بدقة بلغت حدّاً خيالياً لا يتجاوز جزءاً من المئلي في الثانية. وذلك بواسطة أطراف الضوء الصادر من كل نجم. وكما أن ملاحظة الطيف كانت وسيلة العلماء الرائعة لقياس درجات حرارة النجوم، فكذلك كان الطيف وسيلة لقياس سرعة النجوم. وقد أدت خطوط «فرنهوفر» ونظرية «فيزيائية شهيرة معروفة باسم «نظرية دوبلر» Doppler Theory دوراً رئيساً في قياس سرعات النجوم، ونظرية دوبلر، بدأت عندما لاحظ هذا العالم أن الموجات الصوتية تزداد حدتها إذا كانت صادرة من جسم يتحرك بعيداً عنه، ومعنى ذلك علمياً أن الموجات الصادرة من جسم متحرك

بواسطة المطياف، التصرف على ٦٢ عنصراً في الشمس من العناصر المعروفة. ولقد أمكن ذلك من مشاهدة أطرافها، ومن ملاحظة «خطوط فرنهوفر» على هذه الأطراف أمكن تقدير درجات حرارة سطوح هذه النجوم. وبناء على درجات الحرارة المقاسة هذه، قسم العلماء النجوم إلى أقسام مختلفة مرتبطة بدرجة حرارتها بالإضافة إلى لونها ما دام اللون إحدى دلائل درجة الحرارة.

#### حركة النجوم

سمى كثير من الفلكيين القدماء النجوم باسم الثوابت تمييزاً لها من الكواكب التي تدور حول الشمس، ولكن النجوم لا تقترب عن الشمس، فكل نجم يعدّ شمسا مثل شمسا أو يزيد عليه، ولكن هذه النجوم تفصلها عنا مسافات شاسعة تجعل من المتعذر على العين المجردة أو التلسكوبات التحقق من وجود كواكب تدور حول كل منها من عدمه، وهذه النقطة بالذات هي ما يفرق الشمس عن سائر النجوم في الوقت الحاضر، لقد سبق القول إن أقرب النجوم إلينا يصلنا نوره خلال ٤.٢ سنوات ضوئية، وهذا يعادل (٢٥ مليون مليون ميل) وبعضها يصل ضوءه خلال عشرات السنوات الضوئية، وبعض آخر خلال مئات أو آلاف السنوات الضوئية. فإذا قدر لنا أن نعرف أن ما تكشف عنه العين المجردة من عدد النجوم يتجاوز الآلاف، وأن ما تكشف عنه المراصد يتجاوز الملايين، وكلما كبرت عدسات هذه المراصد زاد عدد ما تكشفه من النجوم، لأدركنا كيف تزدهم السماء بهذه النجوم، ولكن بالضخامة المسافات التي تفصل بينها، إنها مسافات شحيحة تجعل كل نجم منها وكأنه أعزل في ركن قصي يفصل بينه وبين النجوم الأخرى بعد سحيق ورائع وهائل. وإذا كانت السماء تظهر لنا بالعين المجردة مزدحمة بالنجوم وكأنها متقاربة، فحقيقة الأمر أن عدم تساوي النجوم في أبعادها عنا، وانتشارها على أبعاد متفاوتة



متحركاً نحونا بينما يريد طول الموحدة إذا كان الجسم متحركاً بعيداً عنا. وبطراً لأن الصوت ينتشر في موجات تشبه موجات الصوت في كثير من الحواص، فإن الملكيين عندما شاهدوا أطراف مختلف النجوم لاحظوا تغير مواضع خطوط هربوهر عليها، مما يدل على تحركها. فاستدلوا على حركة النجوم بواسطة (نظرية

تقصير موجتها. فنرداد حدثها، إذا كانت مقتربة وعلى العكس تطول موجتها وتعمت حدثها إذا كانت مبتعدة. ومثال ذلك القطار المقترب منا. نسمع صميره حاداً متوالياً في سرعة، بينما القطار المبتعد عنا نسمع صميره حافناً متوالياً في نطء. ومعنى ذلك أن الموجات الصادرة من جسم متحرك يقصر طول موجتها إذا كان الجسم

الوضع الذي يكونان فيه على استقامة واحدة مع موقع الناظر إليهما، فإنه يصعب تمييزهما، ويسميان «بالمزدوجات المنكسفة».

وأشهر «ازدواج ثنائي» في السماء للنجوم هو «الشعري اليمانية» ألمع نجوم السماء. وصاحبه، إذ يجاوره نجم صغير ذو لون أبيض يصعب تمييزه عنه إلا بأقوى التلسكوبات وذلك لشدة لمعانه، ومرجع ذلك إلى الاختلاف الكبير بين حجميهما، فالشعري يزيد حجمه على الشمس بكثير، أما رفيقه فيكبر الأرض بثلاث مرات فقط، وعلى الرغم من ذلك فإنهما منجذبان بعضهما إلى بعض ويدوران حول بعضهما، ومدة الدورة خمسون سنة، وأكثر النجوم الكبيرة مزدوجة مثل نجوم العيوق (Cepella) والشعري اليمانية (Sirius) والشعري القميصاء (Procyon) ونجم العناق (Mizar) يبدو نجماً واحداً، ولكنه مزدوج مع نجم آخر أخضر اللون، وتفصل بينهما مسافة كبيرة، ولكنهما يدوران حول بعضهما دورة كل عشرين يوماً. وكذلك نجم القول (Algol) وغيرها من النجوم المزدوجة آلاف بل ملايين تربطهما الجاذبية إلى بعضهما، ولكن ليس الأزواج الثنائي هو الصورة الوحيدة للجاذبية بين النجوم: إذ هناك أنواع أخرى من الأزواج أو بالأحرى التزاوج بين هذه النجوم؛ فبعض النجوم التي تبدو كنجم واحد في حقيقتها أكثر من نجمين مزدوجين، فبعضهما مجموعة ثلاثية أو رباعية يدور بعضهما حول بعض، وأشهر هذه النجوم «النجم القطبي» Polaris الذي يعلو القطب الشمالي للأرض إذ يتكون من ثلاثة نجوم، اثنين منها يدوران حول بعضهما في دورة مدتها أيام، وهما معاً يدوران حول الثالث في دورة مدتها عشرون عاماً. وهكذا نرى أن النجوم على بساطة منظرها ليست نجومًا فردية بل لها توابعها ولها جاذبيتها الخاصة.

دويلر). حيث إن النجوم التي تنتقل خطوط قزيرها في طيفها إلى ناحية اللون البنفسجي تعني أنها نجوم مقترية نحونا، لأن موجات اللون البنفسجي موجات قصيرة، أما النجوم التي تنتقل خطوط طيفها إلى ناحية اللون الأحمر فهي نجوم تتحرك بعيداً عنا، وبمقارنة حركة الخطوط في الطيف لنجم معين، بحركتها بالنسبة إلى طيف آخر معروف، يمكن تقدير سرعة النجم المتحرك، وعلى سبيل المثال أسفرت نتائج القياس عن معرفة سرعات كثير من النجوم في الفضاء بعضها سريع وبعضها بطيء، ومن أسرع نجوم السماء حركة النجم «بيرنارد» أما الشعري اليمانية فلم تغير موضعها خلال ألفي عام أكثر من درجة واحدة بالنسبة إلى الناظر إليها من الأرض، وكذلك نجم السماك.

#### ازدواجية النجوم


نلاحظ تغير المسافة بين بعض النجوم، ومع المراقبة المستمرة نلاحظ وجود نجمين أو أكثر في حالة تراوج أو ازدواج يدور بعضهما حول بعض في مدارات خاصة، ولذلك سميت «النجوم المزدوجة».

وقد أمكن الاستدلال على حركتها من ملاحظة النجوم المزدوجة ذات الألوان المختلفة إذ غالباً ما تبدو كذلك. فقد يظهر نجم أزرق وبجواره نجم برتقالي أو أحمر، ويلاحظ دورانه في فترة زمنية قد تكون قصيرة تعد بالأيام أو طويلة تعد بالأعوام، وبعض هذه المزدوجات من المسير اكتشافه لو نظرنا إليه بالعين المجردة أو المناظير الصغيرة، إذ لا بد من تلسكوب قوي حتى يمكن تمييز أن الضوء الواصل إلينا ليس مصدره نجماً واحداً بل نجمين، تربط بينهما الجاذبية، ويكون دوران أحدهما حول الآخر هي مدارات اهليلجية. ولذلك فإنه بالنسبة إلى الناظر إليهما قد يبدو ازدواجهما واضحاً إذا لم يكن وضعهما على استقامة واحدة مع موقع المشاهد، أما في

## خاتمة

مقدار استدارتها ثم يدرس تركيبها المعدني. ويعتقد بهذا أنه عرف أسرار الكون، مع أنه لا يعدو أن يكون واقفاً بعيداً عن محيط الأسرار العظيم، الأمثلة كثيرة على إيمان العلماء العميق بالله وبأن العقل البشري المميز يؤمن أن للكون خالقاً يديره بحكمته وقدرته عظيمة.

﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب﴾ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فحقنا عذاب النار﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١].




والآن، ترى هل تخيل الإنسان الصلة بين عظم وضخامة هذا الكون وضالة الذرة وجسيمات الذرة، إنها لصلة عميقة حقاً، ترى ما الصلة بين ما يرى عظيمًا وضخمًا وبين ما هو مستدق على العين: بل لعله لا يرى بأقوى المجاهر الإلكترونية، إنها الصلة بين الموجودات في هذا الكون، الصلة بين الحياة والأحياء، بين القدرة الإلهية العظيمة وبين التناسق والنظام الرائع في عظمة هذا الكون، بل هذه الأكوان، وعظمة القدرة فيما يستدق على العين بل يستدق على الإفهام

لكم يبدو لنا هذا الكون عظيمًا شاملًا ! إزاء ضالة المجموعة الشمسية التي توجد في مجرة طريق التبانة (الطريق اللبني)، وهذه تبدو كذرة أوهيأة وسط هذا الكون العميق الواسع فضلاً عن ضالة الأرض، هذا الكوكب الصغير إزاء تلك العظمة الساحقة. ويبدو لك الآن كم هو ضئيل ضئيل هذا الإنسان، وكم هو قوي عنيد بقدرته على الوصول إلى كل هذه القدرات العلمية والتكنولوجية بشيء واحد فقط هو العقل الذي ميزه الله به عن سائر مخلوقاته بصورة منظمة ومعقدة، فويل للإنسان إن طغى وتكب محجة العقل وافترى، ويل له إن ترك دينه وعقيدته والتجأ بكليته إلى المحض: لأنه لا علم من دون عقيدة ومشوق إلى المجهول. وهكذا كان جميع العلماء الأفذاذ مثل إسحق نيوتن وإينشتاين وباستير وجيمس هتون ... إلخ، هذه الأسماء اللامعة في تاريخ تقدم العلم والحضارة كانت تتخذ من الالتجاء إلى الله دعامة قوية في الكشف عن المجهول، ودفع عجلة التقدم الحضاري.

لقد كان العالم الطبيعي إسحق نيوتن - الذي يعدّ من أئمة علم الفيزياء والرياضيات - يتصور نفسه وكأنه شخص يقف على شاطئ محيط عظيم متلاطم الأمواج، وعلى حين فجأة يجد هذا الشخص حبة رمل صغيرة فينأملها، ويرى





## مجلة العلوم



### أول أيل مستنسخ

استنسخ خمسة أنواع من الحيوانات. وأصافت أن علماء استنسخوا أيضا ماشية وعنزة وخنزيرا وهرة. وأظهرت صور منشورة على موقع الجامعة على الانترنت أيلًا صغيرًا يقف وسط بقعة عشبية. وقال مارك ويستنهوسين الباحث الرئيس بالمشروع إن الأيل المستنسخ ينمو بصورة طبيعية ويبدو في صحة طيبة وعلى الرغم من كثرة أعداد الأيائل ذوات الذيل الأبيض في الحياة البرية، قال الباحث إن استنسخ

قام علماء بجامعة تكساس باستنسخ أول أيل. وقالت الجامعة إن الفحوص أثبتت ر الأيل الذي أطلق عليه اسم ديوي والمولود لأم بديلة في شهر مايو/ أيار الماضي جاء سحرة وراثية مطابقة لأيل أبيض الذيل من جنوب تكساس كان قد تمت الاستعانة بعينات من خلده في عملية الاستنسخ. وأكدت الجامعة أنها أول مؤسسة أكاديمية تتمكن من

من المستهلكين والشركات.

ههدد الهواتف بعدساتها الحمية وحجمها الصغير وقدرتها على نقل الصورة مباشرة إلى الإنترنت، و هواتف محمولة أخرى تعد حلما لكل متخصص و متطعم على الأحرار

وظهرت هذه الهواتف أول مرة في الأسواق أو نل ٢٠٠١م وهي الأشهر الأخيرة ملغلت التقارير الضخمية الواردة من آسيا الأصواء على حوادث مثل ظهور صور عارية لصحاحات أرباء على الإنترنت.

واتار الأفعال المراد على شراء هدد هواتف في أميركا الشمالية منذ طرحها ول مرة هناك أو حر العهد الماضي محذوف مماثلة مما دفع مركز الميافة البدية من لوس بحلول إلى تورنر لحظر أو تقييد استخدام هواتف المحمول داخل مقارها

كما امتدت المخاوف بشأن الهواتف المرودة بالآلات بصوير إلى الشركات التي تحشى عمليات التحسس الصناعي دفع بعضها إلى منع رانيتها من حمل هواتف مرودة بالآلات تصوير

ومن المستبعد أن يزول المخاوف بشأن الهواتف ذات الكاميرات نسخة التطور التكنولوجي والتميز الجاهد للمصمحات هاتجبل الحديد من الهواتف لمحمولة مروود بالآلات تصوير هديو يمكنها تسجيل اهلاذ عدنها بين ١٥ و ٣٠ ثانية

وهي كورنا لحبونية حيث يوجد احد اعلى معدلات تركيب مستخدمي الهاتف المحمول بدأ بالعمل وضع مشروعات لوائح لحماية خصوصية العملاء فهي بداية العام المقبل يشترط أن تصدر أجهزة التليفون المرودة بكاميرات هوبو عرافيه أو كاميرات هديو صونا غالبا عند التقاط أي صورة.

لكن استراتيجحة الخطر ربما تكون ضعيفة بضمة حاجة مع توقعات بأن يكون نصف الهواتف المحمولة قُماحة في ٢٠٠٨ م مرووده بالآلات تصوير هوبو عرافيه و هديو

وهي أميركا الشمالية سوق محظوظ أن تزيد مبيعات الهواتف المرودة بالآلات تصوير أكثر من المشير في العام المقبل بينما لن يشهد سوق الهاتف المحمول

ديوي يمكن أن يكون ذا فائدة في الحفاظ على أنواع أخرى من الأيائل المهددة بالانقراض.

## طائرة بلا طيار:

طور علماء أستراليايون طائرة مروحية صغيرة بلا طيار يمكن استخدامها في عمليات إنقاذ في الجو والبحر وفي مهام خطيرة على البشر.

وقال علماء في منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية المدعومة من الدولة أن الطائرة مانتيس التي يبلغ رصاعها نصف متر وطولها ١.٥ متر صممت لتتكرر لمسها فور إطلاقها في مهمه. ويمكنها أن تصل المكان الذي تسعى عليها الذهاب إليه وإكمال المهمة والعودة منها دون مساعدته وقد يؤدي ذلك إلى هدمه كمية في مزرعة جهود الإنقاذ في البحر وتغطية مساحة أكبر في وقت أقصر عن طريق إرسال عدد من الطائرات الصغيرة للبحث في الوقت نفسه

الطائرة المطورة يمكنها التفقد والإبلاغ عن حالة البنية الأساسية مثل خطوط الكهرباء وهي مهام تقوم به الآن طائرات مروحية مأهولة لرصد الأعطال و مستمر تطوير مانتيس عامين وكان الهدف الرئيس منها تقليل تكلفة الإلكترونيات وتحقيق ذلك باستخدام محركات مخصصه التكلفة لتطوير الجاهر الداخلي الذي يحقق التوازن ويحدد وجهة الطائرة في الجو و وضع النظام من سنيكه من المصمريوم لتقبل التورن إلى ٧٥ عرافا

وقال محدث باسم المنظمة أن إنتاج هذه الطائرة سيتكلف عشرات الألوف من الدولارات نغما لاستخداماتها

## كاميرات الهواتف المحمول تخترق الخصوصية

جاءت أجهزة الهاتف المحمول المرودة بالآلات تصوير على قائمة هدايا عيد الميلاد لهذا العام، إلا أنها تثير جدلا متزايدا بشأن احترام الخصوصية من جانب كل

العادي سوى زيادة طفيفة.

ويقدر عدد الهواتف ذات الكاميرات بنحو ٣, ٢/ أو نحو ثلاثة ملايين جهاز من بين ٩٠ مليون هاتف محمول بيعت في أميركا الشمالية هذا العام و٦٥ مليون هاتف مزود بآلة تصوير بيعت في جميع أنحاء العالم.

### الرجل الآلي ببغفل يواجه صعوبات

تضاءلت آمال خبراء وكالة الفضاء الأوروبية في إمكان قيام ببغفل الرجل الآلي ٢ بهبوط ناجح على سطح كوكب المريخ.

فلم تنلق الوكالة على الأرض حستى الآن أي اثبات تفيد بهبوط مسارها على سطح الكوكب الأحمر، وأخففت محاولة ثانية لالتقاط إشارة عبر تلسكوب لوفل في جوردل بنك غربي إنجلترا

وان يفترض أن تتلقى الإشارة الأولى مركبة مارس أوديسي التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا

وكانت المركبة قد دخلت مسارها الصحيح، حيث ستقوم بنقل الإشارات والمعلومات التي يلتقطها المسبار على مدى ستة أشهر ومن المقرر أن تصد المركبة الأميركية بالطيران فوق محطته الهبوط المقررة للرجل الآلي الأوروبي في محاولة لنشر الرسالة المقررة

وآثار الإخفاق في التقاط أي إشارة من ببغفل ٢ مخاوف بأن يكون المسبار الذي لا يزيد حجمه على حجم مظلة مفتوحة قد لاقى مصير معدات أخرى كثيرة سبقته، كانت قد تحولت إلى خردة معدنية مبعثرة في أرجاء المريخ

ومن المحتمل أن يواجه المسبار الكثير من المصاعب منها عواصف ترابية هائلة تجتاح سطح الكوكب. وفي حالة هبوط ببغفل ٢ بنجاح فإن أقصى مدة لتشغيله هي ١٨٠ يوما قبل أن يؤدي غبار المريخ وارتفاع الحرارة إلى تعطيله.

وتتضمن وحدة الهبوط أحدث أدوات لأخذ عينات من سطح الكوكب بحثا عن أدلة على إمكان وجود حياة ويصر المسؤولون أن سميت ببغفل لا يعني إخفاق

المهمة، وأشاروا إلى وجود احتمال بهبوط ناجح لمختبرهم المنصر على سطح المريخ.

كما أن مهمة استكشاف المريخ لا تشغل سوى ١٠٪ فقط من إجمالي المهمة العملية للمركبة الأوروبية مارس إكسبرس التي ستقل إلى الأرض صورا مهمة للكوكب لا مثيل لها من قبل.

وتشمل هذه المعدات كاميرات ذات تقنية معقدة ورادار يكشف ما تحت سطح الكوكب ومقياسا للطقس في إطار محاولة الكشف عن أي مظاهر للحياة على الكوكب.

### سيارة غنر من الزحام

أصبح في إمكان السائق تجنب الشوارع المزدحمة، واختيار الطريق البديل الملائم، وهو على بعد ٨ كيلو مترات، إلا سبب في القريب سيارة تحذر من الطرق





ويقدر الخبراء أن ١٠ في المئة من السيارات في ألمانيا ستحتاج إلى العمل بالنظام الجديد للتمتع بنظام مراقبة المرور في جميع أنحاء البلاد، وتجري ألمانيا محادثات مع كبرى الشركات الأمريكية والشركات اليابانية الكبرى لصناعة السيارات للاتفاق على معايير عالمية موحدة للنظام الجديد.

وي دعم النظام الجديد مشروع التحذير اللاسلكي المحلي من الأخطار التابع للاتحاد الأوروبي وإدارة النقل والمواصلات الأمريكية ويهدف إلى تقليل عدد حوادث السيارات الخطيرة بحلول عام ٢٠١٠م. ولا تقتصر مميزات السيارات الناطقة على توفير الوقت والمال. بل إن وزارة البحث العلمي الألمانية قدرت تكلفة اختناقات المرور بنحو ٢٥٠ مليون يورو يومياً نتيجة ساعات العمل الضائعة بسبب الزحام، كما تسبب الاختناقات المرورية ضياع ٢٣ مليون لتر من الوقود يومياً فضلاً عن تأثيرها السلبي في الهواء والبيئة.

المزدحمة أو التي بها حادثة أو أي عائق. والتكنولوجيا المستخدمة في الفكرة الجديدة متقدمة للغاية. ويضم الكمبيوتر الموجود في السيارة مكتبة كاملة من المعلومات يستمد منها من أجهزة استشعار في المكابح ونظام الثبات الإلكتروني ونظام الوسائد الهوائية.

وتوفر هذه الانظمة معلومات بشأن موقف المرور ثم ترسلها إلى السيارات الأخرى. وتصبح كل سيارة مستقبلية للمعلومات وناقلة لها في الوقت نفسه. وتختبر النظام الجديد شركتا بي. إم. دبليو وديملر كريسلر في جنوب ألمانيا. وتقتررب كبرى الشركات الألمانية من الاتفاق على معايير موحدة للنظام الجديد.

وصرح رايهولد إيسرهارت مدير إدارة نظام الاتصالات في ديملر كريسلر بأن الفكرة لن يكون لها هدف إذا أرسلت السيارات التي تتجهها بي. إم. دبليو أو المرسيدس التحذير إلى مثيلاتها.



# من كتاب العدد

لطف الله قاري

- ❖ من مواليد مكة المكرمة ١٣٧٣هـ.
- ❖ بكالوريوس في الفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٧٨م.
- ❖ ماجستير في الهندسة البيئية من جامعة وسط فلوريدا ١٩٨٢م.
- ❖ الدبلوم العالي في الأرصاد الجوية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ١٩٨٠م.
- ❖ حاضر وقدم بحثاً في مجالي حماية البيئة من التلوث وتاريخ العلوم الطبيعية والتقنية داخل المملكة وخارجها.
- ❖ أعد معارض حول التراث العلمي العربي أقيمت في المملكة وخارجها. وشارك في تقديم برامج علمية عرضت في بعض الفضائيات العربية.
- ❖ له عدد من البحوث والمؤلفات المنشورة.

حماد نواف فرحان الدليهي

- ❖ أستاذ علوم النبات والبيئة. كلية التربية (حجة). جامعة صنعاء.
- ❖ دكتوراه في علوم النبات من جامعة Wales . بريطانيا ١٩٨٩م.
- ❖ له عدد من الأبحاث والمقالات العلمية المنشورة.

محمي الدين عمر لثيمية

- ❖ استشاري تغذية بمستشفى الملك فهد ومركز رعاية مرضى السكر، ومركز أمراض الكلى.
- ❖ عضو هيئة التدريس بمركز الدراسات العليا لطب الأسرة والمجتمع بالمدينة المنورة.
- ❖ له عدد من الأبحاث والمقالات المنشورة.

أحمد محمد ناجي قاسم

- ❖ من مواليد مدينة الرياض. المملكة العربية السعودية ١٩٦٨م.
- ❖ حاصل على الإجازة في الكيمياء الصناعية التطبيقية ١٩٨٩م.
- ❖ دراسات عليا في الهندسة الكيميائية. تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.
- ❖ له عدد من المقالات العلمية المنشورة في عدد من الصحف والمجلات الأردنية والعربية، بالإضافة إلى

عبدالرحمن محمد العيسوي

- ❖ من مواليد مدينة طنطا، مصر ١٩٢٢م.
- ❖ دكتوراه في علم النفس.
- ❖ عمل طبيباً نفسانياً بإنجلترا. وباحثاً هتياً بوزارة التعليم المصرية، ومدرساً لعلم النفس بجامعة الإسكندرية.
- ❖ يعمل حالياً أستاذاً في قسم علم النفس. كلية الآداب. جامعة الإسكندرية.
- ❖ له عدد من المؤلفات المطبوعة في علم النفس، إلى جانب الكثير من البحوث والدراسات المنشورة في المجلات.

محمد يسلم شدياق

- ❖ بكالوريوس في علم الحيوان، جامعة الملك سعود ١٤٠٧هـ.
- ❖ دكتوراه في علم الطيور. جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
- ❖ باحث يشي متخصص في علم الطيور في الهيئة الوطنية لحماية الحياة القطرية وإنمائها.
- ❖ له عدد من البحوث المنشورة.

جهد كامل ملحم

- ❖ أستاذ للفيزياء . قسم الفيزياء . جامعة تشرين كلية العلوم . اللاذقية . سورية.
- ❖ دكتوراه في الفيزياء النووية ١٩٨١م.
- ❖ شارك في الكثير من المؤتمرات العلمية العربية والدولية في علوم الفيزياء.
- ❖ له الكثير من البحوث العلمية المنشورة في مجلات عربية ودولية محكمة إضافة إلى عدد من الكتب



الصناعة الدوائية تدعم الصناعة العلمية



التزام بالامتياز ...

التزام بجودة صحية عالية ...

التزام تجاه العملاء ...

**RIYADH**  
**PHARMA**



**الرياض**  
**شارسا**

## (سابك) تقدم حاضراً ما يمكن أن يقدمه أي منتج ناجح للكيمائيات مستقبلاً



عندما تأسست (سابك) عام ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م) لنقود المسيرة الصناعية السعودية إلى عصر ما بعد النفط ، كان البعض لا يتصور أن تحز صناعاتها هذا المستوى المتقدم الذي جعلها محل الإعجاب والتقدير حول العالم .  
يتضمن إنتاج (سابك) تشكيلة واسعة من المواد الكيماوية الأساسية ، والوسطية اللازمة للحياة العصرية .  
تشمل الكيماويات الأساسية الأوليفينات والمركبات العطرية والأكسجينية ومثيل ثالثي بوتيل الإيثر وغيرها .. أما الكيماويات الوسطية فتشمل على سبيل المثال : جلايكول الإثيلين ، وثنائي كلوريد الإثيلين ، وغيرها .  
ويتبع (سابك) أكبر مجمع مفرد لإنتاج الميثانول في العالم ، وآخر من أكبر التجمعات العالمية لإنتاج مثيل ثالثي بوتيل الإيثر .  
لا شك أن تعامل الزبون مع مورد واحد لتشكيلة واسعة من المنتجات يهيء له (ميزة اقتصادية) مهمة ، إضافة إلى ذلك فإن قرب مراكز التوزيع العائدة لنا ، المنتشرة حول العالم ، يخفف عن زبائننا كثيراً من أعباء تخزين المنتجات .. علاوة على أن هيكلنا التنظيمي الجديد يحقق لنا الاستجابة الأسرع والأكثر فعالية لتطورات وتغيرات الأسواق ، ونلمس حاجات زبائننا .  
إن نخططين الدروس للمستقبل يسرع خطانا ويكثفها على طريق التحسين الدائب لمنتجاتنا وخدماتنا ، ويعزز قدرتنا التنافسية في المستقبل .. تماماً كما الحاضر .

## قوة العطاء